

## LISTE DES OISEAUX DE LA VIENNE (1994)

Le document ci-contre présente la liste des 247 espèces qui ont été observées au moins une fois dans la Vienne de 1973 à 1994. Les noms français des espèces ainsi que leur classification se réfèrent à la "Liste LPO des oiseaux de l'Ouest Paléarctique" (1993). Le tableau se présente sous la forme suivante:

1) Nom de l'espèce + nidification	2) Statut	3) Abondance
Pie-grièche écorcheur*	E	P
Pie-grièche grise †	H	X
Pie-grièche à tête rous.*	E	R

### 1) La nidification de chaque espèce dans la Vienne est symbolisée de la manière suivante:

- \* : espèce nicheuse régulière
- \*\* : espèce nicheuse "exceptionnelle" (espèces hors ou en limite de répartition, dont au moins une tentative de nidification (réussie ou non) a été constatée depuis 1985).
- † : espèce nicheuse "disparue" (?)
- rien : ne niche pas!

Le terme "disparu" est à prendre au conditionnel. Il concerne les espèces dont au moins un cas de nidification est connu pour la période 1973-1984 et aucun depuis. Si pour certaines espèces cela reflète bien leur dynamique actuelle, pour la majorité, la frontière disparue/exceptionnelle est bien mince...

### 2) Le statut des oiseaux peut être classé en deux catégories, en fonction de la nidification ou non des espèces:

S : "sédentaire", espèce qui peut être observée toute l'année. E : "estivant", visiteur d'été .	Oiseaux nicheurs
H : "hivernant", visiteur d'hiver. M : observé lors des migrations post- ou pré-nuptiales. A : "accidentel" dans notre département vu la distribution et les moeurs de l'espèce. ? : espèce dont l'origine sauvage est douteuse.	Oiseaux non nicheurs

Ici, "été" et "hiver" sont à prendre au sens large.

H,S/E,S/S,H/M,H/M,E : indiquent le statut principal puis le statut secondaire lorsqu'un tel statut est reconnu dans notre département. Ceci s'applique aux espèces dont les effectifs sont très variables au cours de l'année ou/et correspondent à des populations bien distinctes.

Au vu de leur statut local et national, seules 25 espèces sont considérées accidentelles. Ceci souligne le caractère très improbable de leur observation dans notre département, pour des raisons propres à chaque espèce. Il peut s'agir d'oiseaux pélagiques amenés par une tempête, d'hivernants poussés par un hiver rude, d'erratisme juvénile, etc...

### 3) L'abondance: les effectifs de chaque espèce ont été estimés suivant une échelle logarithmique de base 10.

Nombre d'individus	Classe d'abondance
non observé tous les ans*	O: "Occasionnel"
0 < N ≤ 10	X: "très rare"
10 < N ≤ 100	R: "rare"
100 < N ≤ 1000	P: "peu commun"
1000 < N ≤ 10000	C: "commun"
10000 < N	T: "très commun"

\*Certaines espèces occasionnelles n'ont été observées qu'une seule fois.

Pour donner une idée concrète des ordres de grandeurs, sachant qu'il faut environ 50 quadrats (1/2 carte au 25000<sup>e</sup>) pour couvrir la Vienne, une espèce nicheuse commune répartie uniformément dans tout le département, est représentée par 10 à 100 couples sur chaque quadrat. Deux indices d'abondance séparés par un tiret signalent des espèces dont les effectifs varient notablement suivant les années. L'absence de toute indication dans les deux colonnes signale que la dernière observation est antérieure à 1984. L'abondance des Perdrix et du Faisan de Colchide, faussée par les lâchers massifs effectués par les chasseurs, n'est pas indiquée.

Chaque espèce étant à elle seule un cas particulier, aucune classification ne saurait traduire parfaitement la diversité de notre avifaune. Aussi les indications concernant le statut et surtout celles concernant l'abondance, sont à prendre avec beaucoup d'indulgence. Il s'agit là avant tout d'une première liste de référence.

Pour conclure, sachez que parmi les 247 espèces ici recensées, environ les 2/3 peuvent être observées chaque année dans la Vienne, à condition de les rechercher au bon endroit et au bon moment!

Plongeon catmarin	H	O	Avocette élégante	M	X	Bergeronnette flavéole	M	O
Plongeon arctique	H	O	Oedicnème criard*	E	C	Bergeronnette des ruis.*	S	P
Plongeon imbrin	H	O	Petit Gravelot*	E	R	Bergeronnette grise*	S	C
Grèbe castagneux*	S	C	Grand Gravelot	M	X	Cincla plongeur**	S	X
Grèbe huppé*	S	P	Gravelot à collier inter.	M	O	Troglodyte mignon*	S	T
Grèbe jougris	H	O	Pluvier guignard	A	O	Accenteur mouchet*	S	T
Grèbe esclavon	H	O	Pluvier doré	H	P-C	Rougegorge familier*	S	T
Grèbe à cou noir	M	O	Pluvier argenté	M	O	Rossignol philomèle*	E	T
Océanite culblanc	A	O	Vanneau huppé*	H,S	T,P	Rougequeue noir*	E,S	T,R
Grand Cormoran	H	P	Bécasseau maubèche	M	O	Rougequeue à front bl.*	E	P
Butor étoilé†	H	O	Bécasseau sanderling	M	O	Tarier des prés**	M	R
Blongios nain†			Bécasseau minute	M	O	Tarier pâtre*	E,S	C,P
Bihoreau gris	M	O	Bécasseau de Temminck	M	O	Traquet motteux*	E	R
Aigrette garzette	M	X	Bécasseau tacheté	A	O	Merle à plastron	M	O
Grande Aigrette	A	O	Bécasseau cocorli	M	O	Merle noir*	S	T
Héron cendré*	S	P	Bécasseau variable	M	O	Grive litorne	H	C
Héron pourpré*	E	X	Combattant varié	M	R	Grive musicienne*	S	C
Cigogne noire	M	O	Bécassine sourde	M	O	Grive mauvis	H	C
Cigogne blanche	M	X	Bécassine des marais**	H	R-P	Grive draine*	S	C
Spatule blanche	A	O	Bécasse des bois*	H,S	R	Bouscarle de Cetti*	S	R
Flamant rose	?	O	Barge à queue noire	M	X-R	Cisticole des joncs*	E	X
Cygne de Bewick	H	O	Barge rousse	M	O	Locustelle tachetée*	E	P
Cygne tuberculé	S,H	O	Courlis corlieu	M	O	Locustelle luscinioïde*	E	X
Oie des moissons	M,H	O	Courlis cendré*	S	R	Phragmite aquatique	A	O
Oie rieuse	A	O	Chevalier arlequin	M	R	Phragmite des joncs*	E	R
Oie cendrée	M,H	P,C	Chevalier gambette	M	R-P	Rousserolle effarvate*	E	P
Bernache cravant	A	O	Chevalier stagnatile	M	O	Rousserolle turdoïde †	M	O
Tadorne casarca	?	O	Chevalier aboyeur	M	X-R	Hypolaïs polyglotte*	E	T
Tadorne de Belon	H	O	Chevalier culblanc	M	X-R	Fauvette pitchou*	S	P
Aix mandarin	?	O	Chevalier sylvain	M	X-R	Fauvette orphée †		
Canard siffleur	H	R	Chevalier guignette †	M	P	Fauvette grisette*	E	T
Canard chipeau	H	R	Tournepierrre à collier	M	O	Fauvette des jardins*	E	C
Sarcelle d'hiver**	H,S	P,X	Labbe parasite	A	O	Fauvette à tête noire*	E,S	T,R
Canard colvert*	H,S	C	Mouette pygmée	A	O	Pouillot de Bonelli*	E	C
Canard pilet**	H	R	Mouette rieuse*	H,S	P,R	Pouillot siffleur*	E	C
Sarcelle d'été	M	X-R	Goéland railleur	A	O	Pouillot vélocé*	S	T
Canard souchet**	H	R	Goéland cendré	H	O	Pouillot fitis*	M,E	C,X
Nette rousse	A	O	Goéland brun	H	O	Roitelet huppé*	S	P
Fuligule milouin*	H,S	P,X	Goéland argenté	H	O	Roitelet triple-bandeau*	S	C
Fuligule à bec cerclé	A	O	Mouette tridactyle	A	O	Gobemouche gris*	E	C
Fuligule nyroca	A	O	Sterne caugek	M	O	Gobemouche noir †	M	X
Fuligule morillon	H	R	Sterne pierregarin**	M	X	Mésange longue queue*	S	C
Fuligule milouinan	A	O	Sterne arctique	A	O	Mésange nonette*	S	C
Eider à duvet	H	O	Sterne naine	M	O	Mésange huppée*	S	P
Macreuse brune	H	O	Guifette moustac	M	X-R	Mésange noire*	H,S	R
Macreuse noire	M	O	Guifette noire	M	X-R	Mésange bleue*	S	T
Garrot à oeil d'or	H	O	Guifette leucoptère	A	O	Mésange charbonnière*	S	T
Harle piette	H	O	Pigeon colombin*	H,S	P,R	Sitelle torchepot*	S	C
Harle huppé	H	O	Pigeon ramier*	H,S	T,C	Tichodrome échelette	H	O
Harle bièvre	H	O	Tourterelle turque*	S	C	Grimpereau des jardins*	S	C
Bondrée apivore*	E	P	Tourterelle des bois*	E	P	Mésange remiz	A	O
Milan noir*	E	R	Coucou geai	A	O	Loriot d'Europe*	E	C
Milan royal	M	X-R	Coucou gris*	E	C	Pie-grièche écorcheur*	E	P
Pygargue à queue blan.	A	O	Chouette effraie*	S	C	Pie-grièche grise †	H	X
Circaète Jean-le-Blanc*	E	X	Petit-Duc scops*	E	X	Pie-grièche à tête rous.*	E	R
Busard des roseaux*	S	X	Chouette chevêche*	S	P	Geai des chênes*	S	T
Busard Saint-Martin*	S	P	Chouette hulotte*	S	C	Pie bavarde*	S	T
Busard cendré*	E	P	Hibou moyen-duc*	S	C	Choucas des tours*	S	C
Autour des palombes*	S	R	Hibou des marais**	M	X	Corbeaux freux*	H,S	T,C
Epervier d'Europe*	S	P	Engoulevent d'Europe*	E	P	Corneille noire*	S	C
Buse variable*	S	C	Martinet noir*	E	T	Etourneau sansonnet*	S	T
Aigle botté	M	O	Martin-pêcheur d'Eur.*	S	P	Moineau domestique*	S	T
Aigle de Bonelli	A	O	Guépier d'Europe*	E	R	Moineau friquet*	S	P
Balbusard pêcheur	M	X	Huppe fasciée*	E	P	Moineau soulcie †		
Faucon crécerelle*	S	C	Torcol fourmilier*	E	X	Pinson des arbres*	S	T
Faucon kobez	M	O	Pic cendré †	A	O	Pinson du Nord	H	P-C
Faucon émerillon	H	R	Pic vert*	S	C	Serin cini*	E,S	C,P
Faucon hobereau*	E	R	Pic noir*	S	R	Verdier d'Europe*	S	C
Faucon pèlerin	H	O	Pic épeiche*	S	C	Chardonnet élégant*	S	C
Perdrix rouge*	S		Pic mar*	S	P	Tarin des aulnes	H	P
Perdrix grise*	S		Pic épeichette*	S	P	Linotte mélodieuse*	S	T
Caille des blés*	E	C	Cochevis huppé*	S	C	Sizerin flammé	H	O
Faisan vénéré	?	O	Alouette calandrelle*	E	X	Beccroisé des sapins	H	O
Faisan de Colchide*	S		Alouette lulu*	S	R	Bouvreuil pivoiné*	S	C
Râle d'eau*	S	R	Alouette des champs*	S	T	Grosbec casse noyaux*	S	P
Marouette ponctuée	A	O	Hirondelle de rivage*	E	C	Bruant jaune *	S	T
Râle des genêts*	E	X	Hirondelle rustique *	E	T	Bruant zizi *	S	C
Poule d'eau*	S	C	Hirondelle de fenêtre*	E	C	Bruant fou	S	O
Porphyryon bleu	?	O	Pipit rousseline*	E	R	Bruant ortolan *	A	R
Foulque macroule*	H,S	C,P	Pipit des arbres*	E	T	Bruant des roseaux *	H,S	P,R
Grue cendrée	M	P-C	Pipit farlouse*	H,S	T,R	Bruant proyer *	S	T
Outarde canepetière*	E	P	Pipit spioncelle	M	O			
Echasse blanche	M	O	Bergeronnette printan.	M	R			