



Synthèse des données ornithologiques des années 1999-2000-2001

PRÉAMBULE

La rédaction collective de cette synthèse a été assurée par Bruno FLEURANT, Daniel GILARDOT, Mathieu HOLTHOF, Eric HOLTHOF, François LECOMTE, Gérard NOËL, Benoît VAN HECKE et Julien VENTROUX.

Cette synthèse s'appuie sur les données enregistrées dans la base informatique " Bdnat " de la LPO Vienne développée par Patrice THOUVENIN. Celle-ci a été installée en 2000 et ne contient qu'une petite partie des observations de l'année 1999.

Au cours de la rédaction, nous avons rencontré quelques difficultés : il nous manquait souvent des précisions vis-à-vis du comportement des oiseaux (chant, transport de nourriture, parades, défenses de territoire) ; ces commentaires pouvant aussi nous éclairer sur le statut des oiseaux (nicheur, hivernant ou de passage).


Pour les années à venir, nous vous incitons à être plus prolixes dans vos commentaires (voir article sur comment

remplir une fiche) et nous vous suggérons de réaliser une fiche récapitulative des oiseaux nicheurs vus dans votre environnement familial (maison, travail si vous avez encore le temps de regarder par la fenêtre, ferme ou bien d'un site que vous suivez à l'année).

Afin de mieux comprendre nos remarques nous avons adopté la définition suivante : une donnée = 1 contact avec 1 individu ou un groupe d'individus sur un site à une date donnée.

De la fin 1999 au 31/12/2001 ce sont 133 personnes qui nous ont confié leurs fiches d'observations. Parmi ces observateurs, 86 ont donné 1 à 5 fiches, 34 ont donné 6 à 100 fiches et 3 ont donné plus de 350 fiches (Cédric MROCZKO, Thierry DUBOIS, Pierre GUIGNARD) ; que tous soient ici remerciés.

La répartition des données au cours de ces trois années montre que 1999 correspond au démarrage et à la mise en place des fiches papiers.



Liste des observateurs :


Léo ALBERT - Raymond ALSAC - Dominique ANTIGNY - Fabrice ANTUNES - Jean-Jacques BEAU - Danielle BERGERON - Maurice BERNARD - Laetitia BIALU - Jacques BOBIN - Jean-Baptiste BONNIN - BOULAY - Jacqueline BOURRY - Michel BRAMARD - Isabelle BRUNET - BLAY - Guenaël BURBAN - Rémi CABIROL - Jean-Marc CARIOU - Solange CARIOU - Michel CAUPENNE - Pascal CAVALLIN - Brigitte CERNON - Jean-Claude CHEMY - Patricia CHEMY - Thierry CHERIOT - Patrice CHOISY - Léon CHUILLET - Pierre COUSIN - Jean-Guy COUTEAU - Anthony COX - Bertrand de KERVENOAEEL - Alain DELAGE - Christine DELLIAUX - Luc DELOURME - Jean-Claude DESCOMBES - Michèle DESOUCHES - Philippe DOUGE - Pascal DUBEC - Thierry DUBOIS - Lydie DUBOIS - Yvain DUBOIS - Bruno DUBRAC - Pierre DUCCELLIER - Jean-Marc DUMAS - Philippe DUPUY - Bruno FILLON - Bruno FLEURANT - LAURENT FONTENEAU - Bernard GAROTIN - Véronique GAUDUCHON - GENDREAU - Guy GEVAUDAN - Marie GILARDOT - Daniel GILARDOT - Vincent GILET - Anne GODIN - François GOUBY - Michel GRANGER - Richard GREGE - Freddy GRELLIER - Groupe Jeunes - Jean GUERIN - Mireille GUERY - Pierre GUIGNARD - Patricia GUILLAUME - Daniel GUILLET - Marlène GUILLOT - Pierre GUY - Thomas HERRAULT - Christophe HERVE - Matthieu HOLTHOF - Eric JEAMET - Christian JEAN - Emeline JEANSON - Rémi KUMAR - Jean LANGOUMOIS - Gérard LAVAUD - François LECOMTE - Anne LEJEUNE - Vincent LELONG - Françoise LEVILLAIN - Christian LHOMME - Véronique LIEGE - Bernard LIEGEOIS - Katia LIPOVOÏ - Joseph LUSSON - Michel MASSON - André MASSOT - Vincent MAZIERE - Claire MENIER - Jean MENIGAUD - Florian MIGAULT - Vincent MILARET - Annick MOREAU - Roger MOREAU - Nicolas MORON - Cédric MROCZKO - David NAU - Jean-Pierre NERBUSSON -

Les gardes de l'ONCFS - Reine PAPIILLON - Didier PAPOT - Alain PEIGNAULT - Térésa PEIGNAULT - Jean-Marc PERCIER - Sophie PEROT - Aurélie PEROUX - Alain PERSUY - Claudie PICHON - Yves PINEAU - Pierre PLAT - Viviane PLU - Olivier POISSON - Olivier PREVOST - Danièle RAINAUD - Antoine RAT - Thierry RIGAUD - Patrick ROY - Denis ROYER - Jean-Marc SALLES - Arlette SANDILLON - Philippe SAUVAGET - Jean-Marc SERGEANT - Isabelle TALLONNEAU - Chantal TERRASSON - Christian THOMAS - Frédéric TOUZALIN - Stéphane TROUBAT - Benoît VAN HECKE - Damien VERGNAUD - Stéphane VILARUBIAS - VRIGNEAU - Stéphanie ZUNK-TROUBAT.

Remarques sur les sites

- Seuls les sites remarquables sont nommés dans les articles. Les lieux les plus cités sont :
- L'étang Beaufour, commune de Saulgé.
- L'étang Chez Séguier, commune de Pressac.
- L'étang Combourg, commune de Pressac.
- L'étang Delage des plaines du Léché, commune de Saulgé.
- L'étang Le Breuil, commune de Nieuil-l'Espoir.
- L'étang de Maupertuis, commune de Coulombiers.
- L'étang Molessard, commune de Millac.
- L'étang de la Pétolée, commune d'Usson-du-Poitou.
- L'étang de la Guingauderie dit aussi étang Ichthyos, commune de Adriers.
- Le Pinail : partie de la Forêt de Moulière comprenant notamment la réserve Naturelle du Pinail, communes de Vouneuil-sur-Vienne, de Saint-Cyr et de Bonneuil-Matours.
- Le plan d'eau de Saint-Cyr, commune de Saint-Cyr.

Légende



GAVIIDAE**Plongeon imbrin (*Gavia immer*) H (3-1)**

1 ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr du 17 au 28/12/00

PODICIPEDIDAE**Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) S (100-19)**

Observations de parades de fin mars à juin ; transport de matériaux en avril ; jeunes observés de juin à juillet (3 à 4 poussins par couvée).

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) S (322-28)

Parades observées de fin décembre à mai avec un pic en mars ; construction des nids de mars à avril. Les grèbes sont observés sur les nids surtout en mars et jusqu'à la fin juillet ; les jeunes observés dès début mai jusqu'en septembre. Un maximum de 15 grèbes notés le 23/01/00 sur le lac de Chardes à l'Isle-Jourdain.

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*) H (3-1)


1 ind. de passage sur le plan d'eau de Saint-Cyr du 25/01 au 9/02/01.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) M (8-4)

Passage d'août à octobre et de février à mars. Un oiseau blessé à une patte par une voiture au Breuil-Mingot à Poitiers.

HYDROBATIDAE**Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*) A (1-1)**

1 ind. trouvé mort à Montmorillon le 30/12/99 suite à la tempête de fin décembre 1999.

PHALACROCORACIDAE**Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) H (176-44)**

Présent sur tout le département toute l'année sauf au mois de juin. En juillet et août, seulement 1 à 2 ind. notés. Maximum de 150 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr le 08/12/01. Voir l'article d'Eric Jeamet.

ARDEIDAE**Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) M (8-3)**

Deux périodes de passage en mai et juillet. A rechercher les indices de nidification vers Pressac où des sub-adultes ont été vus à plusieurs reprises.

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) M (1-1)

Première observation pour le département : 2 ind. vus le 13/05/00 à Saulgé (Voir l'article de Nicolas MORON dans l'Outarde n°41)

Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) M (14-10)

En 1999, 1 ind. sur l'étang de Maupertuis le 28/01 et 6 ind. le 22/11 à Charroux.

En 2000, 3 ind. du 15/03 au 15/04 à La Chapelle-Baton et 30 ind. à Coulombiers le 14/10.

En 2001, augmentation du nombre d'observations : 5 ind. en mai en plumage nuptial à Saulgé, 8 en août à Civaux et 9 mentions en novembre et décembre dont 1 oiseau blessé récupéré à Persac par les gardes de l'ONCFS.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) M (27-15)

Présence sporadique d'1 à 3 ind. tout au long de l'année avec des observations plus nombreuses de juillet à septembre.

Grande Aigrette (*Egretta alba*) M (18-8)

Présence sporadique d'août à avril d'ind. isolés.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) S (110-63)


11 colonies dénombrées en 2000 pour 257 nids occupés (voir article Outarde n°41) et 2 nouvelles ont été révélées en 2001 ; ce qui tend à montrer l'éclatement de la population. La plus grosse colonie reste celle de Pressac avec 84 nids. La colonie du Bois de Saint-Pierre a été victime d'une importante prédation.

Héron pourpré (*Ardea purpurea*) E (26-8)

Les secteurs de Montmorillon et de Pressac concentrent toute la population de la Vienne (11 couples en 2000). Ils arrivent sur les lieux de nidification mi-avril et les derniers sont vus fin septembre. (voir article Outarde n°41)

CICONIIDAE**Cigogne noire (*Ciconia nigra*) M (11-9)**

Observation d'ind. isolés de la mi-juin au début octobre avec un pic entre fin août et septembre.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) M (37-24)


De passage dans la Vienne de février à septembre avec des pics en février et en août-septembre. Elles stationnent parfois 3 ou 4 jours. A noter un cas d'électrocution en août 2000 à St-Rémy sur Creuse.

THRESKIORNITHIDAE**Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*) A (3-3)**

Nouvelle espèce pour le département de la Vienne : 1 individu observé du 23 au 30/01/00 à Chauvigny, du 01/02 au 07/02/00 à Bonnes et le 30/03/00 à La Trimouille.

ANATIDAE**Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) S, H (20-8)**

Le nombre de citations pour cette espèce est faible. Au printemps 2000, 2 ind. sur l'étang de la Pétolée du 05/03 au 08/04 et en 2001, 5 sur l'étang Le Breuil du 01 au 18/03. Un cas d'hivernage à la Pétolée d'1 individu du 03/01 au 08/03/01. A rechercher pour confirmer la nidification.

Oie cendrée (*Anser anser*)**M, H (70-28)****Migration postnuptiale :**

- 1999 : une seule donnée (!) de 7 ind. le 13/11
- 2000 : passage du 15/10 au 22/12 (200 ind. max.)
- 2001 : passage du 17/10 au 10/11 (25 ind. max.)

Migration prénuptiale :

- 1999 : passage du 20/02 au 18/04 (16 ind. max.)
- 2000 : passage du 06/02 au 05/03 (45 ind. max.)
- 2001 : passage du 04/02 au 06/03 (300 ind. max.)

Bernache cravant (*Branta bernicla*) **A (1-1)**

1 ind. observé le 28/12/99 à l'étang de Beaufourg.

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) **? (2-2)**


2 ind. à Chouppes et 3 sur le plan d'eau de Saint-Cyr vraisemblablement échappés de captivité

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) **H (17-7)**

2 données lors du passage automnal : 10 ind. en vol le 28/09/00 à Coussay, 1 individu au plan d'eau de Saint-Cyr le 21/12/00.

Une seule donnée lors du passage printanier avec un stationnement du 11 au 18/03/00 à l'étang de la Pétolée.


Un cas d'hivernage à l'étang de la Pétolée d'un individu du 03/01 au 08/03 en 2001.

Canard siffleur (*Anas penelope*) **H (90-15)**

La migration postnuptiale débute la première quinzaine de novembre en 1999 et 2001 et la seconde quinzaine d'octobre en 2000 (1 à 2 ind.). Sur le plan d'eau de Saint-Cyr, un maximum de 29 ind. le 19/12/99.

Hivernage régulier sur l'étang de la Pétolée avec 7 ind. en 1999, 8 en 2000 et 30 en 2001.

Le premier pic de la migration prénuptiale commence début février et le second pendant la première quinzaine de mars avec un maximum de 40 ind. Les dernières observations sont notées fin mars et début avril.

Canard chipeau (*Anas strepera*)**H, S (95-14)**

Les passages postnuptiaux et prénuptiaux s'étalent de septembre à avril en petits groupes avec un maximum de 36 ind. le 12/11/99 sur le plan d'eau de Saint-Cyr et de 16 ind. le 26/03/99 sur l'étang de la Pétolée.

Première nidification prouvée en Vienne : une femelle est accompagnée de 10 poussins le 01/06/99 sur l'étang Delage. Sur le même site le 17/06/00, une femelle est accompagnée de 8 jeunes (Voir l'article de Nicolas MORON Outarde n°41).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) **H, S (149-22)**

La migration postnuptiale débute en 2000 le 21/08 avec 5 ind. sur l'étang de Chez Séguier et en 2001 le 11/11 avec 3 ind. sur l'étang du Mollessard. Les maxima observés sont de 40 ind. le 13/12 en 1999 sur l'étang de Combourg, 12 le 25/12 en 2000 et 10 le 17/11 en 2001 sur l'étang de Chez Séguier.

La migration prénuptiale culmine en mars avec 100 ind. le 07/03 en 1999, 70 le 19/03 en 2000 et 140 le 10/03 en 2001, sur l'étang de la Pétolée.

50 ind. hivernent sur l'étang de la Pétolée en janvier 2000.

Canard Colvert (*Anas platyrhynchos*) **H, S (177-49)**

Le canard le plus commun du département dont une partie des effectifs provient d'élevages. Les premiers poussins sont notés le 21/04 en 99.

L'effectif record est de 1 200 ind. sur l'étang de Combourg le 08/08/01.


Canard Pilet (*Anas acuta*) **M, H (23-7)**

Le passage prénuptial s'étale de février à avril avec un maximum de 13 ind. le 09/03/99 à l'étang de la Pétolée.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) **M, E (42-10)**

Première observation le 13/03 en 1999 et dernière le 29/07 toujours en 1999.

La première preuve de nidification pour la Vienne nous a été rapportée le 29/07/99 sur l'étang Régnier à la Trimouille : 1 femelle avec 6 poussins.


Canard souchet (*Anas clypeata*) **H, M (103-15)**

Le passage postnuptial s'étale de fin août à mi-décembre avec 31 ind. au maximum le 10/11/01 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.
Le passage prénuptial donne lieu à de fréquentes observations de fin janvier à mai avec un maximum de 48 ind. le 20/03/99 à l'étang de la Pétolée.

Nette rousse (*Netta rufina*) **A (2-1)**

2 observations à l'étang de Maupertuis : un mâle le 17/08/00 et un second le 13/10/01.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) **H, S (222-19)**



Hivernage exceptionnel de 505 ind. sur l'étang de Beaufour en janvier 2001. L'effectif maximal sera atteint le 23/02/01 avec 790 ind. lors du passage printanier.

Deux années de suite des preuves de reproduction nous ont été fournies : 2 nidifications sur les étangs de la région de Pressac en 1999 et une en 2001 ; 4 nidifications sur l'étang de Beaufour en 2001.

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) **A (6-2)**

Un mâle observé sur la Vienne à l'Isle-Jourdain le 09/01/99.

Trois observations d'un ind. en octobre 2000, en janvier 2001 et en octobre 2001 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) **H, S (61-11)**

Observations aux passages de novembre à avril en petit nombre avec un maximum de 12 ind. le 26/12/01 au plan d'eau de Saint-Cyr.

Première nidification prouvée en Vienne : une femelle avec 9 canetons le 24/06/01 sur l'étang de Beaufour.

Fuligule milouinan (*Aythya marila*) **A (1-1)**

2 mâles observés les 13 et 14/01/01 à l'étang de Beaufour.

Macreuse noire (*Melanitta nigra*) **M (2-2)**

1 ind. le 28/12/99 à l'étang de Beaufour et 2 le 29/12/99 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

ACCIPITRIDIDAE

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) **E (23-18)**

Sa présence est notée dès le 26/03 en 2000 en forêt de Vouillé. Les preuves de nidification sont rares ; il est le plus souvent vu en chasse. Dernière observation sur le Pinail le 15/09 en 2001.

Aigle botté (*Hieraetus pennatus*) **M, (E ?) (2-1)**

Rare dans la Vienne. Les contacts sont exceptionnels et localisés. Sa présence à Chenevelles du 15/09/00 au 09/10/00 est l'unique donnée pour ces trois années.

Milan royal (*Milvus milvus*) **M (8-8)**

Observé principalement en passage d'automne et très peu au printemps.

Milan noir (*Milvus migrans*) **E (77-73)**

Dates extrêmes : le 08/03 en 2001 au Vigeant et le 11/08 en 2000 à Vouneuil sur Vienne.

Les plus gros rassemblements : 100 ind. le 11/07/00 à La Ferrière-Airoux et 54 le 06/08/01 au Vigeant.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) **S (50-45)**

Toujours pas de preuve de nidification certaine malgré l'observation d'un jeune de l'année à Saulgé en 2000 et de parades à Craon en 2001.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) **S (188-184)**

Reproduction probable ou certaine constatée à Archigny, Bellefonds, Champigny-le-Sec, Charrais, Chauvigny, Montmorillon, Quincy. Le secteur Pinail-Moulière abrite 6 à 23 couples selon les années.

Busard cendré (*Circus pygargus*) **E (63-57)**

Reproduction probable ou certaine constatée à Archigny et Craon. Le secteur Pinail-Moulière abrite 7 à 14 couples selon les années.

Buse variable (*Buteo buteo*) **S (193-185)**

Preuves de reproduction : une aire est rechargée le 09/02/00 à Coulonges, parades notées le 02/02/01 à Monts-sur-Guesnes, le 20/03/01 à Lathus et les 15 et 24/03/01 à Saulgé.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) **E (48-47)**

Dates extrêmes : le 01/04 en 2000 et le 30/09 en 2001

Pas de preuve certaine de nidification. Le plus souvent détectée lors des parades. Passage de 13 ind. en 1h le 12/05/01 à Oyré.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) **S (70-68)**


Pas de donnée de nidification certaine au travers des observations. Parades observées le 27/02/00 à Nouaillé-Maupertuis et le 03/04/00 à Château-Garnier.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) **S (15-14)**

Parades observées et couples observés en mars dans les grands massifs boisés.

PANDIONIDAE

Balibuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) **M (36-35)**



Principalement observé au passage de printemps (mars, avril), beaucoup moins de contacts en automne (août).

FALCONIDAE

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) **S (119-118)**

Reproductions certaines à Fleuré en 2001 et Poitiers en 2000, un accouplement observé le 20/03/00 à Château-Garnier.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) **E (50-48)**

Dates extrêmes : le 19/04 en 2000 et le 30/09 en 2001

Parades observées à Leigné-sur-Fontaine le 12/06/00, jeunes au nid à Nouaillé-Maupertuis en 2000, nid occupé à Saint-Cyr en 2000.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) H (10-10)

Observé de septembre à mars dans notre région.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) H (6-6)

Observé en période de dispersion postnuptiale (juillet) jusqu'à la fin de l'hiver.

PHASIANIDAE

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) S (18-17)

Statut difficile à apprécier du fait des nombreux lâchers d'élevages.

Perdrix grise (*Perdix perdrix*) S (6-5)

Notée sur seulement 3 communes dans les secteurs de plaine.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) E (11-11)

Premier contact : un mâle chanteur le 22/04/01 à La Puye.

Dernière observation le 15/09 en 2001 sur le Pinail.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) S (15-15)

Espèce chassable peu notée car bon nombre d'oiseaux sont issus d'élevages.

RALLIDAE

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) S (23-12)

Le Pinail et l'étang de Beaufour représentent la moitié des observations.

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*) S (96-59)

Présente sur l'ensemble du département.

Une seule donnée relative à la nidification le 19/04/00 à Montmorillon "Les Chaumes" avec un nid garni.

Un groupe de 13 ind. observé à La Puye deuxième décade de septembre 2000.

Foule macroule (*Fulica atra*) S, M (29-39)

42 données relatives à la nidification dont des parades le 26/03/00 sur l'étang du Molessard et l'observation de pulli de trois semaines le 22/04/01 à Archigny.

Le plus gros rassemblement se situe à Saint-Cyr avec 380 ind. en octobre 2000 et 518 en novembre 2001 en migration postnuptiale.

GRUIDAE

Grue cendrée (*Grus grus*) M (147-86)

Migration prénuptiale : les derniers oiseaux sont observés le 18/04/99 à Usson-du-Poitou.

Migration postnuptiale : les premiers oiseaux sont observés le 05/10/01 à Lathus. Voir l'article de Michel MASSON.

OTIDIDAE

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) E (32-22)

Dates extrêmes :

En 2000 : du 16/03 au 18/11.

En 2001 : du 16/04 au 05/08.

Rassemblements postnuptiaux les plus importants : 48 ind. au Rochereau en 2000 et 20 à Craon en 2001.

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) M (7-3)

Une observation en mars 2000 à Usson-du-Poitou sur l'étang de la Pétolée ; les 6 autres ont été faites en mai à l'étang Le Breuil.

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) M (3-3)

Migration prénuptiale : 1 oiseau le 03/05/01 sur l'étang Le Breuil

Migration postnuptiale : 4 ind. le 08/10/00 et 24 le 17/12/00 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

BURHINIDAE

Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) E, S (50-37)

Sur les 3 années, observé tous les mois, sauf en janvier. Sa présence en période hivernale est à rechercher.

Le plus grand rassemblement postnuptial comptait 80 ind. à Saulgé le 19/09/00.

CHARADRIIDAE

Petit gravelot (*Charadrius dubius*) M, E (37-16)

Observé de mars à juillet en 2000 et de mars à mai en 2001.

Parade et accouplement observés à Poitiers le 02/05/00 devant le local LPO, un couple avec 3 poussins le 25/05/00 à La Roche-Posay. Brève parade observée le 22/04/01 à La Roche-Posay et un couple avec 2 poussins le 15/05/01 sur un bassin d'orage de la ZA Saint-Eloi à Poitiers.

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) M (7-4)

Première observation le 14/05/01 et un maximum de 13 ind. le 18/05/01 sur l'étang Le Breuil.

La dernière observation s'est faite le 13/10 en 1999 sur l'étang de la Guingauderie.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) H (38-20)

Le comptage Wetlands fait état de 1 733 ind. en 2000 et 5 016 en 2001. Les plus importants regroupements sont sur le secteur de Lusignan : 620 en 2000 et 3 170 en 2001.

Première observation le 09/11/01 à Liglet, la dernière le 01/04/00 sur l'étang de la Pétolée.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) M (2-2)

2 données en 2001 : 1 oiseau le 18/05 sur l'étang Le Breuil et 1 autre le 06/06 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

Vanneau sociable (*Chestusia gregaria*) A (1-1)

1 ind. vu dans les plaines du Léché à Saulgé le 31/10/99 et les jours suivants.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) H, S (208-133)

Données de nidification en 1999 à Vouneuil-sur-Vienne et en 2001 à Bellefonds, Lathus, Leignes-sur-Fontaine, Saulgé.

Le comptage Wetlands donne les résultats suivants :

En 2000, 31 967 ind. avec une concentration maximum de 5 300 sur le secteur de Lusignan.

En 2001, 39 039 ind. avec une concentration maximum de 11 730 sur le secteur de Lusignan.

Usson-du-Poitou "fidélise" les vanneaux avec 3 000 ind. en 2000 et en 2001.

SCOLOPACIDAE

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) M (2-1)

2 ind. le 18/05/01 sur l'étang Le Breuil.

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) M (5-4)

Tous observés en passage postnuptial dont 4 à l'étang de La Guingauderie le 13/10/99.

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) M (2-2)

2 oiseaux observés en passage migratoire, un à l'étang de Chez Séguier le 6/10/00 et un autre le 11/05/01 à l'étang Le Breuil.

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) M (11-8)

4 ind. à l'étang Le Breuil le 18/05/01. C'est le bécasseau le plus observé dans la Vienne.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) M (22-5)

Présence régulière lors du passage prénuptial à l'étang de la Pétolée en 1999, 2000 et 2001. On note sur cet étang la présence de 8 oiseaux dès le 24/02/01, ainsi que 9 ind. en avril 2001 à l'étang Le Breuil. Un seul passage postnuptial est remarqué sur l'étang de Maupertuis avec 2 oiseaux le 20/09/01.

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) M (5-1)

Oiseau discret. Toutes les observations ont été réalisées sur la réserve naturelle du Pinail entre le 30/01/01 et le 13/03/01. Maximum de 9 ind. le 10/03/01.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) H (43-16)

Porte bien son statut d'hivernante : elle arrive fin juillet et repart mi-avril. Observée tout l'hiver sur les étangs du département, avec un maximum de 25 oiseaux présents sur la réserve naturelle du Pinail le 10/03/01.

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) H, S (10-8)

Un oiseau se nourrit dans un jardin boisé à Verrue le 17/02/01 et 3 croulent en Forêt de Moulière le 14/05/01.

Barge à queue noire (*Limosa limosa*) M (8-4)

Observé uniquement en passage prénuptial. 5 oiseaux observés à l'étang Le Breuil dont 2 en plumage nuptial le 07/05/01.

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) M (2-1)

2 ind. le 19/04/01 et 3 le 25/04/01 à l'étang Le Breuil.

Courlis cendré (*Numenius arquata*) S (52-22)

Beaucoup de données mentionnent des ind. en parade ou alarmant, ce qui signifie une preuve de nidification. Un seul poussin non volant a été observé à Lauthiers le 01/06/01.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) M (10-4)

Observé uniquement en passage prénuptial. 17 ind. ont été observés à l'étang Le Breuil le 17/04/01.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) M (44-8)

Présent du 22/03/01 au 23/05/01 à l'étang Le Breuil avec deux pics migratoires de 32 ind. le 20/04/01 et 47 le 18/05/01.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) M (37-14)

Principalement observé en passage prénuptial. 14 données à l'étang Le Breuil où l'on note sa présence du 05/04/01 au 18/05/01, dont 20 oiseaux observés le 01/05/01 ; 17 notés à Sillars le 26/04/01 et 12 à l'étang de la Pétolée le 19/04/01.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) M (33-18)

Observation régulière de mars à octobre sur l'ensemble du département.

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) M (13-7)

1 à 2 ind. observés sur l'ensemble des sites, sauf à l'étang Le Breuil où 16 oiseaux ont été notés le 20/04/01.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) M (66-24)

Le chevalier le plus observé dans le département. Absent les mois de décembre, janvier et juin. 3 stationnements importants en mai 2001 : jusqu'à 17 oiseaux à Craon dans une sablière, 19 à l'étang Le Breuil et 11 à l'étang de Beaufour.

LARIDAE**Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) H (38-15)**

Le laridé le plus observé dans la Vienne. Les colonies de nidification sont à rechercher. 500 ind. à Martaizé le 6/08/00, 90 dans un labour à Antran le 13/01/01. Le dortoir du plan d'eau de Saint-Cyr comptait 1 800 oiseaux en janvier 2000 et 1 500 en décembre 2001.

Goéland cendré (*Larus canus*) H (3-3)

Noté le 28/12/99 à la Fouchardière et à l'étang Clossat (comm. de Sillars) et 1 le 30/12/99 à l'étang de Beaufour.

Goéland brun (*Larus fuscus*) H (1-1)

2 ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 18/11/00.

Goéland argenté (*Larus argentatus*) H (2-1)

1 oiseau le 8/12/01 et 2 le 9/12/01 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

Goéland leucophée (*Larus michahellis*) H (1-1)

1 ind. de 2ème année mazouté observé sur la plaine de la Fouchardière à Sillars.

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) A (2-2)

1 trouvée affaiblie sous une haie dans un lotissement à Naintré le 1/11/00 et 1 trouvée morte au plan d'eau de Saint-Cyr le 06/01/00.

STERNIDAE**Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*) A (1-1)**

Première observation pour le département, mentionnée le 03/05/01 à l'étang Le Breuil.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) M (3-3)

4 ind. le 21/05/00 à Dangé-Saint-Romain. Oiseaux en parade avec offrandes de poissons, mais pas de nidification observée.

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) M (21-7)

Observation de 1 à 5 oiseaux en général sur chaque site. On note cependant la présence de 12 ind. à Archigny le 26/04/00 et 30 à l'étang Le Breuil le 29/04/01.

Guifette noire (*Chlidonias niger*) M (11-6)

Observation de 1 à 2 oiseaux en général. On note cependant la présence de 5 ind. au Molessard le 05/05/01 et 12 à l'étang Le Breuil le 09/05/01.

COLUMBIDAE**Pigeon colombin (*Columba oenas*) H, S (20-15)**

Rassemblements observés en octobre, novembre et décembre : 25 à l'étang de la Pétolée le 05/11/00, 45 à l'étang de Maupertuis et 65 à Leigné-les-Bois le 13/10/01, 35 à Montamisé le 14/12/01. Chant, parade et accouplement observés à Poitiers la première semaine de mars. Noté d'avril à juin en forêt de Moulière et sur les communes de Loudun et de Roiffé.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) H, S (187-118)

Rassemblements observés en décembre et surtout janvier : 35 à 10 000 oiseaux à Jouhet, Paizay-le-Sec, La Trimouille et La Ferrière-Airoux.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) S (59-24)

Aucune preuve de reproduction. Dortoirs notés à Nouaillé-Maupertuis le 21/03 (21 oiseaux) et à Saint-Léomer le 22/12 (10 oiseaux).

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) E (107-80)

L'arrivée est notée dès avril : date record le 3 à Poitiers
Premiers chanteurs notés le 24/04/01 à Antigny, La Ferrière-Ayroux, Saint-Cyr, Pindray, Saint-Georges-les-Baillargeaux et Saulgé.


Les observations les plus tardives sont notées au cours de la première quinzaine de septembre en rassemblements postnuptiaux (max : 40 ind. le 9/09/00 à Verrue).

CUCULIDAE**Coucou gris (*Cuculus canorus*) E (104-82)**

L'arrivée des premiers migrateurs se fait en mars (le 17, date la plus précoce en 2001) et se généralise dès le 23 de ce mois.

TYTONIDAE**Effraie des clochers (*Tyto alba*) S (92-45)**

Sur les 92 données, 35 correspondent à des oiseaux trouvés morts sur les routes.

**STRIGIDAE****Petit-duc scops (*Otus scops*) M (3-3)**

Rare et localisé. Noté à Lavauseau, Cissé et Neuville-de-Poitou.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) S (34-26)

Cette petite chouette est souvent signalée plusieurs années de suite sur les mêmes sites.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) S (31-13)

Principalement noté comme chanteur.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) S (25-20)

Ce hibou se signale souvent par ses rassemblements hivernaux (15 ind. en décembre 2000 et 20 en décembre 2001 à Arcay). En période de reproduction, les cris des jeunes trahissent leur présence (observés en juin à Fleuré et Buxerolles) et les chasses en plein jour en terrain découvert ne sont pas exceptionnelles.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) H (3-3)

Rare et localisé en terrain découvert à Charroux le 12/05/00 sur le même site qu'en 1993, ainsi qu'à Coulombiers et La Ferrière-Ayroux. Sa présence est constatée les années d'abondance en campagnols.

CAPRIMULGIDAE**Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) M (15-10)**

Localisé dans les boisements clairsemés, les landes et les lisières forestières.

Dates extrêmes : 10/05/00 et 26/09/99.

APODIDAE**Martinet noir (*Apus apus*) E (28-17)**

Dates extrêmes : 03/04/00- 22/10/00.

ALCEDINIDAE**Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) S (80-35)**

Commun dans le département.

MEROPIIDAE**Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) E (18-8)**

Nicheur sur quelques sites connus du département (Mazerolles, Saint-Pierre-de-Maillé, Lussac-les-Châteaux, La Roche-Posay).
Dates extrêmes : 08/05/00 et 31/07/01

UPUPIDAE**Huppe fasciée (*Upupa epops*) E (106-58)**

Notée nicheuse à Joussé en 2000 et à Quincay en 2001 (observation d'une deuxième nichée le 04/08/01).

Dates extrêmes : 08/03 en 2000 à Vivonne et le 08/10 en 2001 à Lathus.

PICIDAE**Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) E (12-9)**

Dates extrêmes : 02/05/00 et 03/09/01. Noté chanteur le 07/05/00 en Forêt de Moulière.

Pic vert (*Picus viridis*) S (106-48)

Noté nicheur à Saulgé le 06/06/00.

Pic noir (*Dryocopus martius*) S (48-29)

Noté sur l'ensemble du département.

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) S (108-47)

Noté sur l'ensemble du département. Une seule donnée de reproduction : nourrissage de jeunes le 20/05/00 à La Chapelle-Moulière.

Pic mar (*Dendrocopos medius*) S (13-11)

Localisé dans les grands massifs du département. Découvert en Forêt de Scévilles en 2001.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) S (39-23)

Noté sur l'ensemble du département.

ALAUDIDAE**Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) E (13-6)**

Contactée sur seulement 3 communes (Neuville-de-Poitou, Vendeuvre-du-Poitou et Charrais). 7 chanteurs sur Vendeuvre en 1999.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) S (33-30)

Absence de contact en Sud-Vienne.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) S (81-81)

Principalement présente dans l'est et le sud du département.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) S (124-120)

Noté sur l'ensemble du département.

HIRUNDINIDAE**Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) E (28-21)**

Première donnée : 1ère quinzaine de mars.

Dernières données : 1ère semaine de septembre.

A noter la présence de plusieurs colonies :

50 couples dans une sablière à Saint-Pierre-de-Maillé en 2000.

2 jeunes encore au nid le 02/09/00.

25 couples à Sillars en 2000.

2 colonies à Vouneuil-sur-Vienne d'environ 50 nids au total en 1999.

1 colonie dans une sablière à Jouhet.

64 ind. observés à Mouterre-sur-Blourde le 01/07/01.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) E (112-73)

Premier ind. le 05/03/00 à l'étang de l'Ecotière.

Dernières données : 3ème semaine de septembre avec quelques données (5) jusqu'à mi-octobre, on peut noter 21 hirondelles vues le 13/10/00 à l'étang de Maupertuis.

Les premiers rassemblements débutent au début du mois d'août, comme à Verrue le 06/08/00 où 64 ind. ont été observés.

2 regroupements d'au moins 150 ind. à Archigny et à l'étang Le Breuil (cf. Hirondelle de fenêtre)

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) E (40-23)

Premier individu le 10/03/00.

Dernières données : début octobre.

Rassemblement de 100 ind. le 19/08/01 et 72 le 17/09/01 à Chauvigny.

Une centaine d'ind. le 01/05/01 à l'étang Le Breuil, 86 ind. dans le quartier de Saint Eloi.

5 nids occupés le 01/05 à l'abbaye de Saint-Savin ; le 12/06 éclosions à Chauvigny et à Poitiers ; 24/08, juvéniles prêts à l'envol à Poitiers.

A noter la destruction de nids à Migné-Auxances le 17/06/01.

MOTACILLIDAE

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) E (12-9)

Très peu de données, présent de mai à juillet.

Parade le 10/07/99 à Mazerolles.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) E (76-57)

1er individu le 29/03/01.

Dernières données : 2ème semaine de septembre.

Nourrissage à La Chapelle-Moulière le 18/05/01 ; 5 poussins au nid à Bonneuil-Matours le 23/05/01.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) H, S (51-35)

Noté surtout en hiver, très peu de données de juin à octobre, surtout pour 2001. Nicheur régulier sur le Pinail. 80 ind. le 22/10/00 à Sillars, 50 le 19/10/00 et 20 à Saint-Cyr le 11/10/01.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) M (4-2)

1 ind. à l'étang de l'Ecotière le 14/10/00, 1 ind. à l'étang Le Breuil de la mi-mars à la 1ère semaine d'avril. 4 ind. vus le 31/03/01

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) E (40-22)

1ères données : 3ème semaine de mars.

Dernières données : mi-septembre (1 donnée le 1/10/00).

20 d'ind. observés à Usson-du-Poitou le 24/03/99, à Sillars le 24/03/01, à Nieuil-L'Espoir le 19/04/01 et à Vouneuil-sur-Vienne le 15/09/01.

5 couples nicheurs à Craon (voir l'article de François Lecomte et Katia Lipovoï, Outarde 42).

Observée en migration à partir de la 3ème semaine d'août.

Présence d'1 bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima*) à Craon le 10/05/01.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) S (51-38).05

Peu de données de novembre à janvier.

Mâles chanteurs le 01/05/01 à Saint-Savin et 1 juvénile observé le 18/07/01 à Lussac-les-Châteaux.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) S (82-58)

Dortoir dans les arbres devant la gare à Poitiers en décembre 2000.

Quelques rassemblements en mars 2001 : 18 ind. à Nieuil-l'Espoir, 35 à Saulgé. D'autres rassemblements de septembre à octobre dont 20 ind. à Vouneuil-sur-Vienne le 24/10/01.

CINCLIDAE

Cincla plongeur (*Cinclus cinclus*) S (1-1)

1 observation d'1 ind. le 14/05/01 à Lathus-Saint-Rémy.

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) S (121-115)

Présent sur tout le département.

Nourrissage de jeunes le 07/06 à Chauvigny.

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) S (71-62)

Présent sur tout le département.

Parade le 12/02/00 à Smarves.

TURDIDAE

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) S (175-150)

Présent sur l'ensemble de la Vienne. Nourrissages observés le 20/05/00 à La Chapelle-Moulière et le 13/06/00 à Angles-sur-l'Anglin.

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) E (113-45)

Premier chant de l'année le 03/04 à Poitiers en 2000, le 25/03 à Bignoux en 2001. D'avril à juin, il est entendu très régulièrement. Dernier chant le 23/08 en 2001.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) M (1-1)

1 observation d'un mâle le 13/03/01 sur le Pinail à Vouneuil-sur-Vienne.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) E, S (58-44)

Premier chant le 18/02 en 1999, le 12/03 en 2000 et le 10/03 en 2001.

Plusieurs cas de nidification observés de mi-mai à juillet.

Sa présence est notée hors de la période estivale de manière sporadique.

Présence de 7 ind. à Poitiers le 12/01/01.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) E (35-26)

Premières données: fin mars.

Dernières données : 3ème semaine d'octobre.

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) M (9-8)

Passage pré-nuptial noté de début avril à fin-mai.

Passage post-nuptial : fin-août / début septembre.

Tarier pâtre (*saxicola torquata*) E, S (89-66)

Présent toute l'année.

A signaler, 3 ind. retrouvés morts (2 mâles et 1 femelle) le 30/04/01 à Valdivienne.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) M, E (43-27)

Premières données : mi-mars.

Dernières données : 3ème semaine d'octobre.

Nourrissage de juvéniles le 06/07/01 à Poitiers.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) M (1-1)

1 observation à La Puye le 09/04/00.

Merle noir (*Turdus merula*) S (259-112)

Présence notée dans tout le département.

Grive litorne (*Turdus pilaris*) H (19-18)

Premières observations : début décembre.

Dernières observations : début avril.

Plusieurs rassemblements ; 79 ind. à Bouresse le 15/01/99, 50 à Saulgé 02/04/00, 60 à La Chapelle-Montreuil et 90 ind. à Vernon le 13/01/01, 30 à Chauvigny le 13/04/01.

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) S (101-75)

1ers chants début février

Notée sur l'ensemble du département

Grive mauvis (*Turdus iliacus*) H (73-61)

Premières données : 1ère semaine de novembre.

Dernières données mi-janvier avec une date extrême le 25/02/00.

300 ind. à Monthoiron et 85 à Saint-Martin-l'Ars le 13/01/01.

Grive draine (*Turdus viscivorus*) S (50-33)

Groupe composé d'une quinzaine d'ind. à Verrue le 06/08/00.

SYLVIIDAE**Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)** S (19-19)

1er chant noté le 26/03/00 à Usson-du-Poitou.

Pas de contact en période hivernale. La Bouscarle de Cetti est toujours une espèce assez rare dans le département de la Vienne.

Cisticole des joncs (*Cisticola jucidis*) S (12-11)

Premier contact le 16/01/01 sur la Réserve du Pinail.

Premier chant le 13/04/01 à Cherves, chanteurs notés à Quinçay et à Sillars.

5 ind. le 28/04/01 à l'Étang de Beaufour.

La Cisticole des joncs est une espèce rare dont les populations locales se rétablissent lentement des hivers rigoureux des années 1980 et 1990. Elle est réapparue dans la Vienne en 2001.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) E (17-11)

Premier contact le 07/04/01 et dernier contact le 01/08/00 sur le Pinail.

Chanteurs également notés à Bellefonds, Chauvigny, Dissay et Monthoiron.

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) E (16-5)

Premiers chants le 24/03/01 à Moulismes et à l'Étang de Beaufour.

Dernier contact le 30/07/00 à Monthoiron.

Le Phragmite des joncs a une répartition extrêmement localisée : 11 des 16 données proviennent de l'Étang de Beaufour.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) E (19-15)

Premier chant le 26/04/99 sur l'Étang de la Gère à Journet.

Dernières observations le 28/06/00 à Poitiers et Biard.

Noté chanteur à Chiré-en-Montreuil, Craon, Guesnes, Jouhet, Journet et Saulgé.

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) E (79-75)

1er chant le 26/04/99 à Saulgé et dernier contact le 17/08/00 à Journet.

Preuves de reproduction certaine à Guesnes le 20/05/01 avec une construction de nid et un nourrissage à Sillars le 08/06/00.

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) S (42-29)

Premier chant le 15/01/01 à La Chapelle-Moulière.

Principalement présente en Moulière-Pinail (27 données) et en Montmorillonais (qui est probablement sous prospecté avec 8 données). Également notée à Chalais, Béruges, Iteuil, Vellèches, Oyré et Chauvigny.

Voir l'article d'Eric Jeamet sur la Fauvette pitchou sur la réserve naturelle du Pinail.

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) A (5-1)

Nouvelle espèce pour le département.

Observation exceptionnelle d'un mâle de cette fauvette méditerranéenne du 04/04 au 12/04/01 dans les jardins de Poitiers.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) E (101-83)

Premier chant le 08/04/00 à Antigny et un dernier contact tardif le 19/11/01 à Nouaillé-Maupertuis, la majorité des fauvettes grisettes quittant notre région habituellement en août.

Deux preuves de nidification pour la période considérée à Avanton où un adulte nourrit dans un champ de colza le 23/05/00 et à Scorbé-Clairvaux avec un nid prédaté par une Vipère aspic le 28/05/00.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) E (46-37)

Premier contact le 10/04/00 à Ingrandes et dernière observation le 09/09/00 à Chauvigny.

Chanteurs notés à Chauvigny, Mauprévoir, Mignaloux-Beauvoir, Nieuil-l'Espoir et Pressac.

Une seule preuve de nidification à Montreuil-Bonnin avec l'observation d'un transport de nourriture et d'adultes alarmant le 07/06/00.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) E, S (167-130)

Premier chanteur le 31/01/01 à Châtellerault.

Sensible augmentation des observations à partir d'avril en relation avec le retour de la fraction migratrice des populations. Le nombre d'observations chute après la fin juillet. Seulement notée nicheuse de manière certaine à Berthegon, La Bussière, Chauvigny, Lathus-Saint-Rémy.

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) E (31-22)

Premier chanteur particulièrement précoce le 29/03/01 à Vouneuil-sur-Vienne.

Également noté chanteur à La Chapelle-Moulière, Chauvigny, Monthoiron, Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

Dernier contact le 05/07/00 à Civaux.

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) E (14-7)

Premier chanteur le 10/04/00 à Ingrandes et dernier contact avec 3 ind. à Saint-Georges-lès-Baillargeaux le 26/06/00.

La majorité des observations ont été faites en Forêt de Moulière en mai-juin.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) S (170-131)

Premier chant le 17/03/01 à Lathus-Saint-Rémy.

Aucune preuve de nidification certaine. Les observations sont en nette augmentation à partir du mois d'avril et concernent très certainement des ind. cantonnés.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) E (10-10)

Premiers contacts le 25/03/01 à Journet et à Sillars et dernière observation le 22/09/01 à Buxerolles.

Noté chanteur également à Fleuré, Chauvigny et à Saint-Laon.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) S (15-14)


Un maximum de 13 oiseaux ensemble à Béruges le 28/12/01.
La majorité des observations a été réalisée en hiver. Les données printanières proviennent de Angles-sur-l'Anglin, Ingrandes, Montamisé et Saint-Léomer.

Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*) S (43-39)

Premier chant noté à Chauvigny le 12/04/01.
4 oiseaux ensemble le 17/12/00 à la Chapelle-Moulière.

MUSCICAPIDAE**Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) E (35-32)**

Premier chant le 06/05/00 à la Chapelle-Moulière.
Noté comme nicheur certain à Châtellerault et à Saint-Sauveur.
Dernier contact le 22/09/01 à Buxerolles.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) M (20-19)

Principalement observé en migration postnuptiale (un seul mâle observé en avril à Fleuré). Le passage postnuptial s'étale du 13/08 au 22/09 mais 75 % des migrateurs sont observés entre le 20 août et le 10 septembre.

AE GITHALIDAE**Mésange à longue queue (*Aegithalos*****caudatus) S (73-61)**

2 preuves de reproduction certaine à La Puye et à Nouaillé-Maupertuis.

PARIDAE**Mésange nonnette (*Parus palustris*) S (40-31)**

Premier chant le 05/03/00 à Château-Garnier.

Mésange huppée (*Parus cristatus*) S (14-13)

Peu de données. 4 ind. ensemble le 15/01/01 à la Chapelle-Moulière.

Mésange noire (*Parus ater*) S (26-19)

4 données au printemps, toutes les autres en hiver.
21 oiseaux ensemble le 22/10/00 à Sillars.

Mésange bleue (*Parus caeruleus*) S (226-82)

Premier chant le 11/02/01 à Chauvigny.
Seulement deux preuves de reproduction certaine à Bonnes et à la Chapelle-Moulière.

Mésange charbonnière (*Parus major*) S (241-105)

Premier chant le 21/01/01 à La Puye.
Nidification prouvée sur seulement 6 communes (Joussé, Saint-Benoît, Chauvigny, Poitiers, Lathus-Saint-Rémy et Chauvigny).
Un maximum de 12 oiseaux ensemble le 09/12/01 à Nouaillé-Maupertuis.

SITTIDAE**Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) S (53-44)**

15 chanteurs notés le 23/03/01 au Bois de Saint-Pierre.

CERTHIIDAE**Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) S (95-82)**

Aucune preuve de reproduction certaine pour la période considérée de cette espèce pourtant très commune.

ORIOOLIDAE**Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) E (69-59)**

Premier contact le 25/04/00 au Vigeant et 1er chant le 29/04/99 à Pressac.

3 ind. en parade le 09/05/00 à Nouaillé-Maupertuis, un oiseau alarme le 20/05/01 à Monts-sur-Guesnes, un couple nourrit le 12/07/01 à Saint-Pierre-de-Maillé. Dernière observation le 28/08/00 à Nouaillé-Maupertuis.

LANIIDAE**Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) E (88-69)**

1er contact le 07/05/00 à Saulgé et dernier contact le 01/09/00 à Joussé.

Parades observées le 22/05/01 à Archigny et à Chenevelles.
Nourrissage le 06/07/00 à Sillars et 2 familles observées le 26/07/00 à Sillars. Une femelle trouvée morte le 06/06/00 sur la route à Lussac-les-Châteaux.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) H (15-1)

Cet oiseau a été identifié comme appartenant à la sous-espèce (ou espèce ?) méridionalis. L'individu noté le 25/02/00 a probablement hiverné sur le site de Château-Garnier. L'hivernage complet a été prouvé pour l'hiver 2000/2001 avec un individu noté du 07/10/00 au 10/03/01. En 2001, le site était occupé le 07/10 par probablement le même oiseau fidèle à ce lieu d'hivernage localisé au nord de son aire de reproduction.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) E (34-29)

Premier individu noté le 03/05/00 à Jazeneuil et dernière observation le 26/07/00 à Sillars. La majorité arrive à la mi-mai et repart fin juillet.

Reproduction prouvée à Lathus-Saint-Rémy et à Saulgé avec respectivement l'observation d'un accouplement le 13/05/01 et de juvéniles volants le 19/07/00.

25 des 27 données proviennent de l'extrême sud-est du département. Les 2 autres concernent le pays Mélusin.

CORVIDAE**Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) S (99-66)**

Pas de mention particulière pour cet oiseau, présent sur tout le département. Observations faites tout au long de l'année avec une augmentation d'avril à mai au moment des parades.

Pie bavarde (*Pica pica*) S (97-51)

Sortie des jeunes au mois de mai, présence dans tout le département. Un maximum de 35 ind. sur le site du plan d'eau de Saint-Cyr le 05/10/00.

Choucas des tours (*Corvus monedula*) S (17-15)

Des groupes de 50 ind. notés à l'Écotière de Bellefonds en octobre 2001 et de 60 au Petit Breuil à Saint-Savin.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) S (19-16)

Les données de la base ne reprennent pas l'enquête corbeaux freux nicheurs (voir l'article Outarde 42 sur les colonies de nidification).

Cornelle noire (*Corvus corone*) S (185-134)

Espèce observée tout au long de l'année en petits nombres avec des maxima d'une quinzaine ind.

STURNIDAE**Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) S (129-89)**

De très gros groupes observés de novembre à janvier comptant jusqu'à 1 000 ind.

PASSERIDAE**Moineau domestique (*Passer domesticus*) S (81-40)**

Chanteurs notés dès le mois de mars, quelques rassemblements observés en hiver dont 55 ind. en novembre 2000 à Vouneuil-sous-Biard.

Moineau friquet (*Passer montanus*) S (12-11)

Observations principalement réalisées d'avril à mai au moment des parades et de la construction des nids. Absence d'observation en juin, juillet, septembre, octobre et novembre.

Moineau souldie (*Petronia petronia*) S (7-1)

Le golf de Saint-Hilaire de Roiffé est le seul site connu de la Vienne avec 5 couples nicheurs en 2000. Une première nichée notée en juin et une seconde en août. Voir article Outarde 41.

FRINGILLIDAE**Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) S (223-155)**

Chant entendu du mois de février à juin, de nombreuses bandes observées en hiver de décembre à janvier (200 le 16/12/00 à Jouhet).

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) H (16-13)

Noté d'octobre à avril avec un maximum de 50 ind. à La Ferrière-Airoux le 22/01/00 et le 21/03/00 à Nouaillé-Maupertuis toujours en plumage d'hiver.

Serin cini (*Serinus serinus*) E (42-38)

Bien que classé comme estivant dans la Vienne, quelques ind. sont vus en hiver : le 28/12/00 à Lusignan, le 7/01/00 à Poitiers et le 9/12/01 à Saint-Cyr. Premier chanteur le 11/02/01 à Chauvigny.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) S (118-92)

Présent toute l'année, chants entendus de février à mai. Une femelle ravitaillée au nid le 20/05/01 à Monts-sur-Guesnes. Un individu bagué observé le 14/01/01 à Saint-Pierre-de-Maillé.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) S (125-122)

Observé en bandes en hiver dont une de plus de 1 000 ind. le 21/03/01 à Nouaillé-Maupertuis. Noté chanteur dès la mi-mars.

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) H (27-21)

Les premiers arrivent à la fin septembre et les derniers sont vus à la mi-mars. Un maximum de 40 ind. à Bellefonds le 15/10/00.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) S (85-58)

Les chanteurs se sont manifestés de février à mai. Quelques bandes de 15 à 40 ind. sont vues de novembre à février.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) S (22-21)

Trois couples observés en avril 2001 à Oyré se nourrissant sur des ormeaux.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) S (61-38)

Des bandes de 20 à 50 ind. observées sur les communes de Nouaillé-Maupertuis, Asnières-sur-Blour, Verrues de décembre à mars.

ENBERIZIDAE**Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) S (95-87)**

Chanteurs notés de mars à juin. Nourrissages de jeunes observés en juin. A noter un groupe de 20 ind. le 16/12/01 au Petit Breuil de Saint-Savin.

Bruant zizi (*Emberiza cirrus*) S (99-78)

Un groupe de 11 ind. le 11/02/01 à Chauvigny. Les chants sont entendus de janvier à juin et des transports de matériaux observés en juin.

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) E (10-9)

Toutes les observations proviennent des plaines de Neuville et de Mirebeau, les dernières observations en début juin par manque d'observation. 82 mâles cantonnés en 1999. (voir article de Pierre Guignard, Outarde n° 41).

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) H/S (33-24)

Espèce surtout notée d'octobre à mars, seules deux observations en dehors de cette période. Des dortoirs ont été observés : 50 ind. le 11/01/01 au CHU de Poitiers, 50 à La Puye au Grand étang le 21/01/01, 40 le 14/01/01 et 88 le 30/01/01 dans la réserve du Pinail.

Bruant proyer (*Miliaria calandra*) S (40-38)

Vu dans tout le département seul ou par deux. Seul un regroupement de 10 ind. a été noté à Vouneuil-sous-Biard le 17/11/00. Chanteur d'avril à juin.

Remarque concernant l'étang Le Breuil à Nieuil-l'Espoir :

La forte pluviométrie du printemps 2001 a provoqué l'inondation des champs entourant l'étang et donc l'élargissement de la surface en eau sur plusieurs hectares. Ces conditions favorables combinées à une forte pression ornithologique (5 observateurs, 35 fiches) a permis l'observation de 66 espèces du 21/02 au 24/05.

