

Synthèse des données ornithologiques des années 2002 – 2003 – 2004

Préambule

La rédaction de cette synthèse des années 2002 – 2003 – 2004 a été assurée par :


| | |
|-------------------|---|
| Roger BOUARD | GAVIIDAE, PODICIPEDIDAE, PHALACROCORACIDAE, ARDEIDAE, CICONIIDAE |
| François LECOMTE | ANATIDAE |
| Benoît VAN HECKE | ACCIPITRIDAE, PANDIONIDAE, FALCONIDAE |
| Bruno FLEURANT | PHASIANIDAE, RALLIDAE, GRUIDAE, OTIDIDAE, BURHINIDAE |
| Raphaël BUSSIÈRE | RECURVIROSTRIDAE, CHARADRIIDAE, SCOLOPACIDAE, LARIDAE, STERNIDAE |
| Gérard NOËL | COLUMBIDAE, CUCULIDAE, TYTONIDAE, STRIGIDAE |
| Thomas WILLIAMSON | CAPRIMULGIDAE, APODIDAE, ALCEDINIDAE, MEROPIIDAE, UPUPIDAE, PICIDAE |
| Julien VENTROUX | ALAUDIDAE, HIRUNDINIDAE, MOTACILLIDAE, TROGLODYTIDAE, PRUNELLIDAE, TURDIDAE, MUSCICAPIDAE, LANIIDAE |
| Johan TILLET | SYLVIIDAE, AEGITHALIDAE, PARIDAE, SITTIDAE, TICHODROMADIDAE, CERTHIIDAE, REMIZIDAE |
| Daniel GILARDOT | ORIOLIDAE, CORVIDAE, STURNIDAE, PASSERIDAE, FRINGILLIDAE, EMBERIZIDAE |

Elle s'appuie sur les données enregistrées dans la base informatique "Bdnat" de la LPO Vienne développée par Patrice THOUVENIN installée en 2000.

Pendant la rédaction, nous avons rencontré quelques difficultés, il nous manquait souvent des précisions vis-à-vis du comportement des oiseaux (chant, transport de nourriture, parades, défenses de territoire, etc.) et surtout des commentaires sur le statut des oiseaux (nicheur, hivernant ou de passage, etc.).

Pour cette synthèse des données ornithologiques des années 2002 – 2003 – 2004, le nombre d'observateurs pour chaque année est de l'ordre d'une centaine et regroupe 165 observateurs pour les trois années. On constate que le nombre de données a régulièrement augmenté pour passer de 4000 en 2002 à plus de 10000 en 2004.

Les faits marquants concernent l'hivernage du Plongeon imbrin, des observations de Fuligule à bec cerclé, Pygargue à queue blanche, Phalarope à bec étroit, Crabier chevelu, Elanion blanc et Rémiz penduline. Le Tichodrome échelette et la Pie-grièche méridionale hivernent dans le département. En période estivale, on notera un Blongios nain en juillet, et la reproduction du Fuligule milouin et du Faucon pèlerin, auxquels s'ajoute une première observation de la Rousserolle verderolle. Enfin, un déclin se dessine pour l'Alouette calandrelle.



Evolution du nombre de données et d'observateurs par année

■ Nb de données ●— Nb d'observateurs

Liste des observateurs

Vivien AIRAULT - Raymond ALSAC - Dominique ANTIGNY - Fabrice ANTUNES - Michel ARRIGONI - Antony AUGUIN - Sébastien BAILLARGEAT - Nadine BARLIER - Jean-Jacques BEALU - Jean-Jacques BEAU - Nathalie BENDER - Danielle BERGERON - Monique BERNERON - Jack BERTEAU - Jean-Pierre BERTHAULT - Gerard BONNEAU - J.B. BONNIN - Roger BOUARD - Jean BOUIN - Bernard BOULAY - Laurent BOURDIN - Jaqueline BOURRY - MICHEL BRAMARD - Daniele BREANT - Eric BRECHET - Claire BRETHERS - Isabelle BRUNET-BLAY - Guenaël BURBAN - Raphaël BUSSIÈRE - Rémi CABIROL - Jean-Marc CARIOU - MICHEL CAUPENNE - Pascal CAVALLIN - Brigitte CERNON - Jean Claude CHEMA - Thierry CHERIOT - Patrice CHOISY - Marie-Claire COLINOT - Joël CORDEAU - Pierre COUSIN - Jean-guy COUTEAU - Bernard & Marie-Noëlle COUTURAUD - Anthony COX - Charlotte DE LA PORTE DES VAUX - Alain DELAGE - Christine DELLIAUX - Cathy DELORD - Luc DELOURME - Claude DEMAY - Chantal DESCHAMPS - Jean-Claude DESCOMBES - Soline DESIRE - Pamela DOUTH WAITE - Thierry DUBOIS - Bruno DUBRAC - Samuel DUCEPT - Jean-Marc DUMAS - Louis DUPAS - Anne DUVERGER - JACQUELINE DUVERGER - Serge FAILLET - Bruno FILLON - Bruno FLEURANT - Christian FLORENT - Marie-Laurence FORTIER - Serge FOUILLET - Germain FOUILLEUL - Arnaud FOURRE - Jeanine FRADIN - Françoise FRANCO - François FREMONT - Pascal GABARD - MIGUEL GAILLED RAT - Bernard GAROTIN - Véronique GAUDUCHON - Sophie GAUTHIER - Christian GERARD - Daniel GILARDOT - Vincent GILET - Claudine GIRARD -

Anne GODIN - Michel GRANGER - Freddy GRELLIER - Sophie GREMILLET - Jeunes GROUPE - Jean GUERIN - Mireille GUERY - Pierre GUIGNARD - Patrica GUILLAUME - Daniel GUILLET - Bernard GUIMBAUD - Fabienne GUSSEAU - Pierre GUY - Michel HAINAUT - Isabelle HERAULT - Jean Luc HERPIN - Thomas HERRAULT - Christophe HERVE - ERIC HOLTHOF - Matthieu HOLTHOF - Danièle HUTEAU - Eric JEAMET - Frédéric JIGUET - Loïc JOMAT - Anthony JOSSE - François KIHM - Jean LANGOUMOIS - Philippe LAROCHE - Francis LAURENTIN - François LECOMTE - Anne LEJEUNE - Alain LEROUX - Christian LHOMME - Pascal LHOUTELLIER - Bernard LIEGEOIS - Katia LIPOVOÏ - Delphine MAÇONNERIE - Christophe MARTIN - Michel MASSON - Jean MENIGAUD - Alain METAIS - Michel METAIS - Sylvie MICHEL - Hélène MICHON GAROTIN - Vincent MILARET - Annick MOREAU - Elisabeth MOREAU - Roger MOREAU - Nicolas MORON - Françoise MORTREUIL - Cédric MROCZKO - Simon NAU - Gérard NOEL - Alain OLLIVIER - Régis OUVRARD - Reine PAPILLON - Didier PAPOT - Alain PEIGNAULT - Sophie PEROT - Aurélie PEROUX - Alain PERSUY - Jean-Claude PETIT - Claudie PICHON - Yves PINEAU - Pierre PLAT - Tony PREDOT - Olivier PREVOST - Emmanuel RICHARD - Jean-Michel RICHET - Gérard RICHIER - Marie ROMAIN - Denis ROYER - Philippe SAUVAGET - Franck SIMONET - Chantal TERRASSON - Benoît TESSIOT - Christian THOMAS - Johan TILLET - Noël TOURAINE - Stéphane TROUBAT - Benoît VAN HECKE - Michel VATRE - Julien VENTROUX - Stéphane VILARUBIAS - Josiane WHITE.

Légende

| nom français (*) | nom scientifique (*) | statut dans le département de la Vienne (**) | nombre d'observations et nombre de sites |
|---|----------------------------|--|--|
| Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | H | 142-43 |
| Premiers contacts dès fin septembre avec 10 oiseaux à Saint-Jean-de-Sauves le 29/09/04. Les plus gros rassemblements apparaissent dans la dernière décade de décembre (2000 oiseaux à Coulombiers le 25/12/04 et 3000 à Jazeneuil le 09/01/04). Derniers contacts fin mars : 5 oiseaux le 28/03/04 à Saint-Sauvant. | | | |

(*) : d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2003.
 (**): Statut dans le département de la Vienne :
 S : Espèce observable tout au long de l'année
 E : Espèce observée uniquement en période de reproduction
 M : Espèce observée uniquement en période de migration
 H : Espèce observée en hivernage
 A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition
 ? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse

GAVIIDAE**Plongeon imbrin (*Gavia immer*) H (15-1)**

1 juv. du 13/11/02 au 08/01/03, accompagné d'un adulte du 09/12/02 au 08/01/03 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

PODICIPEDIDAE**Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) S (57-22)**


Maximum observé en migration postnuptiale : 8 ind. le 27/09/02, et 7 ind. le 13/10/03 sur l'étang de Maupertuis. Indices de reproduction à Journet, Saint-Léomer et Montmorillon.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) S (243-58)

Nicheur certain sur de nombreux étangs : étangs de Borbou, de Combourg, de Beaufour, de Vacheresse, de la grande Aubue, de la Font, en Forêt de Moulière, à Biard et à Bellefonds. Rassemblements hivernaux : 13 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr le 17/11/02, 12 ind. à l'étang Chez Séguier le 21/12/02, 32 ind. au lac de Saint-Cyr le 05/01/04, 11 ind. à l'étang La Guingauderie (Adriers) le 15/02/04, 20 ind. à Lathus-Saint-Rémy le 25/10/04.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) M (11-5)

Entre autres, 4 ind. à Coulombiers (étang de Maupertuis) le 20/09/02 et 7 ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 16/04/03.

PHALACROCORACIDAE**Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) S (278-55)**

Présent dans le département de la Vienne toute l'année, avec un pic en janvier. Un maximum de 173 ind. à La Roche-Posay à la mi-novembre 2002, et 124 ind. sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 11/01/03. Un ind. avec trois poussins déjà emplumés le 24/03/04, seule mention de la nidification dans le département de la Vienne.

ARDEIDAE**Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) E (2-1)**

Un oiseau observé dans la roselière de l'étang de Pétaveau le 04/07/03 et revu le 20/07/03 au même endroit, nicheur probable.

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) M (17-11)

Observé aux deux passages. 3 juv. volants à Vouneuil-sur-Vienne (sablère les Ardentes) le 08/08/02.

Crabier Chevelu (*Ardeola ralloides*) M (1-1)

Un ind. à Cenon-sur-Vienne (Les Varennes d'Ile, ancienne gravière en eau) le 15/05/03.

**Héron garde-bœufs (*Bululus ibis*) M (16-9)**

Maximum de 7 ind. à l'étang de Maleffe le 23/03/04.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) M (31-17)

Présence d'un à trois ind. tout le long de l'année avec des observations plus nombreuses en août et décembre.

Grande Aigrette (*Egretta alba*) M (74-18)

Présence d'un, deux ou trois ind. d'octobre à mai. A noter 21 ind. à Sillars le 28/10/04 et 27 à l'étang de Beaufour (à sec) le 04/11/04.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) S (398-100)

Héronnières avec 11 à 12 nids à Smarves (bois de Saint-Pierre) le 17/04/02, 132 nids à Pressac (étang des Bergères) le 20/03/03, 88 nids occupés à Saulgé le 13/04/03, une colonie de 6 nids au minimum à Vouneuil-sur-Vienne (étang de la Grande Aubue) le 04/05/03, 60 ind. sur la colonie Saulgé (étang de Beaufour) le 01/02/04, 8 ind. sur la héronnière de Smarves (bois de Saint-Pierre) le 15/02/04, début de construction de 4 nids à Verrières (étang des Forges) le 15/02/04, 45 nids occupés avec 90 ind. à Usson-du-Poitou (étang de la Pétolée) le 21/03/04.


Héron pourpré (*Ardea purpurea*) E (54-15)

Nourrissage observé à Journet (étang Gardaché) le 24/07/02. En 2003, au moins 13 nids à Journet (étangs Pétaveau et Gardaché), 5 couples avec un minimum de 17 jeunes sur l'étang Neuf et un couple nicheur à Brion. En 2004, 3 jeunes au nid et 3 couples probables à Pressac (étang de Combourg) le 30/06, et 4 couples avec un minimum de 12 jeunes le 04/06 sur l'étang Neuf. On constate que les secteurs de Montmorillon et de Pressac concentrent quasi toute la population de la Vienne.

CICONIIDAE

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) M (9-8)
Observation d'ind. isolés de mai à septembre.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) M (54-34)



De passage dans la Vienne pratiquement toute l'année sauf en décembre, avec des pics en mars et en août-septembre. 31 ind. à Poitiers le 05/09/02, 40 ind. à Chasseneuil-du-Poitou le 14/08/03, 31 ind. à Poitiers le 15/08/03, 22 ind. le 16/08/03 à Châtellerault, 10 ind. posés dans un champs à Dissay le 17/09/03, 11 ind. à Dissay le 04/03/04.

ANATIDAE

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) S, H (62-20)
Présent toute l'année. Nidification : sur l'étang de l'Écotière à Bellefonds le 06/06/02, 1 nid occupé à Saint-Léomer le 06/06/03, 1 couple avec 6 poussins à Persac le 04/06/04 et 1 couple avec 2 poussins en 2003 et 9 poussins en 2004 à Châtellerault.

Oie cendrée (*Anser anser*) M, H (111-5)
Migration postnuptiale d'octobre à décembre avec un maximum de 260 ind. le 28/11/03 à Châtellerault.
Migration pré-nuptiale de fin janvier à mars avec un maximum de 200 ind. à Thuré le 10/02/02.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) H (6-4)
1 à 4 individus observés ponctuellement de décembre à février chaque année.

Canard siffleur (*Anas penelope*) H (28-9)
2 à 12 individus observés chaque année de décembre à début avril.

Canard chipeau (*Anas strepera*) H, S (41-11)
Nidification : 1 femelle avec 7 poussins le 01/07/03 sur l'étang de Beaufour et 3 couples avec un total de 19 poussins en 2004 sur les étangs de Vacheresse et du Léché. En 2002, la nidification n'a pas pu être prouvée malgré la présence d'individus en période de reproduction.

Sarcelle d'hiver (*Anas acuta*) H, S (122-17)
La migration pré-nuptiale a lieu de février à avril avec un maximum de 97 ind. le 23/02/03 à Usson-du-Poitou. Les premiers passages postnuptiaux commencent en août, et le maximum est atteint en novembre avec 171 ind. sur l'étang Chez Séguier.

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) H, S (386-71)
Beaucoup de données avec peu de preuves de nidification. Les premiers poussins sont notés les 06/04/02, 13/04/03 et 01/05/04.

Canard pilet (*Anas acuta*) M, H (11-3)
Observations faites d'octobre à mars avec un maximum de 17 ind. le 22/02/02 sur l'étang Le Breuil.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) M, E (15-4)
Les premiers migrateurs sont de retour mi-mars. Nidification sur les étangs de Beaufour : 1 femelle avec 2 jeunes le 15/08/03 et 1 femelle avec 8 jeunes le 17/08/04.

Canard souchet (*Anas clypeata*) H, M (70-21)
Le passage pré-nuptial donne lieu à de fréquentes observations de fin janvier à mai avec un maximum de 50 ind. le 30/03/02 à l'étang de Beaufour. L'observation d'un couple d'avril à août 2003 sur le secteur des étangs de Beaufour n'a pas apporté d'élément permettant de prouver la nidification.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) H,S (143-21)
Le plus important rassemblement se situe sur l'étang de Beaufour avec 218 ind. le 04/03/02. Reproduction certaine les 3 années. Sur le secteur des étangs de Beaufour : 3 femelles avec respectivement 1, 2 et 3 poussins le 02/06/02, 5 femelles avec un total de 26 poussins le 18/06/03 et 20 femelles avec un total de 98 poussins en 2004. Sur les étangs de Pressac : 5 femelles avec un total de 18 poussins en 2004.

Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) A (4-1)
1 femelle a été observée sur l'étang de Beaufour du 23/02/02 au 14/04/02.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) H, S (39-7)
Observations en migration de septembre à avril en petit nombre avec un maximum de 13 ind. le 07/01/02 sur le plan d'eau de Saint-Cyr. En 2002, pendant la période de reproduction, un individu a été observé sur l'étang de Beaufour.

Macreuse brune (*Melanitta fusca*) M (11-1)
Observations de 1 ind. en décembre 2002, 1 ind. le 11/01/03 sur le lac de Jousseau et 3 ind. entre décembre 2003 et fin janvier 2004 sur le plan d'eau de Saint-Cyr.

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*) H (1-1)
Un couple observé sur le plan d'eau de Saint-Cyr le 22/02/02.

Harle piette (*Mergus albellus*) H (1-1)
Deux femelles observées sur l'étang de Grolleau à Saint-Léomer le 19/02/03. 1 mâle et 4 femelles le 11/01/03 sur le lac de Jousseau.


ACCIPITRIDAE

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) H (1-1)
Un adulte observé à l'étang de Beaufour le 11/01/03.

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus Gallicus*) E (65-31)
Noté dès le 09 mars et jusqu'au 11 Octobre en 2003. Un cas de reproduction certaine sur le camp militaire de Montmorillon en 2003.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) S (22-17)
Pas de données certaines de reproduction. 1 ind. le 07/04/04 à Lussac-les-Châteaux, en vol puis descend en piqué au dessus de la forêt.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) E (46-31)
Les contacts avec cette espèce sont fortement marqués en mai et juin. Dix fois moins observée que la buse variable. Parade observée le 12/06/04 en Forêt de Moulière. Un cas de reproduction certaine sur le camp militaire de Montmorillon en 2003.



Busard cendré (*Circus pygargus*) E (223-91)
Pas de donnée de reproduction certaine en dehors du massif de Moulière-Pinail et la zone de suivi en plaine cultivée du Neuvilleois. Dates extrêmes : 02/04/04 et 11/09/04.


Busard saint-Martin (*Circus cyaneus*) S (473-126)
Cette espèce est la plus distribuée sur la période dans notre département (126 communes). Peu de données de reproduction certaine en dehors du massif de Moulière-Pinail et la zone de suivi en plaine cultivée du Neuvilleois.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) S (49-27)
Pas de preuve de nidification certaine. Principalement observé dans la partie ouest du département, proche des Deux-Sèvres où il est connu nicheur.

Buse variable (*Buteo buteo*) S (474-110)
Le rapace le plus noté sur la période. De nombreux indices probables ou certains de nidification.

Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) H, M ? (3-1)
3 observations pour cette nouvelle espèce en Vienne (Voir note de Raphaël Bussièrre dans ce numéro).

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) S (137-68)
Majorité des observations en dehors de la période de reproduction. En hiver, semble plus visible, notamment près des habitations.




Milan noir (*Milvus migrans*) E (129-47)
Observé dès le 03 mars en 2002 et jusqu'au 13 août de cette même année. A noter une observation de 70 ind. stationnant pendant une semaine à Sommière-du-Clain (décharge) en août 2002. Peu de preuves de nidification sur le département.

Milan royal (*Milvus milvus*) M (17-14)
Peu de données pour cette espèce de passage. Pic d'observation en novembre avec presque un tiers des données pour ce mois sur la période.

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) M (46-22)
Observé majoritairement au printemps mais les données d'automne sont plus significatives sur ces trois années qu'en 1999-2000-2001. Les observations de juin sont le fait d'individus isolés observés plusieurs fois.



FALCONIDAE

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) S (302-104)
Nombreuses preuves de nidification. Des accouplements constatés dès le mois de février.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) H (39-22)

Observé de la mi-octobre jusqu'en mars généralement, mais noté le 20/04/03 à Saint-Laon et le 19/06/04 à Rouillé.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) E (88-52)

Observé dès le 04 avril en 2004 et présent jusqu'au mois de septembre. Date extrême : 1 adulte le 13/11/02 à Nouaillé-Maupertuis.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) S (32-23)

Les contacts hivernaux constituent les 2/3 des données. Mais première mention de cette espèce nicheuse dans notre département en milieu naturel en 2004 se concrétisant par 4 jeunes à l'envol.

PHASIANIDAE**Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) S (145-132)**

Observée sur l'ensemble du département. 2 données de nidification en 2003 : 3 jeunes à Coussay-les-Bois et 5 à Moulismes. Fait l'objet de nombreux lâchers d'élevages.

Perdrix grise (*Perdix perdix*) S (46-43)

La moitié des données provient de secteurs de plaine.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) E (65-56)

Premier contact : un mâle chanteur le 16/03/02 à Chauvigny et le 19/03/04 à Angliers. Dernière observation de 3 ind. le 15/10/04 à Massognes. Nidification : 1 jeune âgé de quelques jours à Lavausseau le 30/06/03.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)**S (164-139)**

Beaucoup de notes de mâles chantant en période de reproduction. 2 nichées observées avec respectivement 4 et 5 jeunes. Fait l'objet de nombreux lâchers d'élevages.

RALLIDAE**Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) S (14-12)**

Un juvénile observé le 15/05/02 sur la Réserve du Pinail ainsi que 3 mâles chanteurs le 22/03/04 sur ce même site.

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*) S (127-96)


Présente sur l'ensemble du département. 17 données de nidification (7 en 2002, 5 en 2003 et 2004).

Foulque macroule (*Fulica atra*) S, M (206-77)

33 données de nidification sur l'ensemble de la période étudiée. Parmi les plus grands rassemblements hivernaux, on note le plan d'eau de Saint-Cyr avec 340 ind. le 30/11/02 puis 220 ind. le 23/11/03 et l'étang de Chez Séguier avec 222 ind. le 25/12/04.

GRUIDAE**Grue cendrée (*Grus grus*) M (435-237)**

Le passage prénuptial est toujours plus important avec une moyenne de 15700 ind., contre 4600 ind. au postnuptial. Au printemps, les derniers oiseaux sont observés jusqu'à la mi-avril. A l'automne les premiers ind. arrivent à la mi-octobre sauf en 2003 où 8 ind. ont été observés le 15/09 à L'Isle-Jourdain.

**OTIDIDAE****Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) E (138-118)**


Dates extrêmes : notée du 15/03 au 29/09 en 2002, du 23/03 au 16/09 en 2003 et du 19/03 au 25/10 en 2004. Rassemblements postnuptiaux les plus importants : 19 ind. à Massognes en 2002, 23 ind. à Craon en 2003 et 46 ind. à Massognes en 2004.

RECURVIROSTRIDAE**Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) M (2-2)**

Un ind. est observé à l'étang de la Pétolee le 09/04/02 lors de la migration prénuptiale et une autre observation le 23/06/03 à l'étang du Léché.

Avocette élégante (*Recurvirostra avocetta*) M (4-2)

Le passage automnal n'a fourni que 4 mentions pour cet oiseau, essentiellement sur le plan d'eau de Saint-Cyr : 8 ind. le 30/11/03, 1 ind. le 24/09/04, 5 ind. le 18/12/04 et 1 ind. le 17/12/04 au Grand étang de Lenest.



BURHINIDAE**Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)****E, S (290-248)**

Présent sur l'ensemble du département. Observé tous les mois sauf de décembre à février. Sur les trois ans, une soixantaine de couples nicheurs ont été repérés. Les plus grands rassemblements postnuptiaux comptaient 188 ind. le 02/10/04 au Rochereau, 142 ind. à Migné-Auxances le 29/09/02 et 140 ind. à Sillars le 10/10/04.

CHARADRIIDAE**Petit gravelot (*Charadrius dubius*)****M, E (41-18)**

Premiers oiseaux contactés dès début mars avec un groupe de 5 ind. le 14/03/04 à l'étang de la Pétolée. Pic des observations dans la dernière décade de mars. Reproduction certaine constatée à Saulgé le 09/07/04 avec un couple et trois jeunes. Dernier contact le 11/09/04 à La Puye avec un individu.

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*)**M (1-1)**

Une seule donnée de 2 ind. le 21/04/03 à la Roche-Posay.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)**H (142-43)**

Premiers contacts dès fin septembre avec 10 oiseaux à Saint-Jean-de-Sauves le 29/09/04. Les plus gros rassemblements apparaissent dans la dernière décade de décembre (2000 oiseaux à Coulombiers le 25/12/04 et 3000 à Jazeneuil le 09/01/04). Derniers contacts fin mars : 5 oiseaux le 28/03/04 à Saint-Sauvant.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)**M (2-2)**

5 oiseaux à l'étang de la Pétolée le 28/01/04.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)**H, S (565-117)**

Parades notées dès la mi-mars. 7 couples à Saint-Cyr le 21/04/03. Les groupes les plus importants sont notés en février : 3000 ind. à Pleumartin le 11/02/04 et 1500 ind. à Jardres le 25/02/04.

SCOLOPACIDAE**Bécasseau minute (*Calidris minuta*)****M (1-1)**

Un individu est observé le 21/03/04 sur l'étang de la Pétolée.

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)**M (1-1)**

Une observation d'un individu à l'étang de La Puye le 19/09/04 lors du passage postnuptial.

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)**M (7-6)**

Bécasseau le plus courant dans le département. La période postnuptiale fournit 4 données : 1 ind. le 15/08/03 à l'étang du Léché, 1 ind. le 19/09/03 à l'étang des Verrières, 2 ind. le 10/10/04 à l'étang de Chez Séguier, 5 ind. le 10/10/04 à

l'étang de la Pétolée. Au passage printanier : 7 ind. à l'étang de la Pétolée le 27/04/03.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)**M (15-7)**

13 ind. présents le 21/03/04 sur l'étang de La Pétolée. Passage printanier très discret : un individu à l'étang du Léché le 15/08/03. Dernier contact : un oiseau observé à l'étang de Chez Séguier le 10/10/04.

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*)**M (2-1)**

Espèce assez discrète observée en période migratoire. À la réserve naturelle du Pinail, un groupe de 6 oiseaux sont contactés le 29/12/02. Un seul individu le 30/03/03 à Journet.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)**H, S (44-22)**

Observée presque toute l'année. Passage postnuptial : 10 ind. le 08/10/04 à l'étang de Chez Séguier, 17 ind. le 17/10/04 à La Puye, 15 ind. sur la réserve du Pinail le 29/12/02. Passage pré-nuptial : 5 ind. le 28/02/04 à l'étang de la Roche, 4 ind. le 18/03/04 à l'étang de la Pétolée, 1 ind. le 29/05/04 à la Chapellière, commune de Coussay-les-Bois.

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)**H, S (19-15)**

Notée en forêt de Moulière uniquement : 3 ind. le 29/08/03 et un nid garni découvert le 02/05/04.

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)**M (1-1)**

Un individu le 01/04/04 à l'étang de la Pétolée.

Courlis cendré (*Numenius arquata*)**S (123-66)**

Un couple avec 2 jeunes est observé à Saint-Sauvant le 30/06/04 et une autre famille à Monts-sur-Guesnes le même jour.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)**M (7-1)**

Toutes les observations proviennent de l'étang de la Pétolée. En 2003, 3 ind. ont stationnés du 12 au 27 avril et 1 ind. du 2 au 9 mai en 2004.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)**M (27-12)**

Majeure partie des observations au passage pré-nuptial : 24 données contre 3 données pour le passage postnuptial. 6 ind. du 5 au 27 avril 2003 à l'étang de la Pétolée. 2 ind à l'étang de la Pétolée le 14/03/04. Au passage postnuptial, première observation à l'étang du Léché le 09/07/04 avec 2 ind.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)**M (24-8)**

Maximum de 11 ind. à l'étang de la Pétolée le 30/04/03. Les observations automnales se répartissent entre la troisième décade de juillet et la deuxième décade d'octobre, avec un pic en septembre.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)**M (56-20)**

Stationnements fréquents à Coulombiers et La Puye, surtout à l'automne : 14 ind. le 20/08/04 à l'étang de Maupertuis et 11 ind. le 11/09/04 à l'étang de La Puye. Individus isolés notés en décembre et janvier : 1 ind. à Saint-Sauvant le 11/01/03, 1 ind. à Coulombiers le 25/12/04 et 1 ind. à Archigny le 31/12/04.

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) M (7-4)

Un oiseau le 12/04/03 à l'étang de la Pétolée et un groupe de 3 ind. à Saulgé le 09/05/02. 3 oiseaux stationnent à l'étang de Maupertuis du 15 au 20/08/03. Dernière observation le 11/09/04 avec un oiseau à l'étang de La Puye.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) M (90-33)

Etang de Maupertuis : 14 ind. le 03/08/02, 11 ind. le 23/07/03 et 6 ind. le 12/08/04. Le passage printanier s'étale de fin mars jusqu'à fin mai. Les groupes d'oiseaux sont moins importants qu'au passage automnal.

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*) M (1 – 1)

Une femelle en plumage nuptial sur l'étang Chez Séguier à Pressac le 17/07/2002.

LARIDAE**Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) H (79-25)**

L'effectif du dortoir du plan d'eau de Saint-Cyr atteint son maximum fin décembre mi-janvier avec 4000 ind. le 21/12/02, 5000 ind. le 18/01/03 et 5800 ind. le 31/12/04.

Goéland cendré (*Larus canus*) H (6-3)

La plupart des observations sont signalées au plan d'eau de Saint-Cyr. Effectifs maximum : 12 ind. le 09/01/04 et 30 ind. le 25/01/04 au plan d'eau de Saint-Cyr.

Goéland brun (*Larus fuscus*) H (11-2)

Le premier contact est noté le 14/11/04 avec 2 ind. au plan d'eau de Saint-Cyr. L'espèce est la plus observée en décembre et janvier. Cependant, les groupes n'excèdent pas 4 ind. Lors du passage migratoire, une seule observation de 3 ind. remontant vers le nord est notée le 01/05/04 à Lusignan.

Goéland argenté (*Larus argentatus*) H (28-9)

Premiers contacts de l'espèce dès la première décennie de novembre et jusqu'à la première décennie de mars avec un pic en novembre et janvier. C'est au plan d'eau de Saint-Cyr que l'effectif atteint son maximum avec 122 ind. le 14/11/04 et 65 ind. le 21/01/04. En période estivale, 4 mentions ont été comptabilisées : 1 ad. le 17/08/03 à l'étang de la Pétolée, 1 ad. le 19/06/04 à Leugny, 1 juv. le 22/06/04 à Port-de-Piles et 1 juv. le 09/07/04 à Brion.

Goéland leucopnée (*Larus michahellis*) H (7-4)

La plupart des observations sont notées lors de la période hivernale avec un maximum de 3 oiseaux le 27/12/02 et le 11/01/04 au plan d'eau de Saint-Cyr. Un oiseau le 25/09/04 à Buxeuil.

STERNIDAE**Sterne naine (*Sterna albifrons*) M (1-1)**

Un individu en plumage adulte sur les gravières des Varennes à Vaux-sur-Vienne le 14/06/2004.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) M (12-8)

Aucune donnée en 2002 et 2 en 2003. 2004 est l'année où l'espèce a été la plus observée avec 10 observations, toutes en pré-nuptial à l'exception d'une donnée en migration post-nuptiale : 1 ind. à l'étang de Maupertuis durant 5 jours.

Guifette noire (*Chlidonias niger*) M (5-4)

En 2002, l'espèce est observée exclusivement au passage pré-nuptial. La première est notée à l'étang de Beaufour : 2 ind. le 24/04/02 et un individu survole le centre ville de Châtellerault le 29/04/02. En 2003, un adulte fait une halte d'une journée au lac de Jousseau le 07/09/03 et un autre oiseau est contacté à l'étang des Verrières le 19/09/03.

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) M (16-10)

Toutes les mentions concernent des oiseaux observés lors du passage pré-nuptial à l'exception peut être d'une donnée tardive le 05/07/04 (2 ind. à Naintré). Les observations printanières s'étalent de la première décennie d'avril jusqu'à la dernière décennie de mai. 1 ind. sur l'étang de la Pétolée le 09/04/02, 3 ind. le 26/05/02 à Châtellerault et 3 ind. le 28/05/03 à Journet.

COLOMBIDAE**Pigeon colombine (*Columba oenas*) H, S (40-25)**

Accouplement observé à Montamisé le 26/03/03. Rassemblement de 250 ind. à Saint-Sauvant le 25/10/04.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) H, S (424-306)

Présent toute l'année. 3000 ind. à Lathus-Saint-Remy le 12/01/02, 2000 ind. à Saulgé le 22/10/03.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) S (94-63)

Peu d'observation par rapport à la Tourterelle des bois. Pas de note de nidification. Un rassemblement de 25 ind. à Brigueil-le-Chantre le 06/10/03.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) E (238-197)

Présente d'avril à septembre en 2004. Une seule preuve de nidification certaine le 03/07/04 en Forêt de Moulière (nid contenant 2 œufs).

CUCULIDAE**Coucou gris (*Cuculus canorus*) E (338-240)**

Première observation le 24/02/04. Une seule note de nourrissage d'un jeune par un Accenteur mouchet le 24/07/02 à Vouneuil-sous-Biard.

TYTONIDAE**Effraie des clochers (*Tyto alba*) S (173-153)**

Un quart des données concernent des oiseaux victimes du trafic routier. Nid garni avec œufs le 10/05/02 à Adriers, contenant 4 poussins le 27/05/02.

STRIGIDAE**Petit-duc scops (*Otus scops*) M (4-2)**

En 2004, contacts au chant à La Chapelle-Moulière le 07/05 et jusqu'à 3 mâles chanteurs à Biard. Aucune donnée en 2002 et 2003.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) S (67-52)

Nidification dans un mur à Champagné-Saint-Hilaire le 01/08/03.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) S (60-50)

4 jeunes volants à Smarves le 03/05/02.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) S (52-52)

14 en dortoir au cimetière des Roches-Prémarie-Andillé le 27/01/02. Nourrissage de trois jeunes à La Roche-Posay le 19/05/03.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) M (7-6)

6 ind. le 11/11/02 à Saint-Sauvant et 7 ind. le 01/03/04 à Venduvre-du-Poitou.

CAPRIMULGIDAE**Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) E (38-38)**

Première donnée le 29/04/04. En 2002, 2 dates d'observation en juin. Les observations proviennent principalement du montmorillonnais et de Moulière, où l'espèce niche. Maxima : 6 oiseaux le 18/06/04 en Moulière, et 6 le 02/09/04 à Vouillé. Dernier oiseau noté le 04/09/04.

APODIDAE**Martinet noir (*Apus apus*) E (87-83)**

Premiers oiseaux (8 ind.) le 25/03/02, date très précoce ! L'espèce est sous-notée avec seulement 4 cas de nidification certaine sur la période. Dernière observation le 07/09/04, date tardive, concernant 1 ind.

ALCEDINIDAE**Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) S (142-142)**


Espèce notée tout au long de l'année. 4 preuves de reproduction certaine : Cenon-sur-Vienne, La Roche-Posay, Vouneuil-sur-Vienne, Curzay-sur-Vonne.

**MEROPIDAE****Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) E (35-34)**

Dates extrêmes : 02/05/03 et 14/09/04. En 2004, niche dans 9 communes représentant 15 sites et 48 couples. Vicq-sur-Gartempe abrite la majorité des nicheurs.

UPUPIDAE**Huppe fasciée (*Upupa epops*) E (213-209)**

Dates extrêmes 14/03/03 et 11/10/03. Une observation originale le 13/12/04 à Fleuré. Un oiseau le 02/02/04 à Jaunay-Clan. 8 cas de nidification certaine.

**PICIDAE****Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) E (11-8)**

Dates extrêmes : 15/04 et 26/09. Observations d'oiseaux isolés, exception de 2 ind. le 05/05/02 à Saulgé. 4 cas de nidification possible : Montmorillon, Saulgé, Adriers, Vouneuil-sur-Vienne. Aucune preuve de reproduction certaine.

Pic cendré (*Picus canus*) A (5-3)

L'espèce est notée en janvier, mars et avril en forêt de Mareuil uniquement. Reproduction très mal renseignée, un cas de nidification possible. Absence de données en 2004.

Pic vert (*Picus viridis*) S (205-172)

Observé régulièrement toute l'année.

Pic noir (*Dryocopus martius*) S (111-83)

Observé régulièrement toute l'année. 4 cas de reproduction certaine : Vouneuil-sur-Vienne, Verrières, forêt de Châtelle-rault. Visite des peupleraies à plusieurs reprises à Saulgé, Vicq-sur-Gartempe et Mazerolles.

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) S (233-152)

Observé toute l'année. 5 cas de reproduction certaine : Lavoux, Liniers, Scorbé-Clairvaux et nombreuses suspicions de reproduction.

Pic mar (*Dendrocopos medius*) S (55-32)

Espèce discrète, reproduction difficile à prouver. 2 cas de reproduction certaine à Lavoux.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) S (61-48)

Observé toute l'année. 4 cas de reproduction certaine : Nouaillé-Maupertuis, Le Vigeant, Valdivienne et Chauvigny.

ALAUDIDAE**Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) E (14-10)**

Premiers chanteurs dès le 21/04 en 2003, date record de précocité pour la Vienne. 7 chanteurs cantonnés en 2002, 6 en 2003 et seulement 2 en 2004 autour de Neuville-de-Poitou. Pas de preuve de reproduction certaine.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) S (52-34)

Majorité des observations réalisées à Poitiers et ses environs. Nicheur certain à Maisonneuve en 2002 avec l'observation d'un adulte accompagné de 3 juvéniles.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) S (143-101)

Les 2/3 des données proviennent du montmorillonais. Reproduction certaine à Bourg-Archambault le 01/04/03 avec un couple en nourrissage. Groupes hivernaux de 15 et 20 ind. observés respectivement le 01/02/04 à Curzay-sur-Vonne et le 08/01/04 à La Chapelle-Montreuil.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) S, M, H (463-251)

Les 2/3 tiers des observations sont réalisées en période de nidification mais ne nous fournissent qu'une seule preuve de reproduction certaine à Lathus-Saint-Rémy avec un couple en nourrissage le 21/05/03. Des groupes de plus de 100 ind. notés à Archigny, Smarves, Saint-Sauveur et Chauvigny.

HIRUNDINIDAE**Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) E (36-23)**

Premiers migrants : le 17/03 en 2002, le 05/04 en 2003 et le 20/03 en 2004. Dernières données : le 01/10 en 2002, le 21/07 en 2003 et le 22/08 en 2004. Nidification à Mazerolles, Vicq-sur-Gartempe, Vouneuil-sur-Vienne (voir article de Daniel Gilardot dans ce numéro).

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) E (302-225)

Premiers migrants : le 10/03 en 2002, le 13/03 en 2003 et le 10/03 en 2004. Dernières données : le 04/11 en 2002, le 28/10 en 2003 et le 11/11 en 2004. Accouplements observés fin avril 2004 à Curzay-sur-Vonne et Fleuré. Jeunes au nid dès le 09/05 en 2003 à Verrières. Rassemblements postnuptiaux les plus importants à Maillé avec 280 ind. le 28/09/02 et à Brion avec 1500 ind. le 20/09/04.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) E (94-65)

Premiers migrants : le 31/03 en 2002, le 16/03 en 2003 et le 15/03 en 2004. Dernières données : le 20/10 en 2002, le 16/09 en 2003 et le 09/09 en 2004. Premières éclosions dès le 11/05 en 2003 à Chauvigny et derniers jeunes envolés le 09/09/04 à Poitiers. Rassemblements postnuptiaux les plus importants à Civaux avec 200 ind. le 10/09/02 et à Poitiers avec 200 ind. le 09/09/04.

MOTACILLIDAE**Pipit rousseline (*Anthus campestris*) E, M (6-6)**

Indices de reproduction à Craon en 2002 et 2003, à Mazerolles le 13/07/02 et à Lussac-les-Châteaux avec l'observation d'un mâle en parade le 14/07/04. Les oiseaux observés à Ayron le 19/09/03 et à Saulgé le 08/09/04 étaient vraisemblablement en migration.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) E, M (194-149)

Une preuve de reproduction certaine à Montmorillon le 06/06/03 avec un couple en nourrissage et de fortes présomptions le 24/06/04 à Saint-Léomer avec un ind. alarmant.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) H, S (220-137)

Principalement noté en hiver en groupes : maxima de 82 ind. à Benassay le 30/01/04, 80 ind. à Lavausseau le 04/01/04 et 80 ind. à Smarves le 10/10/04. Des indices de reproduction en mai et juin de chanteurs à Journet, Lathus-Saint-Rémy, Montmorillon, Saint-Léomer et Scorbé-Clairvaux.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) M, H (6-4)

Observations d'un ind. le 10/11/03 à l'étang de Beaufour, 4 ind. le 18/01/04, 2 ind. le 05/12/04 au Grand Etang de La Puye, 1 ind. le 07/02/04 à l'étang Chez Séguier, 2 ind. à Saint-Léomer le 12/04/04 et 2 ind. le 12/12/04 à l'étang de Beaufour.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) E, M (74-58)

Premiers migrants le 03/04 en 2002, le 31/03 en 2003 et le 18/03 en 2004. Reproduction à Craon, Villiers, Charrais, Champigny-le-Sec, Frozes et Saulgé. L'espèce poursuit sa progression vers l'Est dans les plaines céréalières où elle affectionne le colza, et niche dans le Montmorillonais. Pour 2002 et 2003, les dernières mentions sont particulièrement tardives avec 1 ind. observé le 06/11/02 à Jaunay-Clan, et 1 ind. le 06/11/03 à Chasseneuil-du-Poitou. En 2004, derniers migrants le 20/09.

Bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima*)**M (3-3)**

Trois observations printanières : 1 mâle le 15/04/03 à Saulgé, 1 mâle le 04/04/04 au plan d'eau de Saint-Cyr et 3 adultes à Saint-Léomer le 12/04/04.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)**S (73-55)**

Notée nicheuse à Coussay-les-Bois, Poitiers, Montmorillon, Savigné, Vouneuil-sous-Biard et Cenon-sur-Vienne.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) S, H (236-167)

Notée nicheuse à Curzay-sur-Vonne, Chauvigny, Coussay-les-Bois, Frozes, La Chaussée, Mignaloux-Beauvoir et Vaux-sur-Vienne. Accouplements notés le 24/04/03 et le 01/06/04 à Poitiers. Rassemblements hivernaux observés çà et là avec un maximum de 123 ind. à Pressac le 08/10/04.

Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarellii*)**H (1-1)**

Une seule mention de cette sous-espèce à Châtellerault le 10/02/02 dans un dortoir d'une centaine de Bergeronnettes grises.

TROGLODYTIDAE**Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)****S (343-212)**

Noté nicheur certain à Valdivienne, Poitiers, Lathus-Saint-Rémy et Vouneuil-sous-Biard.

PRUNELLIDAE**Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) S (285-189)**

Principalement noté de janvier à juin. Seulement 2 preuves de reproduction certaine à Adriers le 06/04/02 et à Poitiers le 11/06/03.

TURDIDAE**Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)****S, H (420-231)**

Noté nicheur certain à Charrais, Usson-du-Poitou, Ceaux-en-Couhé, Port-de-Pile et Ligugé.

Rosignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)**E (324-208)**

Espèce essentiellement détectée au chant (90% des données concernent des mâles chanteurs). Premiers oiseaux notés le 26/03 en 2002, le 08/04 en 2003 et le 05/04 en 2004. Dernières mentions le 29/07 en 2002, le 13/06 en 2003 et le 09/06 en 2004. La migration postnuptiale passe totalement inaperçue.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) M (4-2)

4 mentions en migration pré-nuptiale : 1 mâle le 19/03/03 et les 11 et 12/04/03 à Beaufour. 1 ind. le 13/04/04 à Saint-Léomer.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochuros*)**E, S (131-87)**

Observé tous les mois de l'année sur la période considérée. Noté nicheur certain à Biard, Coussay-les-Bois, Curzay-sur-Vonne, Haims, Lésigny, Ligugé, Montmorillon, Nouaillé-Maupertuis, Poitiers, Saint-Pierre de Maillé, Valdivienne, Vendevre-du-Poitou et Vouneuil-sur-Vienne.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus****phoenicurus*)****E, M (51-41)**

Premières données le 04/04 en 2002, le 27/03 en 2003 et le 02/04 en 2004. Reproduction prouvée à Biard, Coussay-les-Bois, L'Isle-Jourdain et Saint-Léomer. Seulement 2 données en période de migration postnuptiale : 1 mâle le 16/09/03 à Adriers et 1 mâle le 27/08/04 à Archigny.

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)**M (22-19)**


Contacté lors des 2 passages migratoires. Les observations de couples en mai 2004 à Curzay-sur-Vonne, Liniers, Saulgé et Verrières se sont révélées sans suite. Dernières observations le 21/10/04 à Saint-Sauveur et Oyré.

Tarier pâtre (*Saxicola torquata*)**S (272-214)**

Noté nicheur certain à Bellefonds, Bonneuil-Matours, Château-Garnier, Coulombiers, Coussay-les-Bois, Haims, Jazeneuil, Lathus-Saint-Rémy, Lésigny, Lusignan, Montmorillon, Poitiers, Scorbé-Clairvaux, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Vouillé et Vouneuil-sur-Vienne.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) E, M (101-83)

Premières données le 12/03 en 2002, le 25/03 en 2003 et le 15/03 en 2004. Pic du passage printanier lors de la 3^{ème} décennie d'avril. Derniers migrateurs le 15/09 en 2002, 29/09 en 2003 et le 03/11 en 2004. Nicheur certain à Craon en 2002 et Poitiers en 2004. Dernières données le 15/09 en 2002, le 29/09 en 2003 et le 03/11 en 2004.



Répartition mensuelle des observations

Merle à plastron (*Turdus torquata*)**M (6-6)**

Noté aux 2 passages migratoires : 4 données pendant la première quinzaine d'avril et 2 début octobre.

Merle noir (*Turdus merula*) S (667-331)
Nombreuses données de nidification.

Grive Litorne (*Turdus pilaris*) H (77-63)
Dates extrêmes : 13/04/03 et 21/10/04. Maximum de 1000 ind. à Roiffé le 18/01/04.

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) S (256-189)
Notée nicheuse à Ligugé et Vouneuil-sous-Biard.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*) H (30-25)
Dates extrêmes : 29/03/03 et 20/11/03. Maximum de 49 ind. le 17/02/2004 à Leigné-les-Bois.

Grive draine (*Turdus viscivorus*) S, H (97-80)
Notée nicheuse certaine à Beaumont, Lathus-Saint-Rémy et Montmorillon.

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) S (41-29)
Espèce localisée. Premier chant noté le 05/02/04 à Ligugé et Curzay-sur-Vonne. Quelques contacts hivernaux en novembre et décembre.

Cisticole des joncs (*Cisticola jucidis*) S (52-41)
Premier chant entendu le 06/03/03 à Montamisé. 8 ind. notés à Cherves le 31/05/02, dont 4 mâles chanteurs avec des femelles nourrissant dans du colza et une prairie. Le pic des données se situe au mois de mai sur les étangs de Saint-Léomer et de Montmorillon.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) E (46-30)
Toutes les données concernent des chanteurs. Premier noté le 01/04/02 sur la réserve du Pinail. Les dernières observations s'effectuent au mois de juillet le 24/07/02 comme date extrême.

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) E (9-8)
Avec seulement 9 données, le Phragmite est rare et localisé dans le département. Premier contact le 11/04/03 à l'étang de la Forge à Lhommaizé.

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*) E (23-20)
Premier chant le 24/04/02 à La Puye avec arrivée des derniers migrants durant la deuxième quinzaine de mai. Présence de 7 ind. le 02/06/04 au Grand Etang de La Puye. Les derniers ind. sont notés pendant les premiers jours de juillet.


Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) E (2-1)

Un mâle adulte capturé au baguage le 13/05/04 à Brion et contrôlé le 07/07/04 sur le même site (voir note de Pascal Cavallin *et al.* dans ce numéro).

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) E (140-121)

Premier chant le 22/04/03 à Verrières et dernier contact le 31/07/02 à La Chapelle-Montreuil. Preuves de reproduction à Thuré le 26/06/03 et à Rouillé le 08/06/04 avec des jeunes encore au nid.

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) S (81-50)
Observée surtout dans l'est du département, notamment sur les brandes (Montmorillon et Pinail). A signaler la présence de 9 mâles et 3 femelles le 27/04/03 à Saint-Léomer.



Fauvette grisette (*Sylvia communis*) E (267-188)
Premier contact le 06/04/04 à Rouillé et une retardataire le 03/10/04 à Smarves. Six preuves de nidification avec 1 couple à Saint-Cyr le 21/04/03, 2 couples à Journet le 02/06/03 et à Craon le 11/06/03.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) E (42-38)
Premier contact le 19/04/03 à Smarves et dernière observation le 30/08/03 à Curzay-sur-Vonne. Une seule preuve de nidification le 21/04/03 à Dangé-Saint-Romain.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) E, S (452-332)
Premier chant le 01/02/04 à Curzay-sur-Vonne. Seulement 5 preuves de reproduction certaine à Châtellerault, Scorbé-Clairvaux, Coussay-les-Bois, Vouneuil-sur-Vienne et Thuré.

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) E (17-17)
Observé de mars à juin. Dates extrêmes le 31/03/02 à La Chapelle-Moulière et le 10/06/04 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux.

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) E (5-3)
Observé principalement dans les forêts domaniales de Moulière, Mareuil et Châtellerault. Il est noté comme nicheur probable à Journet le 07/06/03.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) S (464-280)

Les principales observations s'effectuent de mars à juin avec 12 ind. le 08/03/03 à Dissay. Peu de données hivernales (n=21) pour ce sédentaire.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) E (29-29)

Premier migrateur le 04/04/04 à Saint-Cyr. Pas de contact en période de reproduction et au passage postnuptial.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) S (22-15)


Premier chant entendu le 26/02/03 à Béruges. Surtout noté en hiver, peu de données printanières (n=6) et aucune donnée de reproduction. Noté comme nicheur possible en forêt domaniale de Mareuil seulement.

Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*) S (56-46)

Commun en hiver mais reste un nicheur rare. 1 nicheur probable le 18/06/02 à Savigné.

MUSCICAPIDAE**Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) E (18-18)**

Premiers migrateurs notés le 23/05 en 2002, le 26/05 en 2003 et le 09/05 en 2004. Dernier contact le 24/09 en 2004. En 2002 et 2003, l'ensemble des données concerne le mois de mai. Absence de donnée de reproduction.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleucos*) M (33-27)

Répartition mensuelle des observations

Noté principalement lors de la migration postnuptiale (88% des données) avec des ind. seuls ou par petits groupes de 5 ind. max. Les observations printanières concernent des ind. seuls.

AEGITHALIDAE**Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) S (168-146)**

Souvent observée en groupes pendant l'hiver, un maximum de 16 ind. le 01/12/02 à Curzay-sur-Vonne et le 24/01/04 à Smarves.

PARIDAE**Mésange nonnette (*Parus palustris*) S (58-41)**

Premier chant le 01/02/03 à Journet. Deux preuves de nidification à Ligugé le 14/04/02 et à Bonneuil-Matours.

Mésange huppée (*Parus cristatus*) S (12-10)

Aucune preuve de reproduction. Les principales observations se font au printemps en forêt de Moulière avec 3 ind. notés le 08/03/03 à Dissay. Une donnée hivernale le 11/10/03 en forêt de Vouillé.

Mésange noire (*Parus ater*) S (22-13)

Essentiellement notée comme hivernante notamment pendant les mois de janvier et février. A signaler des observations pendant la période reproduction le 23/04/02 à Saint-Léomer et le 27/04/04 à Rouillé.

Mésange bleue (*Parus caeruleus*) S (358-195)

Premier chant le 30/01/04 à Benassay. Espèce largement distribuée et observée dans le département.

Mésange charbonnière (*Parus major*) S (416-260)

Premier chant le 09/01/04 à La Chapelle-Montreuil. Commune dans tout le département, c'est la plus observée de la famille. Au moins 1 couple avec 6 jeunes le 18/06/02, à Poitiers !

SITTIDAE**Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) S (105-59)**

10 ind. le 28/03/03 à l'étang du Deffens à Dissay. Nid maçonné dans une ancienne loge de pic épeiche et nourissage le 04/05/02 à Nouaillé-Maupertuis.

TICHODROMADIDAE**Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) H (37-5)**

Hivernant noté de façon régulière en Vienne. Hivernages complets à Poitiers en 2002/2003 (dernière mention le 20/03) et en 2004/2005 (à partir du 15/11), à Chauvigny (1 ind. du 30/11/03 au 30/03/04). Observations à Lathus-Saint-Rémy les 12 et 13/11/03, à Gençay le 02/02/04 et à Angles-sur-l'Anglin le 30/03/04. A noter que l'observation d'un mâle en plumage nuptial sur l'Eglise Saint-Pierre à Poitiers le 23/03/03 indique qu'il s'agit d'un autre oiseau que celui noté jusqu'au 20/03.

CERTIIDAE**Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) S (192-47)**

Noté nicheur le 29/05/04 en forêt de Moulière, où il est commun sur l'ensemble du massif.

REMIZIDAE

Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) M (1-1)
2 ind. le 16/03/03 au lac de la forêt à Châtelleraut.

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) E (155-60)
Premier contact le 09/04/03 et dans la deuxième décennie d'avril en 2002 et 2004. Dernières observations fin juillet - début août.

LANIIDAE

Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*) NE (103-91)
Premières données le 12/05 en 2002, le 10/05 en 2003 et le 02/05 en 2004. Dernières mentions le 25/07 en 2002, le 24/08 en 2003 et le 12/09 en 2004. Reproduction prouvée à Adriers, Archigny, Bellefonds, Coussay-les-Bois, Liglet, Lussac-les-Châteaux, Nérignac et Sillars.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) H (19-5)
5 observations réalisées en mars 2003 : 1 ind. le 02/03 à Saint-Sauvant, 1 le 14/03 à Sanxay, 1 les 23 et 24/03 à Magné et 1 le 30/03 à Pressac. Hivernage complet à Saulgé du 18/11/03 au 03/02/04. Un oiseau était présent sur le même site le 11/11/04.

Pie-grièche méridionale (*Lanius (excubitor) meridionalis*) H (5-1)
Fin de l'hivernage 2001/2002 sur le site habituel de Château-Garnier le 01/02/02. Quatrième hivernage complet du 21/09/03 au 18/01/04. Oiseau non observé depuis cette date.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) E (20-20)
Premières données le 22/04 en 2002, le 25/04 en 2003 et le 08/05 en 2004. Dernières mentions le 23/05 en 2002, le 10/07 en 2003 et le 11/07 en 2004. Nidification prouvée à Lathus-Saint-Rémy.

CORVIDAE

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) S (215-139)
Oiseau présent toute l'année, avec un pic de données au printemps.

Pie bavarde (*Pica pica*) S (165-94)
Rassemblement de 36 ind. à Maillé 15/09/02 et 54 ind. à Liniers le 09/03/03. Construction de nid dès le 15 février.

Choucas des tours (*Corvus monedula*) S (38-24)
56 ind. à Saint-Cyr le 31/12/04, 50 ind. à Lusignan le 14/02/04 et 55 couples à Chauvigny le 13/03/04. Pas d'observation entre juillet et octobre.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) S (45-34)
Quelques groupes notés en hiver dont 350 ind. le 19/12/02 à La Chapelle-Montreuil.

Corneille noire (*Corvus corone*) S (497-221)
Parades le 26/01/03 à Curzay, accouplement le 28/02/04 à Béruges, construction de nids le 29/03/03 à Usson-du-Poitou, accouplements dès le 04/04/04 à Béruges et couvaision le 07/05/04 à Usson-du-Poitou.

STURNIDAE

Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) S (335-85)
Parmi de nombreux regroupements : 2000 ind. le 28/12/04 à Béruges et 1500 ind. le 13/02/04 à Curzay-sur-Vonne.

PASSERIDAE

Moineau domestique (*Passer domesticus*) S (197-101)
Quelques groupes notés en hiver. Ecllosion notée le 24/06/04 à Curzay-sur-Vonne.

Moineau friquet (*Passer montanus*) S (39-26)
Un groupe de 6 ind. à Saint-Benoît le 03/03/02. Transport de nourriture le 14/05/04, 2ème couvée le 04/06/03 à Poitiers.

Moineau soulcie (*Petronia petronia*) S (2-2)
4 couples en 2003 et 3 couples en 2004 au golf de Saint-Hilaire de Roiffé, deuxième nichée notée le 08/08/04.

**FRINGILLIDAE**

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) S (545-375)
Quelques groupes d'un maximum de 250 ind. en novembre, janvier et février. Un ind. leucique le 04/01/04 à Marçay.

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) H (40-30)
Présent du 12/01 au 24/02/02, du 18/01 au 24/04/03 et du 20/11/03 au 27/03/2004.

Serin cini (*Serinus serinus*) H (52-37)
Observé régulièrement de janvier à début juin, avec des mentions sporadiques en juillet et octobre 2004. Transport de nourriture observé le 21/05/03 à Nouaillé-Maupertuis.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) S (285-148)
De petites bandes en hiver : 100 ind. le 24/01/03 à Vaux et 60 ind. le 08/01/04 à La Chapelle-Montreuil. Un ind. leucique à Nouaillé-Maupertuis et un autre à Vouneuil-sous-Biard.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) S (268-163)
De petites bandes en hiver : 500 ind. le 24/01/03 à Vaux-sur-Vienne et 70 ind. le 07/01/02 à Coussay-les-Bois.

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) H (27-32)
Premières arrivées fin octobre. Derniers notés fin avril. Maximum de 20 ind. le 17/02/02 à Lusignan.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) S (328-177)
Quelques rassemblements hivernaux : 150 ind. à Leignes-sur-Fontaine le 17/01/02, 120 ind. à Coulombiers le 05/02/04 et 500 ind. à Saulgé le 22/12/03. Nourrissage noté le 16/06/03 à Antran.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) S (41-29)
10 ind. le 11/11/03 à Nouaillé-Maupertuis.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) S (56-40)
Construction de nid le 09/02/04 dans le bois de l'Hospice à Saulgé. 6 ind. ensemble le 15/03/03 sur le camp militaire de Montmorillon.

Bec-croisé des Sapins (*Loxia curvirostra*) S (9-5)
La moitié des observations ont été faites en Forêt de Moulière, avec un maximum de 15 ind. le 10/02/02.

EMBERIZIDAE


Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) S (274-170)
Chant et accouplement à Montmorillon le 11/05/04, jeunes vus à Coulombiers le 24/03/04. Rassemblement hivernaux : 36 ind. le 09/01/04 à Champigny et 26 ind. le 07/03/04 à Sillars.

Bruant zizi (*Emberiza cirrus*) S (216-41)
Bandes hivernales de 17 ind. à Lussac-les-Châteaux le 10/02/02 et de 45 ind. à Smarves le 18/01/03. Premier jeune observé le 06/04/03.

Brant ortolan (*Emberiza hortulana*) E (22-18)
Premiers arrivants le 11/05/04. Noté nicheur à Montamisé en 2003. Les données concernent des mâles chanteurs isolés, à l'exception de 3 mâles à Saint-Georges-lès-Baillargeaux le 14/05/03 (voir article de Didier Papot dans ce numéro). Derniers notés le 28/07/04.

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) H/S (39-25)

Absence d'observation en période de reproduction. Un cas de nicheur possible à Beaufour en 2003. Quelques bandes hivernales : 100 ind. le 11/02/02 au lac de la Forêt de Châtelleraut et 100 ind. le 02/11/04 à Montreuil-Bonnin.



Bruant proyer (*Miliaria calandra*) S (199-139)
Premiers chanteurs le 10/02/02 à Cherves et derniers entendus le 30/06/03 à Frozes. Observé le plus souvent en avril et mai. Noté nicheur à Maillé en 2003. Groupe de 30 ind. le 10/04/02 à Neuville-de-Poitou et 38 ind. le 28/11/04 au Rochereau.

Carte de répartition des fiches d'observation pour les années 2002 à 2004

