


Cas de prédation d'un Canard siffleur *Anas penelope* par un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus ibicilla* dans la Vienne

Raphaël BUSSIÈRE

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes
86000 Poitiers



Le samedi 23 mars 2006, en début de matinée, je décide de me rendre aux étangs de la Pétolée, commune d'Usson-du-Poitou. Ce site est situé dans le sud du département de la Vienne et fait partie, sans aucun doute, des sites majeurs que compte le département. Il est composé de deux étangs ayant une superficie totale en eau d'environ 3,65 hectares, au milieu de prairies pâturées par les bovins et les ovins. À 8 h 30, à peine arrivé sur le site, je repère une silhouette imposante perchée sur un chêne à l'arrière des étangs. La taille de cet oiseau fait vite monter l'adrénaline. Mes jumelles en main, je constate qu'il s'agit bel et bien d'un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*, une espèce peu observée dans la Vienne.

J'installe rapidement la longue-vue sans oublier de prendre le parapluie de l'autre main, car une pluie fine s'est installée en ce début de matinée. Posé, la taille de l'oiseau est plus grande et nettement plus massive que celle d'une Buse variable *Buteo buteo*. La tête massive, munie d'un bec puissant de coloration sombre, fait apparaître de petits yeux scrutant les environs à la recherche probable de nourriture. La branche sur laquelle est perché l'oiseau fait ressortir ses pattes d'un jaune vif, dotées de robustes doigts. Après une dizaine de minutes d'observation, le rapace décolle de son perchoir et c'est en vol que la taille est vraiment frappante. Les ailes, très larges, avec les rémiges primaires fortement digitées, se distinguent très facilement. La queue est, quant à elle, courte et de couleur sombre. Il s'agit donc d'un oiseau immature. L'oiseau, en vol à faible hauteur, se dirige vers les deux étangs. Une grande partie des Vanneaux huppés

Vanellus vanellus présente sur le site prend son envol tandis que d'autres espèces surveillent attentivement les environs. Le Pygargue repère un groupe de Canards siffleurs *Anas penelope* au repos, et fait une attaque sur celui-ci. En peu de temps, Sarcelles d'été *Anas querquedula*, Sarcelles d'hiver *Anas crecca*, Canards siffleurs, Mouettes rieuses *Larus ridibundus*... s'envolent de tous les côtés en émettant leurs cris d'alarmes respectifs. Et, pendant ce temps-là, le Pygargue est au sol avec entre les serres, une femelle de Canard siffleur. Cette attaque a été fructueuse. Le site est maintenant totalement déserté par les Anatidés et les Laridés. Il ne reste plus que le Pygargue qui ne perd pas de temps pour dépecer sa proie par petits morceaux. Une trentaine de minutes plus tard, l'oiseau décolle du sol et je le perds de vue.

Les jours suivant cette observation, aucune présence de l'espèce sur le site et ses environs n'a été détectée, mais elle avait déjà été ponctuellement observée, lors d'un comptage Wetlands le 11/01/2003 à Saulgé par Pierre GUIGNARD, François LECOMTE et Franck SIMONNET, et une autre observation d'un oiseau avait été faite en 2005 par Pierre PLAT. Un seul cas d'hivernage est mentionné dans le département, avec un immature présent dans le secteur sud-Vienne du 30/11/1980 au 06/04/1981 (CAUPENNE, 1982).

Bibliographie

- CAUPENNE M. (1982). Hivernage d'un Pygargue à queue blanche dans la Vienne. L'Outarde N°14 : p. 104.