

L'avifaune des étangs de Maupertuis et des alentours : bilan des observations jusqu'à l'automne 2009

Roger BOUARD et Dominique PROVOST

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 Poitiers



Introduction

L'objectif de ce texte est de faire le point sur nos connaissances de l'avifaune des étangs de Maupertuis et des alentours. En effet, ces étangs sont suivis par des ornithologues depuis de nombreuses années et leur intérêt ornithologique nous conduit à réfléchir sur des mesures de protection à long terme.

Le site des étangs de Maupertuis est localisé sur la commune de Coulombiers, au sud-ouest de Poitiers. Ces étangs (Figure 1), d'une surface de 6,92 hectares pour l'étang "neuf" et de 2,99 hectares pour l'étang "ancien", sont entourés d'une végétation arbustive dominée par les chênes. Les étangs et la végétation arbustive (Figure 2), de 21,83 hectares, constituent une entité de grande valeur écologique très favorable à l'avifaune.




Figure 1 : Localisation du secteur d'intervention prioritaire pour la maîtrise foncière du site.



Figure 2 : Vue aérienne des étangs de Maupertuis, commune de Coulombiers.




Figure 3 : Limite de la ZNIEFF des étangs de Maupertuis.

Couverture végétale autour des étangs

Les étangs de Maupertuis sont intéressants non seulement parce qu'on peut y observer des oiseaux, mais aussi parce qu'on y trouve des plantes qui ne sont pas très courantes ; une ZNIEFF (n° 239) a par ailleurs été décrite en 1980 et mise à jour en 1997. Elle occupe une surface de 20,24 hectares (Limite en rouge sur la Figure 3).

En mai, quand on entre dans la prairie en dessous de la jetée de l'étang " neuf ", on est accueilli par les Orchis lâches *Orchis laxiflora*, les Oenantes faux boucages *Oenanthe pimpinelloides*, les Platanthères à deux feuilles *Platanthera bifolia*, les Cardamines des prés *Cardamine pratensis*, les Salicaires communes *Lythrum salicaria*... plantes de prairies humides. A côté, la petite mare qui servait autrefois à la reproduction des poissons est habitée par des têtards, des Notonectes *Notonecta glauca* et des Gerris *Gerris sp.* qui circulent entre les Potamots crépus *Potamogeton crispus*, nageant *P. natans*, à feuilles capillaires *P. trichoides*, les Myriophylles en épi *Myriophyllum spicatum*, les Rorippes amphibies *Rorippa amphibia*, les Lentilles d'eau *Lemna minor* et *minuta*...

La haie qui borde la jetée est plus banale : principalement des Frênes *Fraxinus excelsior* et des Saules *Salix caprea*, *S. atrocinerea*... avec des Ajoncs d'Europe *Ulex europaeus*, des Prunelliers *Prunus spinosa*, des Aubépines *Crataegus monogina*, de la Bourdaine *Rhamnus dodonei* ...

Au bout de cet étang, une roselière de *Phragmites*

australis cache un milieu humide avec des Joncs épars *Juncus effusus* et glauques *J. inflexus*, des Bidens penchés *Bidens cernua* et à fruits noirs *B. frondosa*, des Iris des marais *Iris pseudacorus*, de la Menthe aquatique *Mentha aquatica*, de la Renoncule flammette *Ranunculus flammula*, du Lysimaque vulgaire *Lysimachia vulgaris*, du Lycophe d'Europe *Lycopus europeus*, du Myosotis des marais *Myosotis scorpioides*, de la Salicaire à feuille d'Hysope *Lythrum hyssopifolia*... Pas question de faire le tour, l'eau est trop haute ; elle arrive au ras des buissons. Pas question non plus de passer par l'autre bout de la jetée, la végétation est trop dense. C'est frustrant !

En contrebas de l'étang, c'est une forêt fraîche dominée par les Frênes *Fraxinus excelsior*, avec des Ormes *Ulmus minor*, des Prunelliers *Prunus spinosa*, des Aubépines à un style *Crataegus monogina*, de l'Alisier *Sorbus torminalis*, de la Berce *Heracleum spondylium*, de la Barbarée *Barbarea vulgaris*, des Véroniques officinales *Veronica officinalis*, petit chêne *V. chamaedryis* et à feuilles de lierre *V. hederifolia*, du Lierre *Hedra helix* des Ronces bleues *Rubus caesius*, du Géranium Herbe à Robert *Geranium robertianum*, des Primevères officinales *Primula veris*, de la Morelle douce-amère *Solanum dulcamara*, des Fougères mâles *Dryopteris filix-mas*, des Ophioglosses vulgaires *Ophioglossum vulgatum*... La mare intérieure est colonisée par le Potamot à feuilles luisantes *Potamogeton lucens*. Dans la saulaie qui borde le vieil étang à l'ouest, poussent un tapis de Renoncules flammettes *Ranunculus flammula* avec de la Scutellaire toque *Scutellaria galericulata* et le même cortège que vers la roselière.

A peu près au niveau du milieu de l'étang, s'étale une magnifique station d'Ophioglosse vulgaire *Ophioglossum vulgatum*. Pas moyen d'aller plus loin.

La petite mare, sous la jetée du vieil étang, est déjà bien végétalisée : Iris des marais *Iris pseudacorus*, Rorippe amphibie *Rorippa amphibia*, Plantain d'eau commun *Alisma plantago-aquatica*... Du Potamot à feuilles luisantes *Potamogeton lucens* est immergé.

Au bord de l'étang, à gauche de la jetée, de la Renoncule en pinceau *Ranunculus penicillatus* et de l'Hydrocotyle *Hydrocotyle vulgaris* croissent au milieu de coquilles de Moules des étangs *Anodonta sp.*

C'est l'été que se révèlent les plus grandes richesses. Quand l'eau a baissé, au bord de l'étang " neuf ", se développent de la Littorelle *Littorella uniflora*, quelques belles plaques de Limoselle *Limosella aquatica*, de la Potentille couchée *Potentilla supina* (trois plantes protégées régionalement et déterminantes en Vienne), des coussins de Flûteau fausse-renoncule *Baldellia ranunculoides subsp repens*, du Souchet brun *Cyperus fuscus*, de la Linaire élatine *Kickxia elatine*, de la Menthe pouillot *Mentha pulegium*, du Chiendent dactyle *Cynodon dactylon*, du Chénopode rouge *Chenopodium rubrum*.

Dans la dépression inondée, au fond, on peut admirer, outre les ragondins *Myocastor coypus*, de la grande Naiade *Najas marina* (plante protégée régionalement et déterminante dans la Vienne) et du Potamot crépu *Potamogeton crispus*.

Au bord du vieil étang, on trouve aussi de la Limoselle *Limosella aquatica*, de l'Hottonie des marais *Hottonia palustris*, du Scirpe à inflorescence ovoïde *Eleocharis ovata* (plantes protégées régionalement et déterminantes dans la Vienne), du Scirpe sétacé *Isolepis setacea*, du Flûteau fausse-renoncule *Baldellia ranunculoides subsp repens*, du Souchet brun *Cyperus fuscus*, du Chénopode polysperme *Chenopodium polyspermum* ...

L'ancien bassin à poissons qui borde la route est aussi intéressant. Dans la boue humide, se maintiennent encore, malgré la sécheresse, de l'Hottonie des marais *Hottonia palustris*, de la grande Naiade *Najas marina* et de la Véronique mouron d'eau *Veronica anagallis-aquatica*, protégées régionalement.

Une ZNIEFF indique la richesse d'un lieu mais ne le protège pas. Sa spécificité risque de disparaître, avec la menace d'un projet d'expansion des porcheries de Cloué avec demande d'autorisation d'épandage de lisier dans les champs environnants, sur six communes dont Coulombiers.

Synthèse des observations ornithologiques sur les étangs jusqu'à l'automne 2009

Nous présentons dans ce chapitre les observations ornithologiques réalisées sur les étangs de Maupertuis et les alentours depuis 1992 (avec quelques observa-

tions antérieures) et consignées dans la base informatique de la LPO Vienne. Ces observations sont le fruit et le résultat du passage des observateurs sur le site.

ANATIDÉS

3 observations de Cygne tuberculé *Cygnus olor*, dont 5 oiseaux le 26 janvier 2007.

8 observations d'Oie cendrée *Anser anser*. On peut noter le 3 mars 1993 156 oiseaux posés sur l'étang et le 20 février 2003 24 oiseaux posés dans un champ près de l'étang.

2 observations de Canard mandarin *Aix galericulata*. En hiver, le Canard siffleur *Anas penelope*, avec 2 observations, le 15 novembre 1998 de 3 mâles et 2 femelles et le 20 mars 2004 de 2 mâles et 2 femelles. En hiver, le Canard chipeau *Anas strepera*, avec 9 observations de un ou deux oiseaux.

En hiver, la Sarcelle d'hiver *Anas crecca*, avec 38 observations, 25 oiseaux le 16 mars 1993 et 9 oiseaux le 4 septembre 2007.

Le Canard colvert *Anas platyrhynchos* est certainement le canard le plus commun des étangs de Maupertuis, il est nicheur et présent en hivernage, on peut noter le 30 décembre 1992, 50 oiseaux, le 24 février 2006, 39 oiseaux, le 25 juin 2006, 30 adultes et 7 jeunes, le 25 août 2006, 150 oiseaux, le 11 août 2007, 290 oiseaux, le 3 décembre 2007, 120 oiseaux, le 6 septembre 2009, 85 oiseaux, le 27 août 2008, une femelle et 9 jeunes et le 29 août 2008, 84 oiseaux.

Huit observations de Canard pilet *Anas acuta*, le 5 mars 1992, un mâle et trois femelles et le 13 mars 2009, 8 oiseaux.

Quatre observations d'une ou de deux Sarcelles d'été *Anas querquedula*.

Vingt-quatre observations de Canard souchet *Anas clypeata*, le 25 août 2000 14 oiseaux et le 14 avril 2006 16 mâles et 14 femelles.

La Nette rousse *Netta rufina* a été observée deux fois avec un individu.

le Fuligule milouin *Aythya ferina* a été observé sur les étangs 31 fois, on peut noter le 8 février 1993, 53 oiseaux, le 3 mars 1993, 21 oiseaux, le 7 mars 2003, 5 mâles et 5 femelles et le 19 mars 2008, 5 mâles et 2 femelles.

Le Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* a été noté une fois du 16 mars au 23 mars 1980.

Le Fuligule morillon *Aythya fuligula* a été noté deux fois, le 19 mai 2000, avec un mâle et une femelle et le 8 mars 2003, avec 2 mâles et une femelle.

Le Harle bièvre *Mergus merganser* le 5 décembre 1998 avec un mâle.

GAVIIDÉS

Le 15 décembre 2006 un Plongeon arctique *Gavia arctica* adulte.

PODICIPÉDIDÉS

Le Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* est observé tous les ans de 1992 à 2008. On note 7 adultes le 13

octobre 2004, 8 adultes le 30 août 2006 et 16 oiseaux le 27 août 2007 nicheur certain avec des juvéniles, le 27 septembre 2007, 18 oiseaux, le 28 août, 11 oiseaux et 15 août 2008, un couple et 3 jeunes non volants.

Les Grèbes huppés *Podiceps cristatus* sont nicheurs et très présents sur les étangs de Maupertuis avec 222 observations. On peut noter 6 individus le 11 juin 2005 et un oiseau sur son nid, le 05 juin 2006 un oiseau sur son nid, le 27 août 2007 un oiseau avec deux jeunes, le 14 mars 2008 9 oiseaux avec un couple en parade, le 15 juin un adulte, 2 jeunes et un adulte sur son nid et un adulte et quatre jeunes le 6 juin 2008. Le Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* a été noté 7 fois dont 4 oiseaux le 20 septembre 2002.

PHALACROCORACIDÉS

Le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* a été noté plus de 118 fois, généralement de 1 à 3 individus, sauf le 13 octobre 2001 avec 8 oiseaux et le 6 octobre 2007 avec 9 oiseaux.

ARDÉIDÉS

Le Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* a été noté 3 fois à l'unité.

Le Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* a été observé 21 fois, dont 7 sur les étangs, le 14 octobre 2000 30 oiseaux au Petit Gaury, le 4 février 11 oiseaux et le 6 mars 2008 14 oiseaux à la Citerne.

L'Aigrette garzette *Egretta garzetta* a été observée 33 fois, un ou deux oiseaux à chaque fois, sauf le 23 août 2008 avec 4 oiseaux et le 26 août 2008 avec 3 oiseaux.

La première observation de la Grande aigrette *Casmerodius albus* a eu lieu le 11 octobre 2003, on note 57 observations de un ou deux oiseaux.

Le Héron cendré *Ardea cinerea* est présent toute l'année, il a été nicheur sur les arbres de l'étang " neuf " le 24 juin 1983 2 nids occupés, le 1 mai 1984 5 nids occupés et le 27 avril 1985 14 nids occupés, puis la colonie s'est déplacée vers la Pazioterie, à titre d'exemple 15 nids le 26 avril 2005 et 55 nids le 5 mai 2006. Sur les étangs on note le 15 août 2002 18 oiseaux, le 1 septembre 42 oiseaux et le 3 février 2008 27 oiseaux.

Le Héron pourpré *Ardea purpurea* a été observé neuf fois, un ou deux individus à chaque fois.

PANDIONIDÉS

Le Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* est régulièrement présent sur l'étang " neuf " au passage avant et après nidification. Il a été noté 97 fois, avec des séjours plus ou moins longs, par exemple un oiseau est présent du 23 août 2006 au 26 septembre 2006, un oiseau du 11 août 2007 au 26 septembre 2007, un oiseau du 22 août au 11 septembre 2009 et le 10 avril 2007 deux oiseaux sont présents.

RALLIDÉS

Le Râle d'eau *Rallus aquaticus* a été noté trois fois, un individu du 25 août au 10 septembre 1989.

La Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* est nicheur certain sur les étangs de Maupertuis ; on note, par exemple le 15 juillet 2007, un couple et 3 jeunes et le 27 juin 2008 un adulte et 4 jeunes.

Le Talève sultane *Porphyrio porphyrio* a été observé une seule fois, un oiseau du 23 août au 10 septembre 1989.

La Foulque macroule *Fulica atra* est un oiseau nicheur sur les étangs, le 2 juillet 2006 un couple et un jeune et le 13 juin 2008 4 couples et un jeune. On note des rassemblements relativement importants, 137 oiseaux le 2 novembre 2004, 37 oiseaux le 18 août 2006, 75 oiseaux le 13 septembre 2007 et 75 oiseaux le 12 septembre 2008.

RECURVIROSTRIDÉS

L'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* a été observée 6 fois, on note 4 oiseaux le 15 mars 1977, 6 oiseaux le 16 novembre 1982 et 4 oiseaux le 3 avril 2007.

CHARADRIIDÉS

Le Petit Gravelot *Charadrius dubius* est régulièrement observé sur les étangs, le 20 juin 2005 deux couples, un oiseau sur son nid et un accouplement.

Le Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* a été noté huit fois, 2 oiseaux le 19 mars 1987.

Le Pluvier doré *Pluvialis apricaria* est présent en hivernage, 1500 oiseaux le 6 janvier 2004 au lieu-dit " Les Vendes ", 1750 oiseaux le 3 janvier 2006 à la Plaine de l'Ormeau, 1200 oiseaux le 21 janvier 2006 à Beauregard, 2500 oiseaux le 29 novembre 2007 à La Citerne et 1700 oiseaux le 2 décembre 2008 à La Citerne.

Une femelle de Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* le 06 juin 2001 sur l'étang " neuf ".

Pour le Vanneau huppé *Vanellus vanellus* présent jusqu'à quelques dizaines d'oiseaux sur le bord de l'étang " neuf " après la nidification. Des rassemblements en hivernage, par exemple 1540 oiseaux le 4 janvier 2001, 2000 oiseaux le 9 janvier 2004, 3000 oiseaux le 26 novembre 2007 et 2600 le 16 janvier 2008.

SCOLOPACIDÉS

Le Bécasseau minute *Calidris minuta* a été observé 8 fois sur les étangs, le 14 juin 2006 on note 2 oiseaux.

Le Bécasseau variable *Calidris alpina* a été observé dix fois, toujours en automne sur les étangs.

Le Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* un adulte le 13 juillet 2009.

Le Combattant varié *Philomachus pugnax* a été observé 14 fois, toujours en fin d'été et en automne, par exemple deux oiseaux les 20 et 21 août 2001, deux oiseaux le 1 octobre 2002 et deux oiseaux le 31 août 2007.

La Bécassine des marais *Gallinago gallinago* a été observée 55 fois, on note 4 oiseaux le 20 mars 1995, 27 oiseaux arrivent en vol et se posent le 7 octobre

2005 et 4 oiseaux le 10 septembre 2006.

La Bécasse des bois *Scolopax rusticola* est présente dans la forêt de L'Épine, 2 oiseaux le 8 janvier 1995. La Barge à queue noire *Limosa limosa* : deux observations, un oiseau le 5 mars 1987 et 2 oiseaux le 1^{er} septembre 2009.

Le Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* est régulièrement observé, on note 1 à 5 oiseaux, par exemple 5 oiseaux le 15 mars 2007, 4 oiseaux le 11 septembre 2007 et 5 oiseaux le 15 septembre 2007.

Deux observations du Chevalier arlequin *Tringa erythropus*. Neuf observations du Chevalier gambette *Tringa totanus*. Le Chevalier culblanc *Tringa ochropus* est noté 144 fois sur les étangs, 14 oiseaux le 20 août 2003, 5 oiseaux le 8 août 2004, 6 oiseaux le 27 août 2006 et 6 oiseaux le 28 août 2008.

Le Chevalier sylvain *Tringa galarecia* a été observé 28 fois, 2 oiseaux le 21 août 2001, 2 oiseaux le 20 août 2003 et 6 oiseaux le 12 août 2009.

le Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* est noté 166 fois. C'est avec le Chevalier culblanc le limicole le plus commun sur les étangs, 11 oiseaux le 23 juillet 2003, 16 oiseaux le 27 juillet 2006, 18 oiseaux le 23 août 2008 et 14 oiseaux le 29 août 2008.

LARIDÉS

La Mouette rieuse *Larus ridibundus* a été notée 38 fois, 5 oiseaux le 2 juillet 2006, 14 oiseaux le 30 août 2006, 28 oiseaux le 5 septembre 2007, 6 oiseaux le 7 octobre 2007 et 150 oiseaux le 17 juillet 2008 à la Citerne.

STERNIDÉS

La Sterne pierregarin *Sterna hirundo* a été observée 42 fois, très souvent deux oiseaux sont présents, on note 4 oiseaux les 6 et 7 juillet 2006.

La Sterne naine *Sternula albifrons* a été observée 2 fois, un adulte et deux jeunes les 30 et 31 août 2006. 30 observations de la Guifette moustac *Chlidonias hybrida*, 4 adultes le 27 avril 1987, 6 oiseaux le 6 mai 2006, 5 oiseaux le 10 avril 2007, 6 oiseaux le 4 mai 2007 et 8 oiseaux le 21 avril 2008.

23 observations de la Guifette noire *Chlidonias niger*, 4 oiseaux le 4 mai 1980, 7 oiseaux le 12 juin 1982 et 8 oiseaux le 3 mai 2008.

ALCÉDINIDÉS

Le Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*, a été noté 55 fois, le 30 août 2006 nicheur certain, avec transport de nourriture et de sac fécaux et le 21 août 2008 avec un maximum de trois oiseaux.

Synthèse des observations ornithologiques aux alentours des étangs jusqu'à l'automne 2009

Cette partie rassemble les espèces nicheuses ou présentes, pas forcément liées à l'eau, dans les environs des étangs de Maupertuis.

PHASIANIDÉS

La Perdrix rouge *Alectoris rufa* est présente sans preuve de nidification avec de nombreux oiseaux en bande avant l'ouverture de la chasse, 40 en plusieurs groupes le 4 septembre 2009.

La Caille des blés *Coturnix coturnix* un mâle chanteur le 6 avril 2008.

Le Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* est observé aux alentours des étangs. Le 15 mai 2008, un site de nid est fréquenté au lieu-dit " Les Piles ".

CICONIIDÉS

La Cigogne noire *Ciconia nigra* a été observée deux fois, notamment 2 oiseaux du 2 septembre au 7 septembre 2005.

La Cigogne blanche *Ciconia ciconia* a été observée une fois, le 3 mai 2008 un oiseau en vol au lieu-dit " La Calauderie ".

ACCIPITRIDÉS

La Bondrée apivore *Pernis apivorus* 5 observations d'un oiseau, dont deux en migration.

L'Élanion blanc *Elanus caeruleus* a été noté au printemps 2008 à la Grande Vallée (voir note dans ce numéro).

Le Milan noir *Milvus migrans* 19 observations d'oiseaux en vol, 1 couple cantonné dans la héronnière de la Pazioterie avec les cris caractéristiques des jeunes le 8 juillet 2006.

Un Milan royal *Milvus milvus* est observé à la Petite Mare.

Le Circaète Jean-le-Blanc *Circus gallicus* deux observations, dont l'une dans la forêt de L'Épine le 13 avril 1993.

Le Busard des roseaux *Circus aeruginosus* huit observations, 3 oiseaux sur les étangs le 2 septembre 2008.

Le Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* a été observé 39 fois, il niche dans les champs aux alentours des étangs, le 28 avril 2006 à la " Petite Forêt " un couple en parade.

Le Busard cendré *Circus pygargus* le 11 juin 2008 un couple cantonné avec passage de proies et le 11 juin 2008 un couple avec passage de proies.

L'Autour des palombes *Accipiter gentilis* est noté six fois dont cinq aux étangs, mais sans preuve de reproduction.

L'Épervier d'Europe *Accipiter nisus* est noté 25 fois, sans preuve de reproduction, un oiseau le 27 août 2009 est trouvé mort.

La Buse variable *Buteo buteo* est un oiseau commun autour des étangs, le 17 juin 2008 à la Grande Vallée un jeune juste sorti du nid et le 12 septembre 1998 au " Champ de la Fosse " 15 buses posées.

FALCONIDÉS

Le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* est commun autour des étangs, du 4 au 6 avril 2008 plusieurs aires ont été trouvées dans une haie à " La Grande Vallée ".

Le Faucon kobez *Falco vespertinus* a été noté au passage au printemps 2008 aux Grandes Brandes

de la Mare (voir article, p. 18-21 dans le N° 46 de L'Outarde).

Le Faucon émerillon *Falco columbarius* présent en hivernage, 13 observations.

Le Faucon hobereau *Falco subbuteo* : noté 14 fois sur les arbres ou en vol près des étangs.

Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 6 observations, dont 5 au bord des étangs.

GRUIDÉS

La Grue cendrée *Grus grus* a été observée 4 fois, 3 oiseaux le 21 février 2002 en vol autour de l'étang.

OTIDIDÉS

Une Outarde canepetière *Tetrax tetrax* a été observée le 23 mai 1974 au lieu-dit Le Crochet.

BURHINIDÉS

L'Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* est nicheur sur les cultures autour de l'étang. Un rassemblement automnal de plusieurs dizaines d'oiseaux est présent tous les ans à la Citerne, avec 65 oiseaux le 9 octobre 2004, 64 oiseaux le 29 septembre 2006, 65 oiseaux le 29 septembre 2007 et 62 oiseaux le 5 septembre 2009.

COLUMBIDÉS

Le Pigeon colombin *Columba oenas* est noté présent tous les ans en migration sur les bords des étangs, par exemple 20 oiseaux le 27 novembre 1984, 45 oiseaux le 13 octobre 2001, 22 oiseaux le 9 octobre 2007 et 10 oiseaux le 12 octobre 2009.

Le Pigeon ramier *Columba palumbus* est présent toute l'année. Des rassemblements hivernaux sont notés : 1200 oiseaux le 9 décembre 2008 près des étangs. La Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* est présente toute l'année notamment à la ferme de la Grande Mare où plusieurs dizaines d'oiseaux sont présents en automne.

La Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* est nicheuse autour de l'étang : un couple le 16 juillet 2008 et 11 oiseaux le 26 août 2009.

CUCULIDÉS

Le Coucou gris *Cuculus canorus* est nicheur autour des étangs, le 4 avril 2006 un mâle chanteur à La Grande Vallée.

TYTONIDÉS

L'Effraie des clochers *Tyto alba* est présente le 8 décembre 2008 aux Vendes.

STRIGIDÉS

La Chevêche d'Athéna *Athene noctua* est présente dans les fermes et les hameaux autour des étangs, le 15 juin 2008 nicheur certain à La Gaucherie.

La Chouette hulotte *Strix aluco* est présente le 30

janvier 2007 à La Chouetterie.

Le Hibou moyen-duc *Asio otus* est présent dans les fermes et hameaux autour des étangs, le 29 mai 2008 au Ripault apport de proies dans un bois et le 6 juin 2009 au Ripault un oiseau trouvé mort sur la route.

Le Hibou des marais *Asio flammeus* a été présent pendant l'hivernage 2007-2008 avec 32 oiseaux le 20 novembre 2007 au Ripault et un couple a niché au même endroit en 2008 (Voir article p. 13-17 dans le N°46 de L'Outarde).

CAPRIMULGIDÉS

L'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* les 11 et 12 mai 2007 a été observé vers 19 heures sur les bords de l'étang " neuf ".

APODIDÉS

Le Martinet noir *Apus apus* est observé en vol sur l'étang se nourrissant, par exemple 20 oiseaux le 20 mai 2007, 57 oiseaux le 9 mai 2008 et 15 oiseaux le 13 juin 2008.

UPUPIDÉS

La Huppe fasciée *Upupa epops* est présente, 3 oiseaux le 2 juillet 2006 et le 18 août 2007 aux Hayes, territoire occupé.

PICIDÉS

Le Torcol fourmilier *Jynx torquilla* a été observé deux fois, un mâle chanteur le 17 août 2007 et le 4 avril 2009. Le Pic vert *Picus viridis* est présent autour des étangs, nicheur probable.

Le Pic noir *Dryocopus martius* est présent dans la forêt de L'Épine.

Le Pic épeiche *Dendrocopos major* est présent autour des étangs, nicheur probable.

Le Pic mar *Dendrocopos medius* est présent dans la forêt de L'Épine.

Le Pic épeichette *Dendrocopos minor* est présent avec 2 oiseaux le 22 septembre 2008 aux abords de l'étang " neuf ".

ALAUDIDÉS

L'Alouette lulu *Lullula arborea* est présente autour des étangs.

L'Alouette des champs *Alauda arvensis* est présente et nicheuse dans les champs autour des étangs, 12 oiseaux le 9 mars 2006.

HIRUNDINIDÉS

L'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* est seulement présente en période de migration, 50 oiseaux le 31 mars 2006 et le 21 août 2006, 150 oiseaux chassent sur l'étang " neuf ".

L'Hirondelle rustique *Hirundo rustica* est nicheuse, par exemple le 15 mai 2006 à La Gaucherie, nids fréquentés inaccessibles. Elle niche à la ferme de la Petite

Mare. Elle est présente en période de migration, on note 200 oiseaux le 4 mai 2007, 200 oiseaux le 5 septembre 2007, 100 le 19 mars 2008 et 500 à la Mare le 14 septembre 2009.

L'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* est nicheuse au centre bourg de Coulombiers. Elle est présente sur les étangs en période de migration, 20 oiseaux le 6 avril 2008 et 28 oiseaux le 21 avril 2008.

MOTACILLIDÉS

Le Pipit des arbres *Anthus trivialis* est nicheur dans les environs des étangs, on note 10 oiseaux le 2 février 2003.

Le Pipit farlouse *Anthus pratensis* est noté lors des passages, par exemple 7 oiseaux le 20 juin 2007, 6 oiseaux le 7 novembre 2008 et 15 oiseaux le 7 octobre 2009.

Le Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* est présent en hivernage, 5 oiseaux le 25 novembre 2007.

La Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* est notée au passage, 5 oiseaux le 15 mars 2007, 7 adultes et 3 immatures le 15 septembre 2007 et 7 oiseaux principalement des jeunes le 19 août 2009.

La Bergeronnette printanière flavissima *Motacilla flava flavissima* est notée deux fois avec un oiseau le 8 octobre 2006 et le 15 septembre 2007.

La Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* est présente sur les étangs, 2 oiseaux le 15 octobre 2004 et 2 oiseaux le 3 octobre 2008.

La Bergeronnette grise *Motacilla alba* est nicheuse dans presque dans toutes les fermes autour des étangs, le 16 avril 2008 un couple sur son nid inaccessible avec apport de nourriture sur l'étang "neuf". On note sur cet étang un rassemblement de 123 oiseaux le 25 novembre 2007, de 79 oiseaux le 2 octobre 2008 et de 66 oiseaux le 11 octobre 2009.

TROGLODYTIDÉS

Le Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* est présent toute l'année, on note 2 oiseaux le 2 juillet 2006.

PRUNELLIDÉS

L'Accenteur mouchet *Prunella modularis* est présent toute l'année.

TURDIDÉS

Le Rougegorge familier *Erithacus rubecula* est présent toute l'année, le 2 juillet 2006 transport de nourriture à La Millière.

Le Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : présent en période de reproduction.

Le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* une donnée d'un oiseau le 3 octobre 2008 sur les bords des étangs.

Le Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* est présent en forêt de L'Épine le 21 septembre 1993.

Le Tarier des prés *Saxicola rubetra* observé le 3 et le 9 septembre 2006 en migration.

Le Tarier pâtre *Saxicola torquatus* est nicheur, le 6 avril 2004 un mâle avec transport de nourriture près des étangs et le 10 juin 2008 à La Grande Vallée, transport de nourriture.

Le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* est observé en migration.

Le Merle noir *Turdus merula* est nicheur et présent toute l'année.

La Grive litorne *Turdus pilaris* est présente en hiver, 11 oiseaux le 10 janvier 1999 et 11 oiseaux le 22 décembre 2006.

La Grive musicienne *Turdus philomelos* est présente toute l'année autour des étangs.

La Grive mauvis *Turdus iliacus* est présente en hiver, 6 oiseaux le 3 décembre 2007.

La Grive draine *Turdus viscivorus* est présente toute l'année.

SYLVIIDÉS

La Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : deux observations, 2 oiseaux le 24 septembre 2002 chantent et un oiseau le 28 septembre 2007.

La Locustelle tachetée *Locustella naevia* a été observée une fois sur l'étang le 24 septembre 1995 avec un couple.

La Locustelle lusciniode *Locustella luscinioides* : une observation d'un oiseau le 19 mai 1974.

La Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* une donnée, un oiseau le 26 avril 1980.

L'Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* est présente autour des étangs.

La Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* est présente toute l'année.

La Fauvette des jardins *Sylvia borin* un oiseau chanteur le 27 avril 2006.

La Fauvette grisette *Sylvia communis* un couple le 17 avril 2000 et le 10 juin 2006 à la Grande Vallée, un oiseau avec transport de nourriture.

La Fauvette pitchou *Sylvia undata* est présente dans la forêt de L'Épine.

Le Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* le 28 octobre 2008, première observation pour le département de la Vienne (voir article dans ce numéro de L'Outarde).

Le Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* est présent toute l'année et des chanteurs en période de reproduction.

Le Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* est présent en période de migration et de reproduction.

Le Roitelet huppé *Regulus regulus* un oiseau chanteur le 23 mars 2007 et 8 oiseaux sont présents le 25 novembre 2007.

Le Roitelet à triple-bandeau *Regulus ignicapilla* est présent, 2 oiseaux le 3 octobre 2008.

MUSCICAPIDÉS

Le Gobemouche gris *Muscicapa striata* 10 oiseaux le 20 juin 2007 et 7 oiseaux le 20 août 2007 à La Richardière.

Le Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* a été noté 5 fois en septembre.

ÆGITHALIDÉS

La Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* est certainement nicheuse, un couple le 18 avril 2006 et le 23 mars 2007 et 19 oiseaux le 26 septembre 2007 près des étangs.

PARIDÉS

La Mésange nonnette *Parus palustris* a été notée une fois le 26 septembre 2008.

La Mésange bleue *Parus caeruleus* est présente toute l'année et nicheuse.

La Mésange charbonnière *Parus major* est présente toute l'année et nicheuse.

SITTIDÉS

La Sittelle torchepot *Sitta europaea* est présente dans les bois autour des étangs.

CERTHIIDÉS

Le Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* est noté le 8 février 2008.

ORIOOLIDÉS

Le Lorient d'Europe *Oriolus oriolus* est noté le 26 juin 2007 et un nid fréquenté le 10 juin 2008 à La Grande Vallée.

LANIIDÉS

La Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* est notée le 10 juin 2008 à la Grande Vallée avec un nid et trois œufs et le 10 août 2009 à La Cagnoche, une femelle perchée avec de la nourriture dans le bec.

CORVIDÉS

Le Geai des chênes *Garrulus glandarius* est présent toute l'année.

La Pie bavarde *Pica pica* est nicheuse certaine : un couple et trois jeunes le 2 juillet 2006.

La Corneille noire *Corvus corone* est un oiseau nicheur autour des étangs, le 17 avril 2006 à Beauregard un nid occupé.

STURNIDÉS

L'Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* est nicheur, transport de nourriture le 15 mai 2008 à La Gaucherie.

PASSÉRIDÉS

Le Moineau domestique *Passer domesticus* est nicheur dans les fermes autour des étangs, un oiseau avec transport de nourriture le 16 juin 2008 à La Grande Vallée.

FRINGILLIDÉS

Le Pinson des arbres *Fringilla coelebs* est présent

toute l'année et nicheur, le 11 juin 2008 à La Grande Vallée, un oiseau avec transport de nourriture et le 7 janvier 2008 40 oiseaux au bords des étangs.

Le Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* est présent en hivernage, on note 5 oiseaux le 7 janvier 2008 près des étangs.

Le Verdier d'Europe *Carduelis chloris* est présent toute l'année.

Le Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* est présent toute l'année.

La Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* est présente toute l'année.

Le Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* : un mâle le 26 octobre 2002 et un couple le 12 janvier 2003.

Le Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : deux oiseaux le 28 octobre 2008.

EMBÉRIZIDÉS

Le Bruant jaune *Emberiza citrinella* : un mâle et une femelle le 17 avril 2000 et les 11 et 15 juin 2008 transport de nourriture à La grande Vallée.

Le Bruant zizi *Emberiza cirius* : deux couples le 9 mars 2006 et le 2 juillet 2006 au lieu-dit Les Hayes un oiseau avec transport de nourriture et le 26 août 2009 à Beauregard 2 oiseaux avec un jeune quémendant et nourrissage par le mâle.

Le Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : deux couples notés le 2 février 2003.

Le Bruant proyer *Emberiza calandra* est présent chanteur sur les bordures des champs, par exemple un mâle chanteur à " La Vitrierie " le 25 mai 2006.

Conclusions

Sur les étangs de Maupertuis plus de 140 espèces d'oiseaux ont été observées. Parmi elles, figurent 31 espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux. La majorité de ces espèces d'intérêt communautaire ne niche pas sur le site mais le fréquente lors de haltes migratoires. 72 espèces nichent de manière certaine ou probable sur le site ou à proximité immédiate. 53 espèces ayant un statut de conservation défavorable au niveau régional et inscrites sur la liste rouge des espèces nicheuses du Poitou-Charentes fréquentent le site durant tout ou partie de leur cycle biologique annuel.

Pour les années considérées, l'intérêt que présente le site est lié avant tout à la période de migration et d'hivernage. Si on ne considère que les oiseaux directement liés à l'eau, ce sont 65 espèces qui ont été observées sur les étangs de Maupertuis. Il y a donc une absolue nécessité de préserver le site et d'engager, si possible, des actions de protection.

