



Synthèse des données ornithologiques de l'année 2008

Coordinateur : Raphaël BUSSIÈRE

Élaboration du fichier : Raphaël BUSSIÈRE

LPO Vienne, 398 avenue de Nantes

86 000 POITIERS

Préambule :

Cette synthèse s'appuie sur les données enregistrées dans la base informatique "BdNat" de la LPO Vienne développée par Patrice THOUVENIN et installée en 2000.


La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Roger BOUARD :	PODICIPÉDIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, HIRUNDINIDÉS
Raphaël BUSSIÈRE :	CICONIIDÉS, COLUMBIDÉS, TURDIDÉS, LANIIDÉS, FRINGILLIDÉS
Marie-Noëlle & Bernard COUTURAUD :	PICIDÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS
Jean-Claude DESCOMBES :	MÉROPIDÉS
Grégory FAUPIN :	OTIDIDÉS, BURHINIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS, ALAUDIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, MUSCICAPIDÉS
Loïc JOMAT :	RALLIDÉS, RECURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, SCOLOPACIDÉS, TYTONIDÉS
François LECOMTE :	ANATIDÉS, ARDÉIDÉS
Catherine MALDONADO :	STRIGIDÉS, SYLVIIDÉS, ORIOIDÉS, EMBÉRIZIDÉS
Michel MASSON :	GRUIDÉS
Johan TILLET :	LARIDÉS, STERNIDÉS, ALCÉDINIDÉS, UPUPIDÉS, MOTACILLIDÉS
Benoît VAN HECKE :	ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS
Thomas WILLIAMSON :	PHASIANIDÉS, CUCULIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS, TICHODROMADIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS

Pour cette synthèse des données ornithologiques, 229 personnes ont envoyé leurs observations permettant ainsi de collecter 13 194 données pour 203 espèces. L'année a été plutôt riche avec notamment une première mention départementale, celle du Pouillot à grands sourcils ! L'hivernage du Tichodrome échelette sur la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers s'est poursuivi jusqu'au 31 mars. Le retour de l'espèce est noté le 11/10 où un individu arpentait les parois verticales de l'édifice. Le dortoir de Pies bavardes est suivi de façon hebdomadaire sur le campus de l'université de Poitiers durant l'hiver 2007-2008, atteignant un maximum de 377 individus le 10/01. Deux mâles de Garrot à œil d'or ont fait une apparition au plan d'eau de Saint-Cyr, mais elle fut brève, puisque l'espèce n'a été vue qu'une journée, celle du 17/02, malgré des recherches entreprises les jours suivants. Une observation d'une Pie-grièche méridionale est faite le 08/03 à Saint-Macoux ; la dernière donnée départementale remontait à 2004. La migration pré-nuptiale débute dans le courant du mois de mars avec notamment un groupe de 15 Avocettes élégantes en halte migratoire le 15 au plan d'eau de Saint-Cyr. De belles surprises se sont présentées : 1 Marouette ponctuée le 18/04 à l'étang de Combourg, 1 Guifette leucoptère parmi les Guifettes noires et moustacs le 04/05 à l'étang de Beaufour, 1 Bécasseau cocorli en plumage nuptial le 19/05 à l'étang de la Pétolée etc... Un Élanion blanc a stationné du 15/04 au 29/06 sur la commune de Coulombiers. La présence d'un Vautour fauve, du 13 au 18/05, sur le campus de l'université de Poitiers a permis d'attiser la curiosité universitaire face à ce géant du ciel. Un passage exceptionnel de Faucons kobez est observé dès le début mai et ce jusqu'à la mi-juin où 8 observations ont été répertoriées, comptabilisant 11 oiseaux. Comme en 2007, un Vanneau sociable a stationné dans le département mais cette fois-ci sur la commune de Saint-Clair, du 09 au 28/06. En période de nidification, le Pic cendré s'est fait entendre dans le bois des Coussières de Vivonne. La présence d'un mâle de Gorgebleue à miroir "cantonné" a été notée dans une parcelle de colza au Rochereau sans

que pour autant soit prouvée sa nidification. Cependant, trois nouvelles espèces rejoignent le cortège des espèces nicheuse départementales : l'Aigrette garzette et le Héron garde-bœufs à l'étang de Combourg et la Mésange noire dont la reproduction a été prouvée à Vivonne et à Queaux. Lors du suivi annuel des busards en plaine céréalière, un nid de Busard des roseaux contenant trois poussins a été découvert dans une parcelle de blé le 13/06 à Saint-Jean-de-Sauves. Autres bonnes nouvelles : après 27 ans d'absence, la Sterne pierregarin revient nicher à Saint-Cyr où 3 jeunes non volants sont aperçus le 23/07, à quoi s'ajoute la découverte d'un nid de Hibou des marais dans une prairie à Coulombiers. Le premier mouvement postnuptial débute avec l'observation d'un Courlis corlieu le 05/07 à Chouppes. Certains limicoles ont fait une halte dont notamment le Bécasseau de Temminck, le Chevalier stagnatile et le Pluvier guignard. Une Buse pattue a séjourné du 29/11 au 18/12 sur la commune de Montamisé.

Evolution du nombre de fiches et d'observateurs par année



mise à jour : le 30/12/09

Liste des observateurs :

Vivien AIRAULT (AirV) - Léo ALBERT (AlbL) - Nathalie ALBERT (AlbN) - Michel ALLARD (AlIM) - Anonyme ANONYME (AnoN) - Francis ARNAUD (ArnF) - Monsieur AUBERT (AubM) - Brigitte AYRAULT (AyrB) - Sébastien BAILLARGEAT (BailS) - Yves BARON (BarY) - Alan BAXTER (BaxA) - Sylviane BELLIN (BelS) - Thierry BERGES (BerT) - Jack BERTEAU (BerJ) - Louise BERTON (BerL) - Alain BOIREAU (BoiA) - Aurélie BONE (BonA) - Justin BONNIFAIT (BonJ) - Roger BOUARD (BouR) - Jean BOUIN (BouJ) - Laurent BOURDIN (BouL) - Thérèse BOUSSEMARY (BouT) - Claire BRAMARD (BraC) - Julian BRANCIFORTI (BraJ) - Olivier BRILLOUX (BriO) - Bernard BROUCKE (BroB) - Hélène BROUCKE (BroH) - Jean-Claude BRUN (BruJ) - Isabelle BRUNET (Brul) - Samuel BUJEAU (BujS) - Guenaël BURBAN (BurG) - Raphaël BUSSIÈRE (BusR) - Rémi CABIROL (CabR) - Didier CACOUAULT (CacD) - Roland CAIGNEAUX (CaiR) - Pascal CAVALLIN (CavP) - Philippe CHANTANT (ChaP) - François CHARMOY (ChaF) - Dominique CHAUSSEBOURG (ChaD) - Marie-José CHAUSSEBOURG (ChaM) - Thierry CHÉRIOT (CheT) - Patrice CHOISY (ChoP) - Patrick CHUIT (ChuP) -

Jean-Michel CLÉMENT (CleJ) - Marie COGNE (CogM) - Jean-Luc COIFFARD (CoiJ) - Philippe COLAS (ColP) - Florian COMMUNIER (ComF) - Jean-Paul CORMIER (CorJ) - Sylvain COURANT (CouS) - Pierre COUSIN (CouP) - Jean-Guy COUTEAU (CouJ) - Bernard & Marie-Noëlle COUTURAUD (CouBM) - Jacques DALLIER (DalJ) - Sylvie DAVID (DavS) - Dimitri DAVIGNON (DavD) - Martin DEBAETS (DebM) - Jean-Jacques DEBIAIS (DebJ) - Patricia DECHATRE (DecP) - Edith DEFORGES (DefE) - Luc DELHOMME (DeLl) - Christine DELLIAUX (DelC) - Cathy DELORD (DelC) - Jean DERVAUX (DerJ) - Chantal DESCHAMPS (DesC) - Jean-Claude DESCOMBES (DesJ) - Dominique DESJARDIN (DejD) - Coralie DEVENNE (DevC) - Françoise DEVILLE (DevF) - Matthieu DORFIAC (DorM) - Pascal DRUEL (DruP) - Gaëtan DUBOIS (DubG) - Thierry DUBOIS (DubT) - Bruno DUBRAC (DubB) - Samuel DUCEPT (DucS) - Louis DUPAS (DupL) - Philippe DUPONT (DupP) - Madame ERNOUL (ErnM) - Thierry FAITY (FaiT) - Grégory FAUPIN (FauG) - Bruno FILLON (FilB) - Bruno FLEURANT (FleB) - Rémy FLEURANT (FleR) - Philippe FOUQUES (FouP) - Jeanine FRADIN (FraJ) - Françoise FRANCO (FraF) - Gilles FROMONTEIL (FroG) - Miguel GAILLEDROT (GaiM) - Bernard GAROTIN (GarB) - Véronique GAUDUCHON (GauV) - Sophie GAUTHIER (GauS) - Daniel GILARDOT (GilD) - Vincent GILET (GilV) - Claudine GIRARD (GirC) - Malterre GIRAULT (GirM) - Francis GOVRE (GovF) - Céline GRACIEUX (GraC) - Freddy GRELLIER (GreF) - Sophie GREMILLET (GreS) - Benjamin GRIARD (GriB) - GROUPE local d'Archigny (GroA) - Thomas GUÉRARD (GueT) - Jean GUÉRIN (GueJ) - Pierre GUIGNARD (GuiP) - Patrica GUILLAUME (GuiPa) - Daniel GUILLET (GuiD) - Nicole GUY (GuyN) - Pierre GUY (GuyP) - Michel HAINAUT (HaiM) - Emmanuelle HAMELIN (HamE) - Thomas HÉRAULT (HerT) - Michaël HERBAUD (HerM) - Eric HOLTHOF (HolE) - Matthieu HOLTHOF (HolM) - Danièle HUTEAU (HutD) - Bertrand ISTIN (IstB) - Guy JARRY (JarG) - Eric JEAMET (JeaE) - Emilien JOMAT (JomE) - Loïc JOMAT (JomL) - Marie-Paul JOUBERT DE LA MOTTE (JouM) - Philippe JOURDE (JouP) - Martine KAESTNER (KaeM) - François KIHM (KihF) - Joëlle LAHOREAU (LahJ) - Jean-Paul LANCEREAU (LanJp) - Jean LANGOUMOIS (LanJ) - Frédéric LASALLE (LasF) - Guy LAURENT (LauG) - Thibault LAURENT (LauT) - Francis LAURENTIN (LauF) - Aymeric LE CALVEZ (LecA) - François LECOMTE (LecF) - Christian LEDUC (LedC) - Bernard LIÉGEOIS (LiéB) - Roselyne LIÉGEOIS (LiéR) - Adélaïde LIOT (LioA) - Dounia LIPOVOÏ (LipD) - Katia LIPOVOÏ (LipK) - Ronan LOAEC (LoaR) - Jean-François LOUINEAU (LouJ) - LPO VIENNE (LpoV) - Christopher LUCK (LucC) - Jérôme MAGNOU (MagJ) - Catherine MALDONADO (MalC) - Lydie MARTIGNOLLES (MarL) - Michel MASSON (MasM) - André MASSOT (MasA) - Jean-Jacques MEMIN (MemJ) - Madame MÉNIGOT (MenM) - Bruno MERCERON (MerB) - Fabien MERCIER (MerF) - Michel MÉTAIS (MetM) - Catherine MEYER (MeyC) - Vincent MILARET (MilV) - Gaëlle MOREAU (MorG) - Jonathan MORISSET (MorJ) - Nicolas MORON (MorN) -

Françoise MORTREUIL (MorF) - Yann NADAL (NadY) - Patrick NAINTE (NaiP) - Dominique NIORTHE (NioD) - Jean NIVEAU (NivJ) - Philippe NOUZILLEAU (NouP) - David OLLIVIER (OIID) - Régis OUVRARD (OuvR) - Reine PAPILLON (PapR) - Didier PAPOT (PapD) - Gérard PÉROLS (PerG) - Sophie PÉROT (PerS) - Alain PERSUY (PerA) - Jean-François PESSARD (PesJ) - Yann PICHON (PicY) - Olivier POISSON (PoiO) - Olivier POUVREAU (PouP) - Laurent PRECIGOUT (PreL) - Tony PRÉDOT (PreT) - Michel PROUST (ProM) - Dominique PROVOST (ProD) - Jean PROVOST (ProJ) - Alexis QUEYREL (QueA) - Charly RAIMBAULT (RaiC) - Nick RANSDALE (RanN) - Isabelle RAYNAL (RayI) - Claude RENAUD (RenC) - Guy RENAUD (RenG) - Robert RIBARDIERE (RibR) - Jean-Michel RICHEL (RicJ) - Patrick RIGAUD (RigP) - Thierry RIVET (RivT) - André ROBIN (RobA) - Alexis ROUSSEAU (RouA) - Sébastien ROUSSEAU (RouS) - Denis ROYER (RoyD) - Claudine ROYÈRE (RoyC) - Philippe SAUVAGET (SauP) - François SAVIN (SavF) - Emilie SERMENT (SerE) - Tristan SEVELLEC (SevT) - Daniel SIZLER (SizD) - Olivier SOLDI (Solo) - Patrice SOUCHAUD (SouP) - Johan TILLET (TilJ) - Serge TILLET (TilS) - Rémi TRONCHAIN (TroR) - Stéphane TROUBAT (TroS) - Benoît VAN-HECKE (VanB) - Marie-Blanche VASSEUR (VasM) - François VENEAU (VenF) - Julien VENTROUX (VenJ) - Charlie VERDIER (VerC) - VIENNE Nature (VieN) - Stéphane VILLARUBIAS (VilS) - Julien VILLET (VilJ) - Sylvie VINEE (VinS) - Thomas WILLIAMSON (WiIT) - Anna-Maria WOOLFORD (WooA) - Fabien ZUNINO (ZunF).

Liste alphabétique des étangs et plans d'eau de la Vienne, cités dans la synthèse :

Etang de Beaufour, Saulgé
 Etang de Beauregard, Iteuil
 Etang de Bergère, Pressac
 Etang de Biard, Montmorillon
 Etang de Chez Séguier, Pressac
 Etang de Chez Vincent, Pressac
 Etang de Combourg, Pressac
 Etang de Lambertière, Pressac
 Etang de Maupertuis, Coulombiers
 Etang des Brandes de la Châtre, Lathus-Saint-Rémy
 Etang de la Font, Adriers
 Etang de la Guingauderie, Adriers
 Etang du Léché, Saulgé
 Etang du Tinturier, Leignes-sur-Fontaine
 Etang Fouillamard, Montmorillon
 Etang La Bicoterie, Coussay-les-Bois
 Etang Le Cluzeau, Lathus-Saint-Rémy
 Plan d'eau de Saint-Cyr, Saint-Cyr



Légende

nom français (*)

nom scientifique (*)

statut dans le département de la Vienne

Pigeon colombin

Columba oenas

H, S

(38-24)

L'espèce est observée tout au long de l'année en faibles effectifs. Les données sont plus nombreuses de septembre à mars avec des groupes pouvant atteindre un maximum de 25 oiseaux le 12/01 à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée à Chauvigny (DubT), à Liniers (CouBM), à Saix (GuiP) et aux Trois-Moutiers (GuiP). Des oiseaux sont notés en migration active avec notamment l'observation d'un groupe de 19 oiseaux le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

nombre d'observations
et nombre de sites

(*) : d'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2004.
 statut dans le département de la Vienne :

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

ANATIDÉS

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (66-22)

Présent toute l'année avec un maximum de 8 oiseaux en période postnuptiale les 14 et 17/09 à l'étang de Combourg (BusR). La nidification est prouvée sur les six communes suivantes : Bellefonds (ChaM), La Chapelle-Moulière (ChaM), Dangé-Saint-Romain (DubG), Leignes-sur-Fontaine (BaiS), Mauprévoir (BusR) et Saulgé (RanN).

Oie cendrée *Anser anser* M, H (28-20)

La migration pré-nuptiale s'étale du 22/01 au 20/04, le vol le plus important étant celui de 160 ind. le 22/01 à Romagne (CabR). Le passage postnuptial débute le 17/10 et se termine le 26/11 avec un vol de 150 ind. le 17/11 à Poitiers (DubT).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* H (2-1)

Les deux observations nous proviennent du plan d'eau de Saint-Cyr avec 2 ind. le 23/01 (BouR) et 1 ind. le 19/10 (CouS).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (9-5)

Le peu d'observations transmises ne permet pas de déceler un pic de migration. Un maximum de 8 ind. est observé le 21/12 à l'étang de Chez Séguier (BusR).

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (42-11)

La nidification est prouvée le 21/06 à l'étang de Combourg avec l'observation d'une femelle accompagnée de 3 poussins (BusR). Malgré l'observation régulière de plusieurs couples de mai à août à l'étang de Beaufour, aucun indice de reproduction n'a été découvert.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (70-14)

Lors de la migration pré-nuptiale, un maximum de 97 oiseaux est observé le 13/02 à l'étang de la Pétolée (JomL). La nidification est prouvée sur deux sites : une femelle avec 3 poussins le 01/06 à l'étang Fouillamard (CavP) et une femelle avec 4 poussins le 08/06 à l'étang de Bergère (BusR).

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (205-68)

La reproduction a été prouvée sur 24 communes. Les premiers canetons sont observés le 27/03 à Persac (BaiS).

Canard pilet *Anas acuta* M (5-3)

L'ensemble des observations est réalisé pendant le passage pré-nuptial de février à mars, avec un maximum de 14 ind. le 19/02 à l'étang de Beaufour (BaiS).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (16-3)

Lors du passage pré-nuptial, la première et la dernière donnée nous viennent de l'étang de la Pétolée : une femelle le 28/02 (JomL) et un mâle le 29/06 (BusR).

Aucune donnée n'a été transmise lors du passage postnuptial.

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (47-9)

Le passage pré-nuptial donne lieu à des observations de janvier à mai avec un maximum de 20 ind. le 14/03 à l'étang de Beaufour (RanD). Lors du passage pré-nuptial, seulement trois données de novembre à décembre, avec un maximum de 5 ind. le 23/11 à l'étang de Beaufour (BouR).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (98-13)

Observé toute l'année. Le plus important rassemblement est noté le 27/01 à l'étang de Beaufour avec 80 oiseaux (RanN). La reproduction est prouvée à l'étang de Beaufour avec un minimum de 7 couples (GuiP), le 05/06 à l'étang du Tinturier avec l'observation d'une femelle accompagnée de 7 poussins et à l'étang de Lambertièrre avec une femelle et ses 2 poussins le 15/06 (LecF).

Nette rousse *Netta rufina* H, E (2-2)

Un mâle est observé le 31/03 à l'étang de Beaugard (JomL) ; une seconde donnée datée du 03/05 provient de l'étang de Beaufour (RanN).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (43-7)

La nidification est prouvée sur deux sites : à l'étang de Beaufour avec 7 couples reproducteurs (GuiP) et à l'étang de la Guingauderie avec 3 femelles accompagnées respectivement de 6, 7 et 2 poussins (FleB).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* H (1-1)

Deux mâles sont observés le 17/02 au plan d'eau de Saint-Cyr (FleB).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (21-20)

Espèce notée tout au long de l'année mais probablement victime d'un désintérêt de la part des observateurs, ce qui explique le faible nombre de données collectées chaque année. Trois cas de nidification certaine avec 7 juv. le 22/06 à Bourg-Archambault (CavP), 3 juv. le 30/07 à Craon (BusR) et à Vicq-sur-Gartempe sans plus de précision (LanJ). En période internuptiale, les groupes excèdent rarement la dizaine d'individus, comme le 04/10 à Moulismes avec 10 ind. (RanN) ou encore le 02/09 à Coulombiers avec 40 ind. en plusieurs bandes (BouR). Il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages des individus d'élevage issus de lâchers à des fins cynégétiques.

Perdrix grise *Perdix perdix* S (16-12)

De même que pour la Perdrix rouge, il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages des individus d'élevage issus de lâchers à des fins cyné-

gétiques. Toutefois, la Perdrix grise est plus rarement notée dans le département. Sa reproduction est prouvée à Vouillé avec 2 juv. le 26/07 (CouBM) et à Vicq-sur-Gartempe entre le 01/04 et le 31/07 sans plus de précision (LanJ). Petites bandes notées à l'intersaison dans la moitié sud du département avec 12 ind. le 12/10 à Fleuré (CouBM) et 18 ind. le 16/10 à Saulgé (RanN).

Caille des blés *Coturnix coturnix* E (38-35)

Il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages des individus d'élevage issus de lâchers à des fins cynégétiques. Toutefois, aucune observation hivernale comme cela a été le cas ailleurs en France ces dernières années. Les dates d'apparition sont donc parfaitement classiques : premier chant noté le 05/04 au Rochereau (LiéB) et dernier contact avec l'espèce le 25/08 à Saulgé (RanN). La nidification est prouvée à deux reprises avec 4 juv. le 22/06 à Bourg-Archambault (CavP) et à Vicq-sur-Gartempe sans plus de précision (LanJ). Notée dans 31 communes.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (36-36)

Il demeure impossible de distinguer les oiseaux sauvages des individus d'élevage issus de lâchers à des fins cynégétiques. Les observations s'étalent de mars à novembre avec curieusement une absence d'observations collectées en hiver. Un groupe de 7 ind. le 03/11 à Saulgé constitue la seule donnée d'oiseaux en bande (RanN). Un seul cas de nidification certaine à Vicq-sur-Gartempe sans plus de précision (LanJ). Noté dans 32 communes.

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (72-25)

Observé tout au long de l'année. Des groupes plus ou moins importants sont notés en mars avec notamment 14 ind. le 19 à l'étang de Beauregard (JomL) et 10 ind. le 26 à l'étang du Tinturier (BaiS). La reproduction a été prouvée à 7 reprises : 1 ind. couve le 18/05 à l'étang Le Cluzeau (CavP), 1 adulte est vu avec 3 jeunes le 18/05 à l'étang de Beauregard (JomL), 1 ind. couve le 23/05 à l'étang de Chez Vincent (BusR), 1 adulte avec 2 jeunes le 30/06 à l'étang La Bicoterie (LanJ), 1 adulte avec 3 jeunes le 06/07 à l'étang du Léché (GuiP), 1 adulte avec 3 jeunes le 12/07 à l'étang de Beaufour (GuiP) et 2 adultes avec 3 jeunes le 15/08 à l'étang de Maupertuis (FauG). Un couple est cantonné le 17/03 dans un bassin d'orage à Châtellerault (LanJ). Après la période de nidification, des groupes se forment et peuvent atteindre des effectifs importants comme celui de 49 ind. le 01/09 à l'étang de Beauregard (JomL).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (181-33)

L'espèce est présente toute l'année. La reproduction

est prouvée sur 12 communes : Adriers, Champagné-Saint-Hilaire, Chapelle-Viviers, Coulombiers, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes, Iteuil, Leignes-sur-Fontaine, Mauprévoir, Montmorillon, Pressac et Saulgé. La couvaison des œufs est notée dès le 28/03 à l'étang de Biard (BaiS) et ce jusqu'au 21/06 à l'étang de la Font (FleB). Un ragondin profite de l'absence du " couveur " pour déguster un à un les 4 œufs d'une ponte, observation réalisée le 21/06 à l'étang de Combourg (BusR). Les premiers jeunes sont aperçus le 18/05 à l'étang de Beauregard (JomL). Deux couples avec respectivement 1 et 2 jeunes sont observés le 03/08 à l'étang de Combourg (BusR). A la fin de la période de nidification, l'espèce se rassemble, pouvant constituer des groupes de plus d'une dizaine d'oiseaux mais c'est en période hivernale que l'effectif est au plus fort avec notamment la présence de 50 ind. le 22/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (12-5)

Lors du passage pré-nuptial, l'espèce est observée à partir du 24/03 avec la présence de 2 oiseaux à l'étang de Beaufour (BaiS) et ce jusqu'au 25/04 à l'étang de Combourg où un oiseau a fait une brève halte (BouR et BusR). Un individu a stationné du 24 au 29/03 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). Lors du passage post-nuptial, 1 à 2 oiseaux stationnent du 24/08 au 01/09 à l'étang de Beaufour (BusR et RanN). Une observation ponctuelle de 2 oiseaux est notée le 19/12 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaM).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (154-36)

Espèce observée tout au long de l'année avec des effectifs importants en hivernage. Un suivi régulier sur les neuf dortoirs connus pendant l'hiver 2007-2008 a permis de dénombrer un maximum de 245 individus à la mi-janvier. Le plan d'eau de Saint-Cyr retient l'effectif le plus important avec 153 oiseaux (BouR). L'espèce se fait de plus en plus rare à partir de la fin avril. Un à 4 oiseaux stationnent ici et là, pour la plupart des immatures, excepté un adulte en plumage nuptial le 30/05 à l'étang de Combourg (BusR). C'est à partir du mois de septembre qu'on aperçoit les premiers vols migratoires avec notamment 38 ind. le 13/09 à La Puye (HolE), 13 ind. le 04/10 à Villiers (JomL) et 44 ind. le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

ARDÉIDÉS

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* M (12-8)

La première observation de l'année est celle d'un adulte, le 23/03 à Cenon-sur-Vienne (GuiD). Malgré l'observation régulière de plusieurs individus sur le secteur de Pressac pendant la période de nidification, aucune preuve de reproduction n'a été rapportée (BusR).

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* M (109-39)
Présent toute l'année. La première preuve de nidification départementale est notée à l'étang de Combourg avec 16 couples totalisant 44 jeunes (BusR).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* M (70-26)
Présente toute l'année. La première preuve de nidification départementale est notée à l'étang de Combourg avec 1 couple (BusR). Un seul jeune prendra son envol.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (122-52)
Observée tout au long de l'année. Les effectifs les plus importants sont observés sur les secteurs des étangs de Saulgé avec un maximum de 27 ind. le 21/11 (RanN) et de Combourg avec 22 ind. le 27/01 (BusR).

Héron cendré *Ardea cinerea* S (194-88)
Trois nouveaux sites de nidification ont été découverts sur les communes de Champagné-Saint-Hilaire (JomL), La Ferrière-Airoux (CouBM) et Latillé (PreL). Le recensement réalisé de deux colonies donne les chiffres suivants : 95 nids sur le secteur de Pressac (BouR) et 67 nids à l'étang de la Pétolée (BusR).

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (44-15)
La première observation a lieu le 22/03 à l'étang de Combourg (BusR). Un minimum de 14 couples est dénombré sur le secteur de Pressac (BusR et LecF) et seulement un couple à l'étang de Beaufour (GuiP).

CICONIIDÉS

Cigogne noire *Ciconia nigra* M (6-4)
En migration pré-nuptiale, l'espèce est observée dans les derniers jours de mars avec 8 ind. le 28/03 à Civaux (MenM), 1 ind. le 29/03 à Moulismes (RanN) et 1 ind. le 31/03 à Bonneuil-Matours (VerC). Pas d'observation en période estivale. Il faut attendre le 07/08 pour apercevoir la descente des migrateurs vers leurs quartiers d'hivernage avec 3 oiseaux à Mauprévoir (CleJ). 3 autres sont notés le 28/08 à Moulismes (RanN). Un adulte est posé à côté de deux Hérons cendrés le long d'un ruisseau le 18/09 à Adriers (CleJ).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (52-24)
Du 14 au 18 janvier, 4 à 6 oiseaux se nourrissent dans une prairie à Coussay-les-Bois (CabR, DesC et LahJ). La migration pré-nuptiale s'étale du 07/02 avec 1 ind. à Marçay (DelC) au 19/05 avec 1 ind. à Châtellerault (LanJ). Des individus profitent d'une halte pour se percher sur les lampadaires autour du terrain de football de Montamisé le 25/02 (GovF) et sur des pylônes électriques le 25/02 à Poitiers (JomL). La migration post-nuptiale débute avec l'observation de 2 ind. le 12/08 à Moulismes (RanN). A partir de la dernière décade d'août, le passage s'intensifie. 36 ind. se posent dans un champ en fin de journée le 21/08

à Celle-Levescault (RenG). Des groupes plus ou moins importants (1 à 88 ind.) survolent le département afin de rejoindre leurs quartiers d'hivernage avec un rush constaté du 06 au 15/09, totalisant 305 migrateurs. La dernière donnée répertoriée est celle de 3 ind. en vol vers le sud-est le 21/10 à Lathus-Saint-Rémy (LasF).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* E (42-35)
Les premiers migrateurs sont contactés le 26/04 à Château-Larcher (JomL) et le 27/04 à Saulgé (RanN). Une observation tardive est relevée le 21/09 à Coulombiers (JomL). Deux nids sont découverts les 18/05 et 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP).

Milan noir *Milvus migrans* E (101-74)
Observé dès le 25/02 à Châtellerault (LanJ) et jusqu'au 06/09 à Montamisé (PouO). Souvent vu en milieu agricole après les fauches, à la recherche de petits animaux morts comme les 04/05 à La Ferrière-Airoux (BusR), 11/05 à Vouzailles (SolO) et 06/06 à Saint-Secondin (WilT). Également noté proche de zones humides comme le 11/06 à Vouneuil-sur-Vienne (LioA) ou de décharges comme le 07/03 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (ChoP).

Milan royal *Milvus milvus* M (17-15)
Observé principalement en migration pré-nuptiale avec 11 observations sur 17. Fréquente aussi bien les secteurs de plaine agricole, avec notamment un oiseau le 14/03 à Craon (FauG), que les secteurs bocagers. Un individu, probablement le même, est observé les 19 et 20/01 à Ouzilly (GuiPa).

Vautour fauve *Gyps fulvus* A (7-2)
Un individu a stationné dans notre département du 13/05 au 18/05. Vu initialement à Beaumont (VanB) suite à l'appel d'un riverain à la LPO, il est retrouvé quelques heures plus tard au niveau du domaine universitaire de Poitiers, où il a stationné plusieurs jours (BusR, LieB, MetA et al.). Des stationnements ont été signalés également dans d'autres localités du Poitou-Charentes.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (49-33)
Ce grand rapace migrateur est aperçu dès le 06/03 à Poitiers (JomL) et ce jusqu'au 14/09 à Vouneuil-sur-Vienne (HoIE). Il est le plus souvent observé en vol lors de ses séances de chasse : 1 ind. le 03/05 à Saix (HoIE) - ou lors de ses rares vols en feston : 1 ind. le 04/05 à Bonneuil-Matours (PouO). La reproduction est prouvée à Bourg-Archambault (CavP) et à Monthoiron (HoIE).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (44-25)
Présent tout au long de l'année. La reproduction est prouvée à Saint-Jean-de-Sauves par la découverte d'un

nid le 13/06 dans une parcelle de blé où 3 poussins étaient présents (DelC et VanB). N'hésite pas à se mêler à d'autres espèces de busards dans les dortoirs de fin d'été comme cette femelle avec les rémiges en mue le 13/08 à Cherves ou le 28/08 à Vouzailles (BusR).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M ? (26-6)

Un adulte a séjourné du 15/04 au 29/06 à Coulombiers (BouR, BusR et al.). Un à deux oiseaux sont observés du 31/08 au 12/09 à Saint-Sauvant (BouR, CouP et RenG) et une observation ponctuelle d'un individu le 21/09 est faite à Biard (BerJ).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (169-111)

Ce busard est le plus observé dans notre département. Des indices de nidification sont rapportés comme le 25/05 à Chauvigny lors d'un passage de proie du mâle à la femelle (DubT) ou le 07/06 lors de parades nuptiales à Vernon (CouB). Fréquente également les dortoirs postnuptiaux : 10 ind. le 06/08 à Frozes (WiIT).

Busard cendré *Circus pygargus* E (89-68)

Le premier contact est celui d'un mâle adulte noté le 23/03 à Lusignan (GuyN) et le dernier contact a lieu le 02/09 à Saint-Sauvant (JomL). Ce migrateur est le plus " suivi " du département et de nombreux indices de nidification sont relevés. Une soixantaine de nids ont été suivis, et si nécessaire protégés, aussi bien en milieu de grande culture qu'en milieu naturel. Sur les dortoirs postnuptiaux, jusqu'à 108 busards, toutes espèces confondues, ont été dénombrés à Frozes (BouR) et 25 oiseaux étaient encore en dortoir le 28/08 à Vouzailles (BusR).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (15-13)

Assez peu d'observations pour cette espèce discrète. À signaler un oiseau trouvé blessé dans un jardin le 25/01 à Montreuil-Bonnin (BouT). Un indice de reproduction probable est noté le 07/04 à Monthoiron où un couple est vu en parade (HolE). Souvent aperçu furtivement en vol comme le 11/11 à Lavoux (BusR et SauP).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (83-68)

Observations tout au long de l'année avec quelques preuves de nidification. Découverte d'un nid occupé le 05/06 à Champigny-le-Sec (DebM) et d'un nourrissage de juvéniles par un adulte du 26/07 au 28/07 à Béruges (CouBM). Observé aussi lors de transports de proie vers le nid, notamment le 22/05 à Mazeuil (SolO).

Busse variable *Buteo buteo* S (155-116)

Nombreuses observations et indices de reproduction pour ce rapace le plus observé. Nid occupé découvert le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP) ou le 19/04 à Montreuil-Bonnin (VanB). Observé aussi lors de parades aériennes parfois bruyantes comme le 07/02 à Blaslay avec 3 ind. (HutD).

Busse pattue *Buteo lagopus* M, H ? (4-2)

Un individu a séjourné du 29/11 au 18/12 à Montamisé (HolE, DubT et al.).

Aigle botté *Aquila pennata* M, E (3-3)

Observation d'un oiseau en vol le 01/06 à Vouneuil-sur-Vienne (HolE). Un ind. en phase claire est vu le 02/05 à Vivonne (JomL) et un second le 14/06 à Château-Larcher (JomL).

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* M (31-16)

Observé au passage pré et postnuptial. Souvent perché proche de l'eau comme le 12/01 au Vigeant (FleB) ou posé sur un arbre mort comme à Coulombiers le 04/04 (BusR). Avec de la chance, on peut l'apercevoir en action de pêche comme ces 2 oiseaux vus le 31/03 à Availles-Limouzine (DebJ).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (130-97)

Nombreuses preuves de nidification avec notamment un couple nichant dans un grenier à Doussay (HutD) et un couple menant à bien sa nichée de 5 jeunes dans un nichoir à Fleuré (FleB). S'installe aussi dans les arbres où une aire contenant 4 jeunes est découverte le 14/06 à Coulombiers (BusR) voire sur des pylônes électriques comme le 05/06 à Valdivienne (WiIT).

Faucon kobez *Falco vespertinus* A (12-9)

Rares sont les données de cette espèce. Elle a été observée du début mai à la mi-juin. La première donnée est celle d'un mâle en vol de chasse avec deux faucons hobereaux le 07/05 à Château-Larcher (JomL). Un mâle de deuxième année est perché sur un fil électrique le 16/05 à Saint-Maurice-la-Clouère (WiIT). Trois oiseaux (2 mâles et 1 femelle) stationnent du 20 au 21/05 à Coulombiers (BouR, BusR et al.). Au mois de juin, l'espèce est contactée à quatre reprises : 2 ind. le 02/06 à Frozes (ComF), une femelle le 08/06 à Saint-Martin-l'Ars (BusR), une femelle le 14/06 à Château-Larcher (JomL) et une femelle le 16/06 à Sillars (BaIS).

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (29-22)

Observé en saison " hivernale " jusqu'au 18/04 à Charrais (VanB) et dès le 20/09 à Château-Larcher (JomL). Noté posé dans les labours le 23/02 à Saint-Jean-de-Sauves (LieB) et le 16/04 à Maisonneuve avec une proie (FauG).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (71-53)

Ce migrateur est observé dès le 02/03 à Chenevelles

(OuvR) et jusqu'au 28/10 à Château-Larcher (JomL). Quelques preuves de reproduction sont notées avec en particulier la découverte de nids sur des pylônes électriques : nid avec 2 jeunes le 30/07 à Ingrandes (LanJ) et 2 jeunes nourris à proximité du nid le 21/08 à Tercé (CouBM).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (6-3)

Suivi des deux couples connus à ce jour dans le département en milieu naturel. Sur le premier site, la femelle a délaissé ses œufs peu après le terme de la période de couvain (JamE). Un envol de deux jeunes est constaté sur le second site (JamE).

RALLIDÉS

Râle d'eau *Rallus aquaticus* S (13-11)

Essentiellement contacté par ses cris en automne et en hiver. Quelques données en période de reproduction. Nicheur possible à Champagné-Saint-Hilaire (JomL), Saint-Léomer (CavP) et Saulgé (RanN). Toutes les données concernent un seul individu sauf une avec 2 ind. le 21/12 à Marigny-Chemereau (BraJ)

Marouette ponctuée *Porzana porzana* M (2-2)

Une donnée printanière le 18/04 à l'étang de Combourg (BusR) et une autre automnale le 01/09 à Iteuil (JomL).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (101-57)

Observée toute l'année. Nicheur certain sur 25 communes. Maximum de 16 individus le 22/07 à Poitiers (BouR).

Foule macroule *Fulica atra* S, M (219-44)

Observée toute l'année. Maximum de 436 ind. le 14/09 à l'étang de Combourg (BusR). Nicheur certain sur 19 communes.

GRUIDÉS

Grue cendrée *Grus grus* M (184-63)

Le passage pré-nuptial totalise environ 23 400 grues en 122 observations, très étalées, du 01/01 au 23/05. Des petits arrivages jusqu'à mi-février, certaines musardent en route : gagnage le 15 à Haims (GilD), puis à partir du 17, on assiste à un accroissement du nombre, de la solitaire le 17 à l'étang de Beaufour (FleB) à 380 le 18 à Blanzay (LucC). Mais c'est surtout le 24 que la bonde est lâchée : de nombreux vols, de la dizaine d'individus à 200 puis 5 000 à Adriers (LasF), 2 665 à Saulgé (RenG), 5 900 à Mauprévoir (BusR), soit 17 000 pour cette seule journée ! Quelques promeneuses ensuite, jusqu'à la mi-avril : 1 posée le 01/03 pour 6 semaines à Lathus-Saint-Rémy (RanN), 29 dans un champ le 03/03 à Saint-Sauvant (FaiT), 16 en nuitée à la Pétolée le 18/03 (JomL) et 6 posées

le 19/04 à l'étang de Beaufour (RanN). Deux individus blessés à la patte sont découverts, au milieu d'une prairie pâturée par les ovins, le 01/05 à Pressac (DorM). Entre les 04 et 09/05, un oiseau est retrouvé mort dans la prairie tandis qu'un autre continue à s'alimenter de batraciens (BusR et DorM). Ce dernier est revu pour la dernière fois le 23/05 (BusR).

À l'automne, les premières sont vues le 13/10 à Marigny, en vol, au nombre de 80 (BraJ). Les choses sérieuses commencent le 02/11 : 400 vues et beaucoup entendues de nuit. Près de 3 000 individus le 03/11, dont 1 102 à l'étang de Beaufour (RanN), 1 millier du 15 au 19, 750 du 22 au 30. Calme relatif début décembre, nouveaux passages du 09/11 au 29/11 : 100 le 10 à Fleuré (PerS), 300 le 23 à l'étang de Beaufour (ChaD). Comme cela arrive souvent, la migration postnuptiale est passée plus à l'Est, notre département se trouvant sur la bordure du couloir de cette migration : au total " seulement " 6 805 grues pour 62 observations.

OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* E (89-66)

La première donnée printanière est celle d'un oiseau vu en passage migratoire le 05/03 à Châtellerault (BriO). Des groupes sont observés jusqu'au début avril avec notamment 8 oiseaux le 01/04 à La Grimaudière (FauG). Un suivi intensif a permis de recenser 95 mâles chanteurs et de découvrir 9 nids. Observation d'un accouplement le 23/06 à Frozes (BouL). Au cours des comptages des rassemblements postnuptiaux, 93 individus ont été recensés lors du premier passage le 06/09 et 37 lors du second le 04/10. Ils étaient concentrés essentiellement sur la plaine de Neuville-Mirebeau.

RECURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus* M (7-2)

4 adultes ont stationné à l'étang de la Pétolée du 25/04 au 04/05 (BusR, JomL et LieB). Une femelle adulte a été observée lors de sa migration postnuptiale le 19/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* M (2-2)

Deux données printanières pour ce limicole plutôt côtier : 15 ind. le 15/03 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaF) et 1 ind. le 27/04 à l'étang de la Pétolée (JomL).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

E, S (147-108)

L'espèce est observée de fin janvier à mi-octobre. La première mention porte sur l'observation de 3 oiseaux

le 24/01 à Château-Larcher (JomL) et la dernière date du 11/11 avec 28 ind. à Sillars (RanN) et 12 ind. à Saulgé (RanN). Trois preuves de nidification ont été répertoriées : nids découverts le 05/06 à Civaux (WiT) et le 06/06 à Queaux (WiT), et un couple avec 2 jeunes dans un champ de maïs le 12/06 à La Chapelle-Montreuil (LpoV). Le premier rassemblement est noté le 15/08 à Coulombiers avec la présence d'un groupe de 15 ind. (FauG). Lors des comptages des rassemblements postnuptiaux, 544 ind. ont été observés lors du premier passage le 06/09 et 995 lors du second passage le 04/10.

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot *Charadrius dubius* M, E (36-12)
6 premiers individus observés le 14/03 à l'étang de la Pétolée (JomL) ; le dernier est noté au même endroit le 12/09 (BusR). La reproduction est prouvée sur 3 communes : 1 couple avec 2 jeunes au plan d'eau de Saint-Cyr (GiD), 1 couple avec 1 jeune à Marnay (JomL) et 1 couple avec 4 jeunes à Ingrandes (LanJ).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* M (2-2)
Deux données lors de la migration postnuptiale : 1 juvénile le 15/08 au plan d'eau de Saint-Cyr (LanJ) et 1 ind. le 07/09 à l'étang de la Pétolée (BusR).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* H (42-22)
Présent jusqu'en mars puis à partir de début octobre avec 66 ind. le 04/10 à Vouzailles (JomL). Maximum de 1 800 ind. le 19/01 à l'étang de la Pétolée (JomL).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* M (3-1)
Un mâle adulte a stationné du 02 au 04/05 à l'étang de la Pétolée (BusR, JomL et LieB).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* M (2-2)
Uniquement des adultes observés au repos dans des labours lors de leur migration postnuptiale : 5 le 21/08 à Vouzailles (BusR et MalC) et 1 le 24/08 à Saulgé (BusR).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (178-86)
Observé toute l'année. Troupes importantes en hiver : jusqu'à 9 687 individus le 08/01 à Château-Larcher (JomL). Nicheur certain sur 7 communes : Antran (LanJp), Buxeuil (LanJ), Chapelle-Viviers (GroA), Doussay (HutD), Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), Usson-du-Poitou (JomL) et Vicq-sur-Gartempe (LanJ).

Vanneau sociable *Chettusia gregaria* M (8-4)
Un adulte est observé du 09 au 28/06 à Saint-Clair (FauG et al.) puis revu non loin de là le 15/07 à Saint-Jean-de-Sauves (ViJ).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* M (2-2)

Deux données en migration postnuptiale dans le sud-est du département : 1 ad. le 27/07 à l'étang de la Pétolée (BusR) et 2 ad. le 30/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* M (1-1)
Un adulte en plumage nuptial est observé le 19/05 à l'étang de la Pétolée (JomL).

Bécasseau variable *Calidris alpina* M (9-3)
Observé lors de sa migration pré-nuptiale à l'étang de la Pétolée, avec jusqu'à 27 individus le 25/04 (BusR), et lors de sa migration postnuptiale aux étangs de Maupertuis et de Beaufour jusqu'au 02/12 (RanN).

Combattant varié *Philomachus pugnax* M (8-1)
Toutes les données proviennent de l'étang de la Pétolée. 7 données lors de la migration pré-nuptiale et 1 donnée en migration postnuptiale. Maximum de 16 individus le 27/04 (BusR).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* H, M (24-10)
Observée en hiver et lors de la migration. Absente du département de la mi-avril à la mi-juillet. Maximum de 42 individus le 20/11 à l'étang de Beaufour (RanN).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (11-5)
Notée essentiellement en forêt lors de la parade nuptiale par sa croule. 1 donnée hivernale le 21/12 à Oyré (OuvR).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (32-20)
Contacté dès le 23/02 à Saulgé (RanN). Noté nicheur probable à Cherves (Solo), Craon (LpoV), Frozes (RicJ), Saint-Sauvant (GiV et JomL), Saulgé (RanN) et Sillars (DubT). Dernière donnée le 26/09 à Chauvigny (DubT). Maximum de 7 ind. le 15/04 à Saint-Sauvant (BouR).

Courlis corlieu *Numerius phaeopus* M (1-1)
Un individu est observé en vol le 05/07 à Chouppes (Solo).

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (27-7)
Noté dès le 14/03 à l'étang de la Pétolée (JomL) et jusqu'au 29/05 au plan d'eau de Saint-Cyr (ChaF) puis du 27/06 à l'étang de la Pétolée (BusR) au 19/09 à l'étang de Maupertuis (JomL). Maximum de 12 individus le 28/03 à la Pétolée (JomL).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (48-9)
Premier oiseau noté le 16/04 à Château-Larcher (GiV). La dernière donnée de migration pré-nuptiale est datée du 23/05 à l'étang de la Pétolée avec 2 individus

(BusR). Migration postnuptiale : du 26/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN) au 13/11 à l'étang de Beaufour (RanN).

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* M (2-1)
1 imm. a stationné les 06 et 07/09 à l'étang de la Pétolée (BusR et JomL).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (77-19)
Contacté dans le département toute l'année. Quelques cas d'hivernage aux étangs de Beaufour, Maupertuis ou du Léché avec 1 à 3 ind. Maximum de 10 ind. le 05/12 à l'étang de Beaufour (RanN).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (13-5)
Migration pré-nuptiale : du 04/04 au 17/06, maximum de 7 oiseaux le 02/05 à l'étang de la Pétolée (JomL). Migration postnuptiale : 04/07 au 15/08, maximum de 3 oiseaux le 18/07 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (88-27)

Noté toute l'année. Passage pré-nuptial de fin mars à fin mai avec un maximum de 9 ind. le 02/05 à l'étang de Combourg (BusR). Passage postnuptial de début juillet à mi-novembre avec un maximum de 18 ind. le 23/08 à l'étang de Maupertuis (CouP). Quelques individus hivernants isolés : 1 les 01 et 04/01 à l'étang de Beaufour (RanN), 2 le 12/01 à l'étang de Maupertuis (GueJ), 1 le 04/02 à Châtellerault (LioA), 1 le 21/02 à Lathus-Saint-Rémy (BaiS) et 1 le 30/12 à l'étang de Beaufour (ChaD).

LARIDÉS

Mouette rieuse *Larus ridibundus* H (67-26)
Les données concernent principalement des observations en période hivernale, notamment avec le dortoir au plan d'eau de Saint-Cyr où près de 3 000 individus sont dénombrés le 01/01 (BouR). Les derniers groupes hivernants sont notés jusqu'au 20/03 avec 40 individus à Rouillé (VasM). Les observations printanières concernent de faibles effectifs sur les principaux étangs du département. Notons cette attaque d'un Faucon hobereau sur 1 ind. le 06/07 à Migné-Auxances (FauG). La dispersion postnuptiale débute le 17/07 à Coulombiers avec l'observation de 130 individus (BouR).

Goéland leucopée *Larus michahellis* H (4-3)
Les données mentionnent majoritairement des oiseaux isolés, aucun groupe n'est noté pour cette année. Un immature est observé en période de dispersion postnuptiale le 08/07 à Maisonneuve (SolO). Les trois autres données proviennent d'individus hivernant notamment au plan d'eau de Saint-Cyr avec 1 adulte

et 1 immature le 02/01 (JomL) et un individu le 21/12 à Iteuil (BraJ).

Goéland brun *Larus fuscus* H (3-3)
4 immatures sont observés en migration postnuptiale dont un adulte le 04/09 à Rouillé et 1 adulte accompagné de 2 immatures le 04/10 à Vouzailles (JomL). Une seule donnée concerne un adulte hivernant le 27/01 au plan d'eau de Saint-Cyr (JomL).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (15-7)
Les observations s'étalent jusqu'au mois de mars puis reprennent en juin. Un maximum de 17 individus le 03/02 (SauP) et le 19/11 (ChaD) au plan d'eau de Saint-Cyr. Un immature est noté le 22/06 à l'étang de Combourg (BusR).

STERNIDÉS

Sterne naine *Sternula albifrons* M (1-1)
Une seule observation mentionnant deux adultes le 05/07 à Port-de-Piles (FauG). Cette espèce trouvera-t-elle les conditions favorables pour se reproduire dans le département ?

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* M (15-7)
Bonne nouvelle pour cette espèce puisqu'elle est de nouveau nicheuse dans le département après 13 ans d'absence ; la première nidification à Saint-Cyr remonte à 1981 ! Malgré les parades nuptiales de 4 individus à Adriers (FleuB), c'est à la faveur d'un îlot en graviers créé dans le cadre de la réserve ornithologique du lac de Saint-Cyr qu'un couple va s'installer. Deux oiseaux sont repérés le 07/07 en train de chasser à plusieurs reprises des corneilles et un faucon hobereau (LioA). Le 23/07, trois jeunes non volants sont observés malgré la présence des engins de chantier (GilD).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (43-8)
Première observation réalisée le 04/04 à Coulombiers (JomL). Le passage pré-nuptial s'effectue du 04/04 au 17/06, d'importants effectifs sont notés avec respectivement 24 adultes le 22/05 à l'étang de Beaufour (RanN) et 18 ind. le 02/05 à Dangé-Saint-Romain (FauG). Seulement deux données à Coulombiers (CouP et BouR) sont rapportées lors du passage postnuptial. Signalons la présence de trois oiseaux le 28/07 au plan d'eau de Saint-Cyr (TroS).

Guifette noire *Chlidonias niger* M (10-3)
L'espèce est observée uniquement sur 3 sites du département avec un effectif record de 8 individus le 03/05 à Coulombiers (BouR).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* M (1-1)
C'est la quatrième mention de cette espèce pour la Vienne. Elle concerne un oiseau observé en migration

prénuptiale le 04/05 à l'étang de Beaufour parmi un groupe comprenant 10 Guifettes moustacs et 6 Guifettes noires (RanN). La dernière observation remontait à septembre 1993 à Pressac.

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (38-24)

L'espèce est observée tout au long de l'année avec de faibles effectifs. Les données sont plus nombreuses de septembre à mars avec des groupes pouvant atteindre un maximum de 25 oiseaux comme le 12/01 à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée à Chauvigny (DubT), à Liniers (CouBM), à Saix (GuiP) et aux Trois-Moutiers (GuiP). Des oiseaux sont notés en migration active, notamment un groupe de 19 oiseaux le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (253-191)

De novembre à janvier, la majorité des données mentionne des groupes aux effectifs importants : 1 800 ind. le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE), 1 500 ind. le 14/01 à Saint-Julien-l'Ars (DubT), 3 000 ind. le 23/11 à Mauprévoir (BusR), 1 400 ind. le 07/12 à Pressac (BusR), 2 500 ind. le 12/12 à Venduvre-du-Poitou (HutD), 3 000 ind. le 21/12 à Payroux (BusR) et 2 300 ind. le 27/12 à Archigny (HolE). La reproduction est prouvée sur 25 communes. Les chanteurs se font entendre dès la mi-janvier, la reproduction la plus précoce relevée est celle du 19/01 à Poitiers (WilT). Les parades et accouplements ne tardent pas et les premiers apports de matériaux au nid sont constatés à la mi-février : le 14/02 à Saint-Julien-l'Ars (BusR). Un jeune est visible au nid le 27/03 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM) alors qu'un nid garni de deux œufs est découvert le 26/05 à Lavoux (DubT). Les premiers oiseaux en migration sont détectés à partir du mois de septembre : 11 ind. le 20/09 à Château-Larcher (JomL) pour culminer en novembre avec de nombreux vols migratoires totalisant 2 160 oiseaux le 03/11 à Saulgé (ChaM).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (139-85)

Présente toute l'année, observée à l'unité ou en petits groupes ne dépassant pas les 11 individus. Les preuves de reproduction s'étalent de février à juillet. 27 cas de nidification certaine sont relevés. La nidification la plus précoce est constatée le 18/02 à Archigny avec la découverte d'un nid contenant des œufs (OuvR) et la plus tardive le 15/06 à Poitiers où des jeunes sont visibles au nid (BusR). Un maximum de 11 oiseaux, perchés sur un noyer, est observé le 20/12 à Craon (BusR).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* E (162-147)

Première donnée le 04/04 à Quinçay (ProJ) et dernière

observation le 06/09 au Rochereau (JomL). La reproduction est prouvée à Leigné-sur-Usseau (LanJ) et aux Ormes (LanJ). Des rassemblements postnuptiaux sont notés ici et là : 30 ind. le 15/08 à Angles-sur-l'Anglin (HolE), 42 ind. le 24/08 à Saulgé (BusR) et 56 ind. le 06/09 au Rochereau (JomL).

CUCULIDÉS

Coucou gris *Cuculus canorus* E (182-149)

Premier chanteur le 14/03 à Coulombiers (BusR). Au moins 2 cas de nidification prouvés dont l'observation rarissime d'une femelle en train de pondre dans un nid de Pie bavarde qu'elle quitte, un œuf dans le bec, le 22/04 à Château-Larcher (JomL) ! A Chauvigny, un jeune non-volant est récupéré par un particulier et apporté à la LPO Vienne pour être ensuite acheminé en centre de soins. Enfin, un juvénile est noté le 25/08 à Vouillé (SizD) sans plus de précision : il constituait la dernière observation de l'année.

TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* S (64-45)

Observée toute l'année. Au moins une dizaine d'effraies sont retrouvées mortes en bordure de route, suite à des collisions avec des voitures. Nicheur certain sur 12 communes, essentiellement dans des nichoirs, des clochers ou des granges. 3 jeunes non volants sont observés à Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), Saulgé (CavP) et Valdivienne (WilT) ; 4 jeunes observés à Asnières-sur-Blour (AnoN) et à Ceaux-en-Couhé (CavP) ; 5 jeunes observés à Vivonne (BonA).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* E (3-3)

Un premier chant est entendu le 14/04 dans un jardin du quartier de Montmidi à Poitiers (BerJ), tandis que les derniers chants sont localisés le 30/05 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (VilS). Un individu, posé sur une route, est signalé le 23/05 à Frozes (RicJ).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (65-46)

L'espèce est régulièrement observée du 12/01 au 25/09, et 10 mentions font état de nicheurs certains. Plusieurs chanteurs sont signalés en divers endroits, à l'image de ce mâle posté sur un silo le 03/07 à Vouzailles (SolO). Le 08/06 à Bourg-Archambault (CavP) et à Thollet (CouB et CouM) des oiseaux sont observés transportant des proies, tandis qu'un adulte et un jeune en duvet sont posés sur un fil le 15/06 à Coulombiers (BusR). Notons en juillet ce jeune à l'envol depuis un nichoir, à Fleuré (FleB).

Chouette hulotte *Strix aluco* S (34-28)

Présente toute l'année, elle est notée du 22/02 au 22/09 avec 10 preuves de nidification certaine. Un nid est occupé le 25/03 à Saint-Pierre-de-Maillé (HolE). Un jeune est retrouvé coincé dans un grillage le 27/04 à Montamisé (RivT). Un nid contenant 4 œufs est localisé à 12 m de hauteur sur une falaise le 02/05 à Béruges (GilV). La hulotte peut être victime de collision avec des véhicules, comme cet individu blessé à l'aile le 21/08 à Raslay (ErnM).

Hibou moyen-duc *Asio otus* S (63-42)

Il s'entend aussi bien qu'il se voit : 2 mâles chanteurs sont signalés le 09/02 à Marçay (PerA), un couple se bat avec des pies pour l'obtention du nid le 04/03 à Marçay (PerA), un oiseau est observé en vol le 05/04 à Montcontour (BusR) et un individu chasse en pleine journée avant de se poser sur un piquet le 18/05 à Loudun (BusR et MalC). On recense 23 preuves de nidification certaine dont plusieurs avec des nichées de 4 jeunes : le 26/04 à La-Puye (DubT) ou encore le 27/04 à Saint-Sauveur (LanJ). Un petit dortoir est toujours présent l'hiver à Saint-Julien-l'Ars, avec un maximum de 4 ind. le 11/02 (BusR).

Hibou des marais *Asio flammeus* M (141-41)

L'hiver 2007-2008 a vu un afflux exceptionnel de Hiboux des marais dans le département. Ainsi, jusqu'à début mars, il n'est pas rare d'observer régulièrement des dortoirs d'une cinquantaine d'oiseaux : 103 ind. le 26/01 à Rouillé (CouP), 60 ind. le 03/02 à Saint-Jean-de-Sauves (BusR), 50 ind. le 10/02 à Craon (FauG) et 46 autres le 23/02, toujours à Craon (BusR). Une preuve de nidification certaine est relevée le 14/06 à Coulombiers (RenG), avec la découverte d'un nid contenant 5 œufs et un poussin. Le 15/04, en fin de journée, des individus paradent à Coulombiers (BouR).

CAPRIMULGIDÉS**Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* M, E (11-9)**

L'espèce est observée d'avril à août. Deux chanteurs se font entendre le 27/04 dans le bois des Coussières à Vivonne (JomL). A noter l'observation d'un individu chantant en plein jour le 21/05 à Journet (DubT). Un nid, garni de deux œufs, est découvert le 20/06 en forêt de Moulière (RaiC). La dernière mention porte sur la présence de six oiseaux le 09/08 dans le bois du Barendeau à Gizay (CouBM).

APODIDÉS**Martinet noir *Apus apus* E (84-34)**

L'espèce est aperçue pour la première fois le 11/04 à Poitiers où 5 oiseaux volent au-dessus du Clain (TroS). La reproduction est prouvée sur 13 communes.

Quelques colonies sont relevées ici et là avec notamment : 10 couples à Lésigny (LanJ), 12 couples à Champagné-Saint-Hilaire (JomL), 24 couples à Vivonne (JomL) et 34 couples à Château-Larcher (JomL). Un jeune, âgé de quelques jours, est ramassé au sol le 18/08 à Poitiers (FauG). Un individu est observé pour la dernière fois le 11/09 sur le campus universitaire de Poitiers (BusR).

ALCÉDINIDÉS**Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*****E, H (68-31)**

L'espèce est principalement notée sur les différents plans d'eau du département. Seulement 21 données concernent des observations réalisées en bord de rivière. Un oiseau est vu en vol le 12/10 sur la réserve naturelle du Pinail (CouJ). Notons seulement trois indices de reproduction certaine avec une donnée mentionnant la découverte de terriers fréquentés dont un déjà utilisé en 2007 à Nouaillé-Maupertuis (CouBM).

MÉROPIDÉS**Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (48-27)**

Les premiers individus ont été repérés le 27 avril, au nombre de 25 sur la Gartempe (LahJ) et de 9 dans une carrière à Sillars (RanN). Début mai, les oiseaux s'installent et creusent des terriers. 14 colonies sont dénombrées, comptant entre 1 et 7 couples (DesJ). 8 d'entre elles sont installées sur les berges de la Creuse et de la Gartempe (25 couples), le long de prairies pâturées par des bovins, profitant des abreuvoirs naturels. Les 6 autres sont dans des carrières de sable et de dolomie (23 couples). Au total, 48 couples se sont reproduits en 2008, contre 67 en 2007. Les derniers individus ont été observés le 23 août à Angles-sur-l'Anglin (HolE).

UPUPIDÉS**Huppe fasciée *Upupa epops* E (113-90)**

Un individu est noté en période hivernale le 29/01 à Lizant (DorM), oiseau égaré ou très en avance ! La période de migration débute en mars, 4 oiseaux sont observés ensemble le 31/03 à Rouillé (VasM). Le dernier oiseau est noté le 16/08 en Forêt de Moulière du côté de Bonneuil-Matours (CouBM). 16 preuves de nidification certaine sont référencées avec un nourrissage tardif mentionné le 05/08 à Archigny (OuvR).

PICIDÉS**Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M (8-6)**

Les observations, peu nombreuses, ont eu lieu entre

le 29/03 et le 21/08. Un seul cas de reproduction est noté avec un couple nourrissant les jeunes dans une loge de pic à Persac (FleB). En période de nidification, les chants se font entendre à la réserve naturelle du Pinail (LieB et JouP), à Montmorillon et à Sillars (CavP).

Pic vert *Picus viridis* S (105-94)

Espèce notée presque toute l'année. 8 cas de nidification certaine sont notés entre le 22/03 et le 31/07 à Bignoux (OuvR), Coulombiers (BusR), Doussay (HutD), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lusignan (RenG), Mauprévoir (BusR) et Vaux (JomL).

Pic cendré *Picus canus* E (1-1)

Une seule observation pour cette espèce rare contactée trois fois en 2007 et jamais de 2004 à 2006. Le mâle chanteur entendu le 06/05 à Vivonne indique un nicheur potentiel dans le massif forestier des Coussières (JomL).

Pic noir *Dryocopus martius* S (64-51)

Espèce observée toute l'année. 7 cas de nidification certaine sont répertoriés sur les communes suivantes : Beaumont (LanJp), La Roche-Posay (LanJ), Verrue (HutD), Vivonne (PapD) et dans la forêt de Vouillé-Saint-Hilaire (VanB).

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (113-96)

L'espèce est présente toute l'année. Elle fréquente occasionnellement les mangeoires comme ces trois individus profitant d'une boule de graisse le 09/02 à Marçay (JomL). 20 preuves certaines de nidification sont recensées entre le 22/03 et le 19/06. Une loge est trouvée dans un noisetier à 1,20 m de hauteur (WiIT).

Pic mar *Dendrocopos medius* S (16-10)

Espèce discrète mais présente tout au long de l'année. Seulement 4 observations certaines de nidification : le 30/03 à Givray (RoyD), le 06/05 à Saint-Benoit (GilV), le 11/05 à Cherves (SolO) et le 30/05 en forêt de Moulière (CouBM).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (29-23)

Tambourinage entendu le 12/02 (BusR). Seulement 4 observations certaines de nidification : construction d'une loge à Givray (RoyD), découverte d'une loge occupée à Lathus-Saint-Rémy (CavP), couple nicheur comme en 2007 à Châtellerault et à Vicq-sur-Gartempe (LanJ).

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* E (3-1)

Un mâle chanteur est observé à trois reprises entre le 03/05 et le 11/06 à Cissé (GuiP).

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (33-27)

Noté du 13/02 au 29/10. La reproduction est prouvée sur 5 communes : Champigny-le-Sec (Boul), Jaunay-Clan (ProD), Migné-Auxances (BusR), La Roche Rigault (BusR) et Valdienne (WiIT). A noter la découverte d'un nid en bordure de route dans les hautes herbes le 05/06 à Valdienne (WiIT) et un adulte accompagné de 2 jeunes le 07/08 à Migné-Auxances (BusR).

Alouette lulu *Lullula arborea* S (49-38)

Observée toute l'année. Les chants retentissent dès le 06/01 à Archigny (OuvR). Un groupe de 35 ind. est noté en migration active le 23/02 à Château-Larcher (JomL). Aucune mention de nidification certaine. Les premiers et derniers migrateurs postnuptiaux sont détectés respectivement au nombre de 3 et 38 oiseaux les 20/09 et 29/10 à Château-Larcher (JomL). Un groupe hivernal de 35 ind. est observé le 31/12 à Château-Larcher (JomL).

Alouette des champs *Alauda arvensis* S, M, H (187-152)

Notée tout au long de l'année, plus particulièrement au mois de mai. La reproduction est prouvée sur 9 communes : Anché (JomL), Bourg-Archambault (CavP), Chapelle-Viviers (GroA), Château-Garnier (BusR), Loudun (BusR et MalC), Messemé (GriB), Mignaloux-Beauvoir (JomL), Usson-du-Poitou (BusR) et Vivonne (JomL). Un nid avec trois œufs est découvert le 03/05 à Anché (JomL). Quelques groupes sont notés en hiver, avec un maximum de 852 ind. le 08/01 à Château-Larcher (JomL).

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (39-24)

Première observation d'un oiseau le 14/03 à l'étang des Brandes de la Châtre (RanN). On note la présence de 60 ind. voletant au-dessus de l'eau le 31/03 à Iteuil (JomL). La reproduction est prouvée sur 10 communes : 30 couples le 02/05 à Goux (WiIT), 30 couples le 04/05 à Availles-en-Châtellerault (DupL), 50 couples le 04/06 à Port-de-Piles (WiIT), nids fréquentés non comptabilisés le 05/06 à Bonneuil-Matours (LioA) et le 10/06 à Dangé-Saint-Romain (LanJ), 54 couples le 14/06 à Saulgé (CavP), 6 couples le 26/06 à Vicq-sur-Gartempe (LanJ), 50 couples à Châtellerault (BurG), 20 couples à Naintré (BurG) et 7 couples à La Roche-Posay (LanJ). L'espèce est notée pour la dernière fois le 08/09 avec l'observation de trois oiseaux au plan d'eau de Saint-Cyr (LioA).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (224-112)

La première observation est celle de deux oiseaux le 28/02 à Charroux (MasA). À partir du mois de mars,

la migration bat son plein avec notamment : 240 ind. le 10/03 à l'étang de Beaufour (BaiS) et 100 ind. le 19/03 à l'étang de Maupertuis (BouR). La reproduction est prouvée sur 38 communes. La confection des nids débute à partir de la mi-avril comme l'indique ce transport de boue noté le 15/04 à Coulonges (CouBM). Un transport de nourriture au nid est observé le 18/05 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Des secondes pontes sont constatées à Béthines (QueA). A la fin de l'été, des rassemblements prémigratoires sont relevés ici et là : 300 ind. le 12/09 à l'étang de la Pétolée (BusR) et 946 ind. Château-Larcher (JomL). La dernière observation est celle d'un oiseau aperçu en vol le 02/11 à Château-Larcher (JomL).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (91-30)

L'espèce est observée de mars à octobre. La première mention porte sur un oiseau, vu en vol, le 10/03 à Fontaine-le-Comte (DucS). Les observations s'intensifient à partir de la dernière décennie de mars où sont notés des groupes d'une vingtaine d'oiseaux et plus : 40 ind. le 28/03 à Vivonne (JomL) et 20 ind. le 31/03 à Iteuil (JomL). La reproduction est prouvée sur 31 communes. Des colonies sont comptabilisées ici et là avec notamment : 25 nids occupés à Château-Larcher (JomL), 45 nids occupés à Champagné-Saint-Hilaire (JomL), 50 nids occupés à Lésigny (LanJ), 64 nids occupés à Couhé (JomL) et 264 nids occupés à Vivonne (JomL). Un groupe de 500 oiseaux est posé au sol dans un champ en repousse de colza le 15/09 à Vouneuil-sous-Biard (BerL). L'espèce est observée pour la dernière fois le 05/10 à l'étang de Combourg (BusR).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (11-10)
Nicheur certain noté le 03/05 à Anché, avec un couple transportant des matériaux (JomL). Un couple est également observé à Valdivienne mais sans preuve de reproduction certaine (WiIT). La dernière donnée mentionne deux adultes le 12/08 à Sillars (RanN).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (96-85)
Les premiers individus sont notés le 18/03 en migration active et le premier chant est entendu le 29/03 à Château-Larcher (JomL). 5 données apportent la preuve d'une reproduction certaine le 04/05 à Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), le 07/05 à Liglet (CouBM), le 11/05 à Sillars (CavP) et le 18/05 à La Roche-Rigault (BusR). Une donnée plus tardive concerne un adulte transportant de la nourriture le 01/06 à Chauvigny (DubT).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (43-29)
La plupart des données concerne des oiseaux hivernants ou migrants avec une dernière observation printanière

de 100 ad. le 03/04 à La Chapelle-Montreuil (WiIT). La migration automnale reprend le 04/10 avec un effectif record de 200 ind. à Vouzailles (JomL).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (21-5)
Espèce observée principalement au bord des étangs du département pendant les saisons d'automne et d'hiver. Les données hivernales de fin d'année concernent uniquement des oiseaux observés à l'étang de Beaufour avec un effectif record de 9 ind. le 09/11 (RanN).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (61-41)

Au printemps, un individu de la sous-espèce *iberiae* (Bergeronnette ibérique) est repéré dans un groupe de 11 le 12/04 à Frozes (WiIT). 6 indices de reproduction certaine sont recensés notamment dans la plaine céréalière avec des nids dans des parcelles cultivées en blé ou en colza au Rochereau le 28/05 et le 03/06 (WiIT) mais également le 25/04 à Dangé-Saint-Romain (LanG). Effectif record en période pré-nuptiale avec 40 ind. le 25/04 à Usson-du-Poitou (BusR) et 44 ind. en période post-nuptiale le 06/09 à Vouzailles (JomL).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (1-1)

Cette bergeronnette, à la tête jaune vif, est observée le 12/04 à Frozes (WiIT) lors de sa migration pré-nuptiale pour rejoindre son aire de reproduction située dans les Îles Britanniques.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (52-37)

Nicheur commun dans tout le département avec 48 indices de reproduction dont seulement 8 certains. 4 jeunes juste volants sont observés en pleine séance de nourrissage le 26/07 au parc thermal à La-Roche-Posay (OuvR).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (129-81)

20 cas de reproduction certaine en grande partie détectés grâce au transport de nourriture. Deux nids sont découverts dont un dans un arbre mort le 16/04 à Coulombiers (BusR) et un le 28/06 à Saint-Léomer (CavP). D'autres nids sont installés dans des tas de terre du chantier du parc éolien du Rochereau le 10/06 (WiIT) mais seront malheureusement détruits. Un dortoir urbain, fréquenté depuis plusieurs années dans le quartier de la gare à Poitiers, a permis de dénombrer 60 ind. le 03/12 (BusR) et 70 ind. le 21/12 (CouBM).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* H (5-3)

3 données concernent la migration pré-nuptiale avec un groupe de 3 adultes le 21/02 à Usson-du-Poitou

(JomL). 2 données pour la migration postnuptiale avec 1 ind. à chaque fois le 29/10 à Château Larcher (JomL) et le 21/11 à Saulgé (RanN).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (204-162)

La reproduction est prouvée sur 23 communes. Notons l'élaboration d'un nid dès le 22/03 à Smarves dans les toilettes du parc de loisirs (CouBM) ou la découverte d'un nid dans un trou de mur le 14/05 à Vaux (JomL). Une nichée de 7 jeunes au nid est notée le 01/09 à Ceaux-en-Couhé (CavP).

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (102-78)

La reproduction est prouvée sur 12 communes. En avril, des transports de matériaux sont notés à La Chapelle-Montreuil (WiIT), Château-Larcher (JomL), Poitiers (JomL) et Sillars (CavP). Juvéniles observés à Gouex (RenG), Lathus-Saint-Rémy (CavP) et Lusignan (RenG).

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (153-131)

Espèce présente tout au long de l'année. Le mois de mai représente 70 % des données répertoriées. 9 chanteurs sont dénombrés le 20/01 dans le bois du Grand Aiguillon à Ligugé (JomL). La reproduction est prouvée sur 17 communes. Un nid est découvert au pied d'un érable où le couple nourrit les jeunes le 22/04 à Château-Larcher (JomL). Un nid garni de 5 œufs est trouvé le 28/05 à Chauvigny (DubT).

Rosignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (204-181)

Premiers oiseaux notés le 03/04 avec un chanteur à Archigny (FauG) et à La Chapelle-Moulière (WiIT). Dernière observation d'un individu le 25/09 à Poitiers (OuvR). La reproduction est prouvée sur 9 communes. Des transports de matériaux sont repérés le 22/04 à Château-Larcher (JomL) et le 02/05 à Vivonne (JomL). Un nid est découvert le 12/05 à Lathus-Saint-Rémy et quelques jours plus tard des apports de nourriture par le couple attestent de la présence d'oisillons au nid (CavP). Des transports de nourriture sont également notés le 07/06 à Saint-Maurice-la-Clouère (CouBM), le 08/06 à Bourg-Archambault (CavP) et le 08/06 à Liglet (CouBM).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (7-1)

Un mâle, cantonné, est observé dans une parcelle de

colza du 04/06 au 23/06 au Rochereau sans pour autant qu'on puisse apporter la preuve d'une nidification (LieB et RicJ).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (148-81)

Peu nombreuses sont les observations en période hivernale. Un maximum de 3 oiseaux est noté le 28/01 à la cathédrale de Poitiers (BusR). Les premiers chants retentissent le 14/03 à Coulombiers (JomL) et à Coussay-les-Bois (DesC). Nidification certaine relevée dans 32 communes. Migrateurs notés en petit nombre avec un maximum de 7 oiseaux le 20/09 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (77-38)

Première observation le 21/03 avec un mâle à Poitiers (CavP) et dernière donnée le 30/09 à Saulgé (RanN). Noté nicheur avec certitude dans 7 communes. Un nid est découvert le 18/05 à Lathus-Saint-Rémy et un autre, garni de 3 œufs, le 25/05 à Poitiers (TroS). Des transports de nourriture sont constatés jusqu'au 14/06 à Vivonne (JomL).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (22-18)

Les observations printanières sont étalées du 28/03 au 04/05, avec un maximum de 5 oiseaux le 30/04 à Saulgé (RanN). Un couple est observé le 09/06 à La Chapelle-Moulière mais il n'a malheureusement pas été revu les jours suivants (CouBM). Le passage postnuptial débute le 30/07 à Craon avec l'observation d'un individu (BusR) et s'intensifie au mois de septembre où un maximum de 6 oiseaux est dénombré le 06/09 au Rochereau (JomL). La dernière mention est datée du 05/10 à Châtellerault (LanJ).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (103-83)

Absence de données en novembre et en décembre. Les observations sont rares en période hivernale et concernent pour la plupart des mâles, notamment le 03/01 à Coulombiers (JomL) et le 19/01 à Iteuil (JomL). Noté nicheur avec certitude dans 22 communes. Un couple aménage un nid le 01/05 à Couhé (JomL) et les premiers jeunes sont observés le 18/05 à Leignes-sur-Fontaine (OuvR).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (55-42)

Première observation le 05/03 à Saulgé (RanN) et dernière le 04/10 à Coulombiers (BouR). Reproduction prouvée à Angles-sur-l'Anglin (HolE), à Biard (BerJ) et à Jaunay-Clan (ProD).

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (3-3)

Deux observations printanières : 1 ind. le 20/04 à Archigny (OuvR) et 1 ind. le 27/04 à Saint-Maurice-la-Clouère (LipK). Une donnée automnale avec l'observation d'un oiseau le 04/11 à Saulgé (RanN).

Merle noir *Turdus merula* S (273-203)

Espèce notée tout au long de l'année avec un recueil de données important pour le mois de mai qui représente à lui seul 70 % des données répertoriées. La reproduction est prouvée dans 39 communes. Un nid garni de 5 œufs est découvert le 25/04 à Chauvigny (DubT). Les transports de nourriture sont constatés de fin avril à mi-juillet. Deux cas de leucisme notés : 1 femelle le 09/03 à Poitiers (WiIT) et 1 mâle le 11/10 à Poitiers (CouS).

Grive litorne *Turdus pilaris* H (29-23)

Observée de janvier jusqu'au 05 avril à Archigny (OuvR) puis en fin d'année, notée à partir du 29 octobre à Château-Larcher (JomL). Les groupes les plus importants : 100 ind. le 13/02 à Saint-Maurice-la-Clouère (CouBM), 100 ind. le 18/02 à Vicq-sur-Gartempe (LanJ), 141 ind. le 28/03 à Joussé (JomL) et 200 ind. le 23/11 à Château-Larcher (JomL).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (143-115)

Espèce couramment notée au fil de l'année. Les observations répertoriées deviennent plus rares à partir de novembre et ce jusqu'au mois de janvier. La reproduction est prouvée dans 11 communes. Un nid garni d'un œuf est découvert dans une haie à 1,50 m du sol le 22/03 à Mauprévoir (BusR) et un autre dans un buisson épineux où la femelle était en position de couvain le 29/03 à Craon (BusR). Des transports de nourriture sont constatés jusqu'au 14/06 à Saulgé (CavP). Migrateur noté à plusieurs reprises comme ce groupe de 140 individus en migration active le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

Grive mauvis *Turdus iliacus* H (29-19)

Hiver 2007-2008 : notée jusqu'au 28/03 à Joussé (JomL). Hiver 2008-2009 : notée à partir du 10/10 à Lavoux (ChaM). De petites bandes hivernales regroupent 50 individus le 12/01 à Vouillé (GueJ) et 35 individus le 20/12 à Château-Larcher (JomL).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (50-42)

Les chants retentissent dès le début de l'année avec notamment ce chanteur le 02/01 à Saint-Cyr (JomL) et le 03/01 à Château-Larcher (JomL). Notée nicheuse avec certitude dans 7 communes. Des transports de nourriture sont observés à Chiré-en-Montreuil (CouBM), à Plaisance (WiIT), à Usson-du-Poitou (BusR) et à Vivonne (JomL). Un nid garni de poussins est découvert à Rouillé (RenG). Un groupe de 18 oiseaux est observé le 26/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN).

SYLVIIDÉS**Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (37-26)**

Les mentions portent uniquement sur des chanteurs,

comme le 01/05 à Château-Larcher (JomL) ou le 24/06 à Migné-Auxances (ProD). Il n'y a aucune preuve de nidification certaine dans le département. Les effectifs les plus notables sont de 3 oiseaux entendus le 03/05 et le 11/05 à Champagné-Saint-Hilaire et le 03/05 à Anché (JomL).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (56-40)

Elle se fait entendre du 03/04 au 21/09, notamment le 24/04 à La Roche-Posay (WiIT), le 02/06 à Cissé (ProD) et le 01/09 à Saint-Sauvant (BouR). 2 preuves de nidification certaine sont relevées : le 30/07 à Verrue où sont observés 3 juvéniles (BusR), puis à Biard où sont constatés des transports de nourriture (BerJ).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (18-13)

L'espèce est présente du 12/04 au 01/07, mais aucune mention de nicheuse certaine. Ce sont les mâles qui se font entendre, comme deux chanteurs le 20/04 à Quinçay (VanB), ou encore deux autres le 25/04 à Pressac (BusR). L'effectif maximal est de trois chanteurs le 01/07 à Vouillé (CouBM).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* E (7-3)

Espèce observée seulement du 05/04 au 21/05. Deux mâles sont entendus le 03/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL) et un le 21/05 à Saulgé (RanN). Aucune preuve de nidification certaine n'est relevée.

Rousserolle effarvée *Acrocephalus scirpaceus* E (24-14)

La première donnée date du 27/04 à Saulgé (RanN). La Rousserolle se fait entendre plus qu'elle ne se montre : 5 mâles chanteurs le 03/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL) et un autre le 17/06 à Saint-Clair (Solo). Une seule reproduction est prouvée à l'étang de Combourg où des transports de nourriture sont observés les 08/06 et 21/06 (BusR). Les effectifs les plus importants sont de 9 mâles chanteurs le 21/06 à l'étang de Combourg (BusR), et de 7 entre le 10/03 et le 15/07 à Leigné-sur-Usseau (LanJ). La donnée la plus tardive date du 23/07 au plan d'eau de Saint-Cyr (GilD).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (132-121)

La première mention est datée du 19/04 à Saulgé (Ran N). 72 % des données décrivent des mâles chanteurs, comme le 03/06 dans un champ de colza au Rochereau (WiIT), ou ces 8 ind. le 11/05 à Romagne (JomL) et le 19/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL). La reproduction est prouvée à 17 reprises avec notamment la construction d'un nid le 27/04 à Sommières-du-Clain (CouBM) et d'un autre le 14/05 à Vaux (JomL). Des transports de nourriture ont lieu le 06/06 à Moussac (WiIT), et un nid est découvert le

28/06 à Saint-Léomer (CavP). Notons cet individu qui a percuté (sans dommage) une vitre le 04/06 à Poitiers (FauG). La donnée la plus tardive date du 15/07 à La Roche-Posay et à Leigné-sur-Usseau (LanJ).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* E (311-256)

Son chant se fait entendre dès le 13/01 à Château-Larcher (GilV). L'arrivée de 10 ind. est notée le 18/03 toujours à Château-Larcher (JomL), tandis que des groupes de 30 et 50 ind. sont observés le 20/09 sur le plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) d'une part, et à Château-Larcher (JomL) d'autre part. La reproduction est prouvée à 24 reprises avec notamment la découverte d'un nid garni le 21/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP), et d'un jeune nourri par le mâle le 22/06 à Quinçay (AlbN).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (45-44)

La première observation est notée le 19/03 à Saulgé (BaiS). De nombreux mâles sont ensuite entendus mais seulement 7 nicheurs certains sont relevés. Un nid est construit le 07/05 à Liglet (CouBM), et des transports de nourriture sont observés : le 31/05 à Gizay (CouBM), le 07/06 à Sain-Maurice-la-Clouère (CouBM), le 21/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Les derniers oiseaux observés sont un groupe de 8 ind. en halte migratoire le 01/09 à Château-Larcher (JomL).

Fauvette grisette *Sylvia communis* E (147-129)

Première mention de l'espèce le 18/03 à Château-Larcher (JomL). 22 notes la décrivent nicheuse certaine : apport de matériaux le 16/04 à Brigueil-le-Chantre (CouBM) et le 27/04 à Usson-du-Poitou (JomL). Des parades sont observées le 11/05 à Romagne (JomL). Deux jeunes non volants sont observés le 30/05 à Morton (WiIT), et des transports de nourriture sont fréquemment relevés : le 01/06 à Montmorillon (CavP), le 11/06 à Migné-Auxances (HutD) et le 30/07 à Craon (BusR). Les 7 derniers individus sont notés le 01/09 à Château-Larcher (JomL).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (32-13)

La seule donnée hivernale d'une Fauvette pitchou a été notée le 27/02 sur la réserve naturelle du Pinail (JomL). Puis une seconde donnée est notée le 29/03 à Château-Larcher (JomL). 7 preuves de nidification certaine sont relevées dont la construction d'un nid le 28/04 à La Chapelle-Moulière (WiIT), le transport de nourriture le 16/05 à Vouillé (CouBM) et des jeunes non volants nourris par les adultes le 14/06 à Vivonne (JomL). L'effectif le plus important compte 7 ind. le 14/08 à Liniers (CouBM). La mention la plus tardive est celle d'un oiseau noté le 07/09 à la réserve naturelle du Pinail (HoIE).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* M (1-1)

La première mention départementale nous vient de

Coulombiers où un individu se fait entendre puis est observé quelques secondes le 28/10 (JomL).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (31-29)

L'espèce est régulièrement observée du 29/03 au 15/07. Les données transmises sont essentiellement celles de mâles chanteurs : le 06/05 à Bignoux (FauG), le 20/05 à Montamisé, ou encore le 31/05 à Gizay (CouBM). Une seule preuve de nidification certaine, le 21/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP) avec un transport de nourriture. Les effectifs maximaux relevés sont de 13 chanteurs le 07/04 au Bois de Saint-Pierre à Smarves (CouBM), et de 10 autres le 11/05 au Bois Baudry à Cherves (SolO).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* M, E (10-7)

La première donnée date du 03/05 à Saix où deux mâles chanteurs occupent un territoire (HoIE). Trois mâles chanteurs se font entendre le 07/05 à Ligugé (GilV). La reproduction est prouvée du 26/04 au 28/06 à Ligugé où deux couples nourrissent leurs progénitures au nid (BerJ).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (226-187)

Le premier chanteur est entendu le 27/02 à la réserve Naturelle du Pinail (JomL) et les données sont ensuite régulières, comme 7 chanteurs recensés le 02/05 à Vivonne (JomL) ou 35 le 03/05 à Saix (HoIE). 22 mentions de nicheur certain, parmi lesquelles une construction de nid le 06/04 à Liglet (CouBM), ou encore un nourrissage le 18/05 à Sillars (OuvR) et le 28/06 à Ligugé (BerJ). Des bandes sont visibles en période de migration : 12 ind. le 18/03 à Château-Larcher (JomL), et 60 le 20/09 dans les arbres bordant le plan d'eau de Saint-Cyr (BusR).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M, E (26-18)

L'espèce est présente du 10/03 au 20/09, et les données ne concernent que des mentions de mâles chanteurs : le 29/03 à Pressac (DorM), le 03/05 à Saix (HoIE), ou encore le 29/07 à Poitiers (WiIT). Les plus gros effectifs sont observés lors de l'arrivée printanière avec 10 oiseaux le 10/03 à Rouillé (VasM) et lors du départ automnal avec 11 ind. le 01/09 à Coulombiers (JomL).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (57-37)

L'espèce est présente régulièrement toute l'année, mais seul un transport de nourriture le 28/05 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR) est la preuve d'une nidification certaine. Un accouplement est toutefois observé le 12/05 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). L'oiseau est parfois remarqué en compagnie d'autres Sylviidés : des Pouillots véloces le 03/03 à Poitiers (BerJ) et des Roitelets à triple bandeau le 04/10 à Thuré (LanJ). Les bandes automnales et hivernales comptent parmi

les effectifs les plus importants qui ont été observés : 25 ind. le 22/01 à Ligugé (JomL), 70 le 12/11 à Saulgé (RanN) ou encore 50 le 21/12 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (CouBM). Notons ces 12 ind. en migration le 11/11 à Château-Larcher (JomL).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (75-58)

Il s'observe régulièrement toute l'année. Observé cinq fois nicheur certain, avec notamment des nourrissages mentionnés le 01/06 à Usson-du-Poitou (BusR) et le 14/06 à Vivonne (JomL). 8 oiseaux sont observés en migration le 15/03 à Château-Larcher (JomL), 8 autres le 29/10 et 3 derniers le 11/11. Les bandes automnales et hivernales comptent les plus gros effectifs : 40 ind. le 11/11 à Celle-Lévescault (JomL) et 50 le 27/12 à Naintré (LanJ).

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (55-44)

Première mention le 29/03 à Angles-sur-l'Anglin (HolE), et dernière le 03/10 à Coulombiers (JomL). Nicheur certain sur 6 communes : Ceaux-en-Couhé (CavP), Champagné-Saint-Hilaire (JomL), Coussay-les-Bois, Poitiers (BouR), La Roche-Posay (LanJ) et Saint-Cyr (LanJ).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (35-25)

L'espèce est présente d'avril à octobre. Toutes les observations printanières concernent des migrateurs vus au cours du mois d'avril : 1 mâle le 05/04 à Vouillé (CouBM), 1 couple le 11/04 à Chiré-en-Montreuil (CouBM), 1 mâle le 17/04 à Poitiers (OuvR), 1 mâle le 19/04 à Saulgé (RanN) et 1 mâle le 30/04 à Châtellerault (LanJ). Au passage postnuptial, l'espèce réapparaît dès le 01/08 à Pressac (BusR) mais les observations culminent en septembre. Le dernier contact est celui d'un groupe de 6 oiseaux le 13/10 sur le campus universitaire de Poitiers (BusR).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (78-61)

Nicheur certain dans 27 cas et sur 22 communes. Des transports de matériaux pour la confection du nid sont notés dès le 20/01 à Château-Larcher (JomL). Les nichées observées comportent 4 à 7 juvéniles, maximum noté le 11/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL). Les données relatives à des bandes hivernales concernent entre 11 et 30 individus, le maximum étant noté le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE).

PARIDÉS

Mésange nonnette *Parus palustris* S (34-28)

Nidification prouvée sur 7 communes : Bourg-

Archambault (CavP), Chauvigny / forêt de Mareuil (DubT), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Liglet (CouBM), Liniers / forêt de Moulière (CouBM), Sillars (OuvR) et Vivonne (JomL). L'espèce est probablement sous-détectée par les observateurs et semble globalement plus abondante qu'on le laisse supposer. Maximum de 10 ind. noté lors d'une sortie le 07/11 en forêt de Vouillé-Saint-Hilaire (CouBM).

Mésange huppée *Parus cristatus* S (29-19)

Nidification prouvée sur 4 sites : la forêt domaniale de Mareuil à Chauvigny (DubT), le bois de Veraton à Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ), le bois des Coussières à Vivonne (JomL) et le Pinail à Vouneuil-sur-Vienne (PicY). Maximum de 5 ind. noté lors d'une sortie en forêt de Moulière le 21/12 (CouBM). L'espèce est par ailleurs observée tout au long de l'année dans 15 communes.

Mésange noire *Parus ater* H (50-31)

L'espèce niche pour la première fois dans la Vienne en 2008, en deux localités. Le 24/04 au matin, un couple est découvert dans le bois de la Bougrière à Queaux avec un adulte transportant des insectes et l'autre alarmant. Le nid est situé dans la cavité d'un chêne (VenJ). Le 14/06, un couple alimente ses jeunes dans le bois des Coussières à Vivonne (JomL). En dehors de la période de nidification, l'espèce est observée plus régulièrement que la normale avec des données éparées jusqu'au 08/03 puis plus nombreuses à compter du 05/10. Le 02/11 à Château-Larcher, 78 ind. en migration sont comptabilisés en l'espace de 40 minutes (JomL). Parmi les plus grandes bandes notées, citons 10 ind. le 12/11 dans le bois de l'Hospice à Saulgé (RanN) ou encore 21 ind. le 11/11 à Baptesse à Château-Larcher (JomL).

Mésange bleue *Parus caeruleus* S (153-118)

Nidification prouvée dans 41 cas pour cette espèce largement répandue. Le premier chant est noté le 15/01 à Poitiers (WilT). Un couple transporte des matériaux de construction le 04/04 à Gizay (CouBM), date la plus précoce de confection d'un nid. Une ancienne loge de pic est occupée par un couple le 14/05 à Vaux (JomL). Un seul cas d'occupation de nichoir rapporté avec 4 juv. le 01/06 à Lavoux (ChaM). Migration notée à Château-Larcher avec 48 ind. le 19/10 et 5 ind. le 11/11 (JomL).

Mésange charbonnière *Parus major* S (182-136)

Nidification prouvée dans 40 cas pour cette espèce largement répandue. Le premier chant est noté tardivement le 21/02 à Vouneuil-sous-Biard (WilT). Un nid est observé dans un buis le 03/05 à Ceaux-en-Couhé (JomL). Premiers comportements reproducteurs à Chauvigny avec un couple transportant des matériaux de construction le 14/03 (DubT). Un inventaire par plan quadrillé sur le site des promenades de Blossac

à Lusignan donne 9 couples (CouP et FauG). Migration observée en très petits nombres à Château-Larcher avec moins de 10 ind. lors de chaque session de suivi en février-mars et octobre-novembre (JomL).

SITTIDÉS

Sittelle torcheplot *Sitta europaea* S (54-46)
Notée 13 fois nicheuse certaine avec transport de matériaux (morceaux d'écorce) dès le 13/03 à Quinçay (CouBM) et le 17/03 à Château-Larcher (JomL). Un nourrissage est observé le 14/06 à Vivonne (JomL). La reproduction est également prouvée à Champagné-Saint-Hilaire (JomL), Lathus-Saint-Rémy (CavP), Lusignan (FauG), Mauprévoir, Montamisé (WilT), Montmorillon (CavP), Nouaillé-Maupertuis (CouBM), Poitiers (FauG), Pressac et Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BusR).

TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* H (43-2)

Fin d'hivernage le 31/03 d'une femelle suivie quasi quotidiennement sur la cathédrale Saint-Pierre et sur l'église Sainte-Radegonde à Poitiers (LieB). Sur l'église Sainte-Radegonde, 2 ind. sont observés le 06/03 (JomL) et le 11/03 (LieB). Retour d'un oiseau pour l'hiver le 11/10 sur la cathédrale Saint-Pierre (CouS).

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (90-83)

Espèce observée sur l'ensemble du département. Sur 73 données répertoriées en période de reproduction, seules 7 correspondent à une nidification certaine, notées du 01/05 au 15/07 à Bourg-Archambault (CavP), Châtellerault (LanJ et LioA), Poitiers (JomL et FauG), Vellèches (LanJ) et Verrue (HutD).

ORIOOLIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (114-107)

Le premier chant est entendu le 07/04 à Marçay (PerA), puis il est noté régulièrement jusqu'au 26/08. Une femelle est poursuivie par 3 mâles le 26/04 à Ligugé (BerJ). Un accouplement est observé le 11/05 à Sillars (CavP). 4 preuves de nidification certaine : le 01/05 à Château-Larcher (JomL) avec un transport de matériaux, le 08/06 à Liglet avec la découverte d'un nid à 10 m du sol dans un chêne contenant 2 juvéniles emplumés (CouBM), le 10/06 à Coulombiers où un mâle ravitaille au nid (BusR), et enfin le 27/07 à La Roche-Posay (LanJ). L'effectif le plus important est

de 5 mâles chanteurs le 03/05 à Saix (HolE) et le 19/05 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (82-63)

Les premiers arrivants sont mentionnés au mois de mai avec notamment l'observation d'un mâle le 01/05 à Saulgé (RanN) et d'une femelle le 02/05 à Château-Larcher (JomL). L'arrivée est massive à partir de la deuxième décennie de mai. La reproduction est prouvée sur 16 communes. Un transport de nourriture au nid est noté le 08/06 à Liglet (CouBM). Il faut attendre le 10/06 pour apercevoir un jeune hors du nid, nourri par le couple aux Roches-Prémarie-Andillé (CouBM) alors que le 05/07, un nid garni de 3 œufs est découvert dans un roncier à 1m70 du sol (BusR et GraM). Les dernières observations portent sur des oiseaux "adultes" : une femelle le 10/09 à Saint-Sauvant (CouP) et un mâle le 20/09 à Bellefonds (BusR).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (5-5)

Trois observations réalisées de février à avril : 1 ind. le 23/02 à Mazeuil (BusR et HerT), 1 ind. le 08/03 à Pressac (FleB et LipK) et 1 ind. le 16/04 à la réserve naturelle du Pinail (AlbL). En automne, un individu est contacté le 03/11 à l'étang de Beaufour (RanN) puis une seconde donnée provenant de Moulismes le 06/11 (RanN).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* H (1-1)

Rares sont les données de cette espèce dans le département, la dernière remontant à février 2004. Une seule mention : celle d'un individu observé le 08/03 à Saint-Macoux (BusR et JomL).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (16-13)

Son aire de répartition se concentre exclusivement sur la partie sud/sud-est du département, d'où le peu de données récoltées. La première observation est celle d'un mâle vu le 30/04 à Saulgé (RanN). La reproduction est prouvée sur 3 communes : La Trimouille (CouBM), Lathus-Saint-Rémy (RanN) et Sillars (RanN). Un accouplement est constaté le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Un couple nourrit deux jeunes, hors du nid, le 26/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Une femelle est perchée sur un fil électrique le 07/09 (BusR) et cette donnée constitue la dernière mention de l'espèce.

CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (75-69)

Nidification prouvée dans 11 communes. Un couple construit un nid le 02/05 à Vivonne (JomL), comportement observé aussi souvent que l'alimentation des

jeunes notée par exemple entre le 04/05 à Saint-Rémy-sur-Creuse (LanJ) et le 22/06 à Mauprévoir (BusR). À Haims, 4 juv. à peine volants sont observés le 18/06 en compagnie d'adultes (DecP). A Biard le 04/05, un adulte est observé mangeant une fleur d'*Arum italicum* en bordure de Boivre (WiT). Migration active notée début octobre, notamment le 04/10 avec 78 ind. en plusieurs groupes à Vouzailles, 33 ind. à Massognes ou encore 24 ind. au Rochereau (JomL). A Château-Larcher, 17 ind. volent plein sud le 05/10 (JomL).

Pie bavarde *Pica pica* S (96-63)

La construction et l'aménagement d'un nid sont notés dès le 07/02 à Civray (LasF). Le 24/02 dans le quartier de Bellejouanne à Poitiers, un couple collecte de la boue pour colmater l'intérieur d'un nid (WiT). En dehors de la saison de nidification, un dortoir est suivi de façon hebdomadaire sur le campus de l'université de Poitiers (quartier de Beaulieu) durant l'hiver 2007-2008, atteignant un maximum de 377 ind. le 10/01 (BusR et JomL). En dehors de ce site, un seul dortoir de 50 ind. est signalé le 05/02 au plan d'eau de Saint-Cyr (BouR).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (40-18)

Des cas de nidification certaine sont rapportés dans 12 communes avec par exemple un minimum de 21 couples à Château-Larcher (JomL) ou encore 22 couples au niveau des promenades de Blossac à Lusignan (CouP et FauG). Les données sont très rarement collectées en dehors de la période de nidification. Toutefois, une bande de 650 ind. est observée le 24/12 à Civaux (BaiS).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (43-34)

Une enquête régionale menée dans le cadre de l'atlas des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes a permis de dénombrer 142 colonies pour un total de 4 890 nids dans la Vienne. Le nombre de nids est stable depuis l'année 2000 (précédente enquête) tandis que se dessine une nette tendance à l'éclatement spatial des colonies : celles-ci sont plus nombreuses mais plus petites. Des groupes d'oiseaux déjà importants sont notés en fin d'été : 300 ind. le 25/08 à Saulgé (RanN) ou encore 350 ind. le 28/09 à Vouzailles (BusR). En hiver, des bandes importantes sont notées ça et là avec un maximum de 900 ind. le 08/01 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL) et de 6 500 ind. le 24/12 à Civaux (BaiS).

Corneille noire *Corvus corone* S (170-137)

Des cas de nidification certaine sont rapportés dans 30 communes. Bandes hivernales avec par exemple 90 ind. le 13/01 à Angles-sur-l'Anglin (HolE) ou encore 450 ind. le 07/12 à Pressac (BusR). Un dortoir rassemblant 16 ind. mentionné le 21/10 à Usson-du-Poitou (JomL).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

H, S (165-111)

Des cas de nidification certaine sont rapportés dans 51 communes. L'espèce niche avec succès dans un nichoir type " chevêche " à Lavoux et dans une multitude de supports : vieux châtaigniers à Ceaux-en-Couhé (JomL), tilleul à Quinçay (AlbN), loge de Pic épeiche à Nouaillé-Maupertuis (CouBM), trou de mur d'une grange à Pressac (BusR) ou sous la toiture d'une maison à Archigny (OuvR). Aucune donnée concernant des grandes bandes hivernales n'a été transmise, le maximum enregistré étant de 4 000 ind. le 25/02 à Saint-Benoît (JomL), ce qui ne permet pas d'apporter d'éléments concrets sur la localisation et la taille des grands dortoirs. Un dortoir de 1 300 ind. est noté le 27/06 à l'étang de Combourg dans une roselière (BusR). Migration active notée au printemps et à l'automne avec par exemple 141 ind. le 23/02 à Château-Larcher ou 218 ind. le 29/10 sur cette même commune (JomL). Les oiseaux sont alors souvent mêlés aux Vanneaux huppés et aux Alouettes des champs.

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus*

S (162-93)

Des cas de nidification certaine sont rapportés dans 51 communes sur les 281 que compte le département, ce qui représente peu d'observations compte tenu du statut commun de l'espèce.

Moineau friquet *Passer montanus* S (33-15)

Noté dans 12 communes au fil de l'année et nidification prouvée dans seulement 4 d'entre elles : Les Ormes (LanJ), Mirebeau avec nourrissage noté le 03/05 (GuiP), Poitiers où un couple occupe un nichoir " pour grimpeur " à la Demi-Lune (WiT) et Sammarçolles (BusR et MalC). En dehors de la période de nidification, le plus grand groupe rassemble 42 ind. le 17/01 à Châtellerault (LanJ), mais, à part cela, jamais plus de 7 ind. observés ensemble. Cette espèce demeure très peu notée de manière générale, elle est probablement sous-estimée car souvent assimilée au Moineau domestique en l'absence de recherches particulières.

Moineau soulcie *Petronia petronia* S (3-2)

Le site habituel du golf de Roiffé est encore occupé en 2008 avec construction d'un nid observé le 17/06 et nourrissage des jeunes le 13/07 (GuiP). Le maintien d'un ou deux couples depuis plusieurs années évoque l'existence possible d'autres sites de nidification proches. Une observation de 2 ind. à Maisonneuve le 06/09 (JomL) interroge au sujet de la répartition de l'espèce dans le département et donc sur l'existence potentielle

d'autres populations inconnues à ce jour. Les villages de plaine du Neuvilleois et du Mirebalais sont, à priori, favorables à l'espèce et mériteraient de plus amples prospections.

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (301-230)

De petits groupes sont observés en hiver : 190 ind. le 19/01 à Usson-du-Poitou (JomL), 200 ind. le 02/02 à Rouillé (JomL) et 130 ind. le 27/12 à La Puye (HoE). Différents comptages à Château-Larcher en période de migration ont permis de noter des centaines d'oiseaux avec notamment : 229 ind. le 15/03 (JomL), 407 ind. le 18/03 (JomL) et 1 856 ind. le 29/10 (JomL). 26 cas de reproduction certains répertoriés. Un couple élabore son nid le 06/04 à Liglet (CouBM) mais aussi le 31/05 à Marnay (CouBM). Un nid contenant 3 jeunes est découvert le 28/06 à Saint-Léomer (CavP).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (70-42)

Pendant l'hiver 2007-2008 : noté jusqu'au 03/04 à Lavoux (ChaM) et pour l'hiver 2008-2009 : noté à partir du 18/10 à Montamisé (BusR). 1 à 5 oiseaux fréquentent les mangeoires parmi d'autres fringilles en période hivernale. Les plus grandes bandes observées regroupent 1 500 ind. le 12/01 à Aslonnes (JomL) ou 562 ind. le 09/01 à Rouillé (JomL).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (77-48)

Absence de données pour les mois de novembre et décembre. Un chant se fait entendre le 19/01 à Poitiers (WiT). L'espèce peut convoiter la mangeoire comme le 29/01 à Poitiers (WiT) et à Buxerolles (HoE). Migrateur noté 17 ind. le 29/10 à Château-Larcher (JomL). La reproduction est prouvée dans 9 communes.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (139-87)

En hiver, 5 à 15 individus fréquentent les mangeoires. Les plus grandes bandes observées regroupent 400 individus le 12/01 à Aslonnes (JomL) et 180 ind. le 26/01 à Moulismes (RanN). Migrateur noté à plusieurs reprises à Château-Larcher : 10 ind. le 18/03 (JomL) et 85 ind. le 29/10 (JomL). La reproduction est prouvée dans 15 communes. Un couple élabore son nid, avec apport de plumes, le 15/04 à Poitiers (BusR).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (151-96)

Parmi les plus importantes bandes, un groupe de 260 ind. est observé le 13/01 à Aslonnes (JomL), et un autre de 120 ind. le 12/01 à Vaux (JomL). Nicheur noté avec certitude dans 26 communes. Un couple, transportant des matériaux, est aperçu le 22/04 à Château-Larcher (JomL). Un nid garni de 6 oisillons est découvert le 08/06 à Bourg-Archambault (CavP).

Migrateur noté à Château-Larcher : 70 ind. le 29/10 (JomL). 1 à 10 individus fréquentent les mangeoires pendant l'hiver.

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* H (36-19)

Pendant l'hiver 2007-2008 : noté jusqu'au 19/04 à Saulgé (RanN) et pour l'hiver 2008-2009 : noté à partir du 05/10 à Châtelleraut (LanJ). L'espèce est souvent observée par petites bandes pouvant parfois atteindre et dépasser la centaine d'individus : 100 ind. le 27/01 à Saint-Cyr (JomL) et 130 ind. le 28/01 à Poitiers (JomL). 1 à 5 individus fréquentent les mangeoires pendant l'hiver.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (87-66)

Espèce observée essentiellement en période de reproduction lié à l'activité incessante des adultes en pleine construction de nids, comme le 22/04 à Château-Larcher (JomL), ou encore le 31/05 à Marnay (CouBM). La reproduction est prouvée dans 13 communes. Un nid est découvert le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP) et le dernier transport de nourriture relevé date du 08/06 à Bourg-Archambault (CavP). L'espèce est souvent observée en bandes pouvant dépasser la centaine d'individus : 120 ind. le 19/01 à Usson-du-Poitou (JomL) et 168 ind. le 29/10 à Château-Larcher (JomL).

Sizerin flammé *Carduelis flamma flamma* H (3-3)

Son apparition est rare dans le département. Trois observations sont répertoriées : 1 ind. le 29/10 à Château-Larcher (JomL), 2 ind. le 28/11 à Poitiers (BusR) et 2 ind. le 21/12 à Saulgé (JomL).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (13-7)

Son apparition est très irrégulière d'une année à l'autre mais celle-ci a été particulièrement riche en observations, surtout à partir de la fin octobre. La plupart des données proviennent des massifs forestiers : 2 ind. le 28/10 en forêt de Vouillé Saint-Hilaire (CouBM), 1 à 13 ind. en forêt de Moulière du 22/10 au 08/11 (CouBM) et 4 à 20 individus dans le Bois de l'Hospice à Saulgé du 13 au 19/11 (RanN). Un individu est observé à deux reprises sur le campus universitaire les 13 et 20/11 (CouS). En période estivale, un groupe de 4 oiseaux s'alimentent dans les épicéas le 13/06 à Savigny-Levescault (KihF) et 4 oiseaux passent en vol, en direction du sud-ouest le 10/07 à Bonneuil-Matours (WiT).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (14-11)

Aucune preuve certaine de nidification répertoriée. Seuls des mâles chanteurs et des couples cantonnés sont notés sur les communes suivantes : Brux (JomL), La Chapelle-Montreuil (WiT), La Chapelle-Moulière (WiT), Montamisé (WiT), Montreuil-Bonnin (VanB) et

Saint-Sauvant (RenG). En automne, l'espèce est observée le 12/10 aux Roches-Prémarie-Andillé (RoyD).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (69-47)

Observé tout au long de l'année. Les données printanières représentent 45 % des données recueillies. Noté nicheur avec certitude dans 4 communes : Brux (JomL), Chauvigny (FauG), Liglet (CouBM) et Vivonne (JomL). Migrateur noté à plusieurs reprises au printemps et en automne à Château-Larcher : 4 ind. le 15/03 (JomL) et 8 ind. le 11/11 (JomL). 1 à 7 individus sont observés sur les mangeoires pendant l'hiver. Un groupe de 11 oiseaux est aperçu le 11/11 à Poitiers (CouS).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (72-63)

Sa présence est notée régulièrement du 02/01 au 23/11 et le premier chanteur est entendu le 21/02 à Usson-du-Poitou (JomL). Il est mentionné nicheur certain 14 fois, avec un transport de matériaux le 12/05 à Usson-du-Poitou (BusR), un transport de nourriture le 17/05 à Loudun (BusR) et la découverte de 4 jeunes au nid le 01/06 à Lathus-Saint-Rémy (CavP). Des petites bandes sont observées l'hiver : 7 ind. le 13/01 à Aslonnes (JomL), et 15 autres le 13/02 à Craon (MalC).

Bruant zizi *Emberiza cirius* S (109-98)

L'espèce se rencontre tout le long de l'année du 13/01 au 29/10. La première donnée de chanteur est entendue le 12/02 à Poitiers (WIT). Noté 10 fois nicheur certain. La première mention signale un transport de matériaux le 22/04 à Château-Larcher (JomL). Une femelle nourrit ses jeunes hors du nid le 28/05 au plan d'eau de Saint-Cyr (BusR), et 4 juvéniles sont nourris par les parents le 06/07 à Poitiers (BerJ). Des

bandes hivernales comptent 60 ind. en janvier et 46 ind. le 02/02 à Château-Larcher (JomL).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (19-15)

Deux mâles sont observés le 06/05 à Charrais (ComF). Aucune mention de nicheur certain pour cette espèce dont les contacts sont généralement ceux de mâles chanteurs : 2 ind. sur des fils téléphoniques le 13/05 à Frozes (WIT), et 2 autres le 21/05 à Mirebeau (Solo). Un effectif de 5 mâles chanteurs est noté le 07/05 à Amberre (Solo).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* S, H (39-26)

L'espèce est visible toute l'année, excepté durant la période estivale où on ne note aucune mention. 3 oiseaux perchés sur une haie le 24/02 à Usson-du-Poitou (BusR), un mâle chanteur le 18/03 à Champagné-Saint-Hilaire (JomL), ou bien encore un dortoir de 50 ind. le 28/10 à Mignaloux-Beauvoir (CouBM). Une seule preuve de nidification certaine le 29/05 à Saulgé avec l'observation d'un adulte accompagné d'un juvénile (RanN). Des groupes automnaux et hivernaux importants sont notés à plusieurs reprises : 48 ind. le 02/01 à Aslonnes (JomL), 40 ind. le 13/01 à Château-Larcher (GilV), et 31 le 29/10 à Saulgé (JomL). Des oiseaux sont également observés en migration active comme ces 16 ind. le 11/11 à Château-Larcher (JomL).

Bruant proyer *Emberiza calandra* S (99-77)

Présent tout au long de l'année. Noté 14 fois nicheur certain : aménagement d'un nid le 18/05 à La Roche-Rigault (BusR), transport de nourriture le 24/05 à Migné-Auxances (ProD) et le 23/07 à Ceaux-en-Couhé (LioA). Ce sont les bandes automnales et hivernales qui comptent les plus gros effectifs, avec 25 ind. parmi des ovins le 02/03 à Craon (BusR) et 48 ind. le 02/09 à Saint-Sauvant (JomL). Ajoutons à cela 171 ind. en migration le 14/03 à Usson-du-Poitou (JomL).

