


Synthèse des données ornithologiques du 15 août 2013 au 14 août 2014

Coordinateur : Régis Ouvrard
LPO Vienne
398 avenue de Nantes
86000 POITIERS



La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Thierry BERGÈS : ANATIDÉS, PODICIPÉDIDÉS, ARDÉIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, APODIDÉS, ALCÉDINIDÉS, PICIDÉS et CINCLIDÉS

Jack BERTEAU : CICONIIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS, SYLVIIDÉS, MUSCICAPIDÉS et EMBÉRIZIDÉS

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

Louis DUPAS : COLUMBIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS, RÉMIZIDÉS, LANIIDÉS et CORVIDÉS

Régis OUVRARD : PHASIANIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, RALLIDÉS, GRUIDÉS, ALAUDIDÉS, HIRUNDINIDÉS, MOTACILLIDÉS, ORIOLIDÉS, STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS et FRINGILLIDÉS

Cyrille POIREL : OTIDIDÉS et BURHINIDÉS

Julien VENTROUX : RÉCURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, SCOLOPACIDÉS, STERCORARIIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, PSITTACIDÉS et CUCULIDÉS

Les extractions de la base de données VisioNature ont été réalisées par :

Bernard COUTURAUD et Cyrille POIREL

Liste des observateurs :

AIRAULT Vivien (AirV), ALBIZIA Gérard (AlbG), ALBERT Léo (AlbL), ALBERT Nathalie (AlbN), ALEXANDRE Jean-François (AleJ), ALEXANDRE Nathalie & Jean-François (AleNJ), ALEXIS Rodolphe (AleR), ALLARD Michel (AllM), ALLAIN Marie-Claude (AllMC), ANTOINE Anthony (AntA), ARCHAMBEAULT Ludovic (ArcL), ARMOUET Alain (ArMa), AUCHER Jean-Paul (AucJ), AUGRY Éric Valérie (AugÉV), AUSANNEAU Mathieu (AusM), BABLON Anne (BabA), BAILLARGEAT Sébastien (BaiS), BATY Florent (BatF), BAXTER Alan, (BaxA), BECHAUD Christine (BecC), BÉCUE Pascale

(BécP), BELLION Marc (BelM), BERTEAU Jack (BerJ), BERTON Louise (BerL), BERTHAULT Sandrine (BerS), BERGÈS Thierry (BerT), BESSAT Frédéric (BesF), BEZARD Évelyne (BezÉ), BIHAN Aude (BihA), BILLAUD Jean-François (BilJ), BOIREAU Alain (BoiA), BOILEAU Patrice (BoiP), BONNIN Alain (BonA), BONNIER Bernard (BonB), BONNIN Christian (BonC), BONIFAIT Justin (BonJ), BONNET Romain (BonR), BOULLAH Colette et Alain (BouAC), BOULLÉ Dominique (BouD), BOUSSQUAULT Élodie (BouÉ), BOURDIN Laurent (BouL), BOUT Nicolas (BouN), BOUTIFARD Vincent (BouV), BOYARD Denis (BoyD), BRAUD Clément (BraC), BRANCFORTI Julian (Braj), BRAMARD Michel (BraM), BRIAND Agathe (BriA), BROUCKE Bernard (BroB), BROUCKE Hélène (BroH), BROQUEREAU Kévin (BroK), BUCK Graham & Jemma (BucGJ), BUORD Jenny (BuoJ), BURBAN Gwenael (BurG), BUSSIÈRE Raphaël (BusR), CARRE Thierry (CarT), CARASCO Yann (CarY), CAUPENNE Michel (CauM), CAVALLIN Pascal (CavP), CHAIGNE Adrien (ChaA), CHAMBOLLE Christophe (ChaC), CHAUVEAU Joseph (Chaj), CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaM), CHABEAUTI Pierre-Yves (ChaP), CHANTEMARGUE Romain (ChaR), CHÉRIOT Thierry (Chét), CHIRON Damien (ChiD), CHIL Jean-Luc (Chij), CLAVERY Frantz (ClaF), CODET Gilles (CodG), CODARINI Sylvain (CodS), COLAISSEAU Félix (ColF), CORMENIER Phoebé (CorP), COUTURAUD Marie-Noëlle & Bernard (CouBM), COUPEAU Didier (CouD), COUSIN Pierre (CouP), CROZIER Dominique (CroD), DAUBERT Daniel (DauD), DAVID Sylvie (DavS), DEBENEST Étienne (DebÉ), DELHOUME Annie (DelA), DELLIAUX Christine (DelC), DELHOUME Luc (DelL), DENIS Axelle (DenA), DEPLAINE Lucas (DepL), DESCHAMPS Chantal et Jean-Pierre (DesC), DESCOMBES Jean-Claude (DesJ), DESCOMBELS Nathalie (DesN), DESGRANGES Sylvie (DesS), DESHAYES Eric (DesE), DEVOUCOUX Pierrick (DevP), DORFIAC Matthieu (DorM), DRIEUX Emily (DriE), DUBOIS Adélie (DubAd), DUBOIS Angélique (DubAn), DUBREUIL Didier (DubD), DUBOIS Thierry (DubT), DUCLOUX Alain (DucA), DUCEPT Samuel (DucS), DUFFEZ Grégoire (DufG), DUPUY Jean-Raymond (DupJ), DUPAS Louis (DupL), DUPAS Reine (DupR), DURIVAUULT Charline (DurC), DURAND Florian (DurF), DURAND Marie-Jo (DurM), ESNAULT Sarah (EsnS), FAIVRE Cédric (FaiC), FERREIRA Leandro (FerL), FERRON Maïlys (FerM), FICHET Xavier (FicX), FILLON Bruno (FilB), FILLAUD Éric (FilÉ), FLEURANT Bruno (FleB), FLEUREAU Julien (FleJ), FLORIMOND Jean (FloJ), FOILLERET Gaël (FoiG),

FORDHAM Peter (ForP), FOURRÉ Edwige (FouE), FRAPPE Bertrand (FraB), FRADIN Jeanine (FraJ), FRADET Solange (FraS), FRECHARD Alain (FreA), GABORIT Georges (GabG), GAILLEDROT Miguel (GaiM), GARGOT René (GarR), GATINEAU Cindy (GatC), GAUTHIER Sophie (GauS), GIACOMO Clément (GiaC), GILARDOT Daniel (GilD), GILET Vincent (GilV), GIORDANO Charlotte (GioC), GODIN Gabriel (GodG), GOMAS Kévin (GomK), GOUËLLO Thomas (GouT), GRACIEUX Céline (GraCé), GRASSIN Christian (GraCh), GRANGER Michel (GraM), GRELLIER Freddy (GreF), GREYO Géraldine (GreG), GRIARD Benjamin (GriB), GRISVARD Pierre (GriP), GUÉRIN Thierry (GuéT), GUENESCHEAU Yvon (GueY), GUILLAUME Patricia (GuiP), HAINAUT Michel (HaiM), HAMDAOUI Lotfi (HamL), HENRY François (HenF), HENRY Pascale (HenP), IRANI Alice (IraA), JAHAN Maxime (JahM), JALICON Pierre-Yves (JalP), JEAMET Éric (JeaÉ), JOMAT Émilien (JomÉ), JOMAT Loïc (JomL), JOMAT Patrick et Sylvie (JomPS), KAESTNER Martine (KaeM), KANDEL Olivier (KanO), LAHOREAU Joëlle (LahJ), LANGOUMOIS Jean (LanJ), LASSALLE Frédéric (LasF), LATRACH Aurélie (LatA), LAURENT Guy (LauG), LECOMTE François (LecF), LE GUEN Eddy (LegE), LE GALLIC Françoise (LegF), LEJEUNE Annie (LejA), LEMARCHAND François (LemF), LEROUX Alain (LerA), LIÉGEAIS Bernard (LiéB), LIPOVOÏ Dounia (LipD), LONG Benjamin (LonB), LUCK Chris (LucC), LUCAS François (LucF), LYONNET Thibault (LyoTh), LYON Typhaine (LyoTy), MALTESE-CROTTIER Kevin (MalK), MALÉCOT Maxime (MalM), MANTECON Gérard (ManG), MAOUT Jacques (MaoJ), MARSAULT Camille (MarC), MARTHON Pierre (MarP), MARTINAUD Rémi (MarR), MASSÉ Claude (MasC), MASSE Ghislaine (MasG), MASSON Michel (MasM), MASSON Samuel (MasS), MAURIN Audrey (MauA), MEIGNANT Cyrille (MeiC), MÉNARD Catherine (MénC), MERCERON Bruno (MerB), MERIGEAULT Évelyne (MerÉ), MÉTAIS Alain (Méta), MÉTAIS Catherine (MétC), MIGAUD Pierre (MigP), MILARET Vincent (MilV), MINET Nicolas (MinN), MOREAU Christian (MorC), MORTREUIL Françoise (MorF), MORTIER Patrick (MorP), MOUSSET Marie (MouM), NADAL Yann (NadY), NIORTHE Dominique (NioD), NOEL Gérard (NoeG), OUBRIER Hervé (OubH), OUVRARD Patrice (OuvP), OUVRARD Régis (OuvR), PASSERAULT Jean-Michel (PasJ), PASSANI Véronique (PasV), PEIGNAULT Alain (PeiA), PELLERIN Jacques (PelJ), PENNETIER Yvon (PenY), PERSUY Alain (PerA), PEZE Jean-François (PezJ), PICHARD Adeline (PicA), PICHON Claudie (PicC), PICHON Yann (PicY), PINEAU Élodie (PinÉ), PINÇON Philippe (PinP), PLAT Pierre (PlaP), PLUCHON Nicolas (PluN), POIS Bernadette (PoiB), POITEVIN Caroline (PoiCa), POIREL Cyrille (PoiCy), POISSON Kévin (PoiK), POISSON Olivier (PoiO), POUVREAU Olivier (PouO), PRATT Alban (PraA), PRÉCIGOUT

Laurent (PréL), PRÉVOST Olivier (PréO), PUAUD Barbara (PuaB), PUISSESEAU Jean-Michel (PuiJ), QUERCY Philippe (QueP), RAIMOND Roland (RaiR), RANSDALE Nick (RanN), RENAUD Guy (RenG), RENAUDET Ludovic (RenL), RIBARDIÈRE Annie (RibA), RICHARD Emmanuel (RicE), RICHET Jean-Michel (RicJ), ROHÉ Stéphane (RohS), ROLLAND Yann (RoIY), RONDEAU Jean-Louis (RonJ), ROSE François (RosF), ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP), ROYER Denis (RoyD), RUET Pascale (RueP), SABOURIN Laurent (SabL), SAVIN François (SavF), SÉNÉCHAL Cyril (SénC), SLÉZAK Josée (SléJ), SMITH Mike (SmiM), SUREAU Quentin (SurQ), TAQUET Ewan (TaqE), THÉRY Paul-Mickaël (ThéP), THIAUDIÈRE Anne (ThiA), THIAUDIÈRE Jean-Claude (Thij), TILLET Johan (TilJ), TILLET Solenne (TilSo), TILLET Serge (TilSe), TIPHANEAU Marion (TipM), TOUVENET Sylvain (TouS), TRANCHANT Nicolas (TraN), TROTTEREAU Michel (TroM), TROUBAT Stéphane (TroS), TURPAULT Alexis (TurA), TURPAUD-FIZZALA Victor (TurV), VAN DER YEUGHT Alexandre (VanA), VAN HECKE Benoît (VanB), VASSEUR Marie-Blanche (VasM), VAUCELLE Maxime (VauM), VENTROUX Julien (VenJ), VERDON Annette (VerA), VERNA Jérémy (VerJ), VINET Pierre (VinP), VRIGNAULT Jean-Do (Vrij), VRIGNAUD Nicolas (VriN), WEIDMANN Jean-Christophe (Weij), WELLS Barry (WelB), WILLIAMSON Thomas (Wilt).


Remerciements

Remercions sincèrement les contributeurs à la base de données VisioNature sur la période considérée. Un total de plus de 53 000 observations a permis la rédaction de cette synthèse, représentant 52 familles et 220 espèces.

Faits remarquables

Notons trois nouvelles espèces pour la Vienne : le Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*, même si cette donnée issue d'un suivi par satellite n'est pas un véritable contact, le Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* et la Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*. Exceptionnelles les trois observations de Barge rousse *Limosa lapponica*, alors qu'à ce jour, dans les données récentes, l'espèce avait été contactée une seule fois à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 2 ind. en avril 1992. Une mention figure également au Catalogue Général du musée d'Histoire Naturelle de Poitiers de 1846 avec 1 ind. mâle acquis entre 1840 et 1846 dans la collection. Pour le Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*, la Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* et le Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, il s'agit de la troisième mention départementale. Le Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*, qui

Légende :



(*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

fait le bonheur des photographes depuis six ans lors de ses apparitions hivernales (hormis l'hiver 2009-2010), n'a pas été contacté sur la période considérée. Enfin, retenons cette probable hybridation entre Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* et Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* qui doit nous inciter à toujours bien observer les espèces les plus communes.

ANATIDÉS

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (239-43-87)

Oie cendrée *Anser anser* M, H (22-18-21)

Le premier vol migratoire comptant 12 oiseaux est signalé dès le 25/09/13 au-dessus de Blanzay (LucC), suivi de nombreux autres signalements de vols de taille moyenne (maximum de 57 ind. mais plus généralement entre 20 et 30). Les premiers vols vers le nord (regroupant en moyenne davantage d'oiseaux qu'à l'aller) sont observés vers la fin janvier/début février avec notamment 200 ind. observés le 30/01/14 à Vivonne (PicA). Le maximum du flux migratoire de retour est observé le 23/02/14 à Lavoux (BroH) avec 600 ind. répartis en 3 vols de 200. Pas d'oiseau signalé en hivernage dans le département, mais 1 ind. posé est observé le 9/04/14 dans la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Un vol migratoire regroupant 10 ind. est observé le 20/07/14 à Château-Larcher (JomPS).

Oie à tête barrée *Anser indicus* ? (1-1-1)

1 ind. observé en compagnie de Cygnes tuberculés le 16/03/14 à Pressac (SavF).

Oie cygnoïde *Anser cygnoides* ? (1-1-1)

2 ind. observés le 18/01/14 à Bourg-Archambault (GilD, VenJ).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* ? (3-2-2)

Un premier oiseau, visiblement blessé, a été observé le 25/11/13 à Lusignan (PréO), puis deux autres observations sont mentionnées à Lathus-Saint-Rémy, le 21/03/14 et le 6/05/14 (VenJ).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (42-11-15)

Des individus isolés ou en petit nombre, avec un maximum de 7 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr le 21/04/14 (AusM), sont signalés à partir de la fin octobre jusqu'à fin mai. La première mention rapporte la présence d'une femelle, observée à Neuville-de-Poitou le 26/10/13 (FaiC), puis la dernière observation est faite le 22/06/14 à Champigny-le-Sec (PoiCy). Malgré la présence de couples pendant la période de reproduction, aucun indice de nidification certaine n'a été rapporté pour cette espèce.

Canard carolin *Aix sponsa* ? (2-1-2)

1 ind. observé le 15/11/13 (DubT) et le 16/11/13 (ChaA) sur la commune de Valdivienne.

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (7-4-5)

1 à 3 ind. (mâles et femelles) observés sur plusieurs plans d'eau, à Dangé-Saint-Romain (BoiA), Vouillé (VenJ), Saulgé (GilD, VenJ) et Nieuil-l'Espoir (FaiC) entre le 18/01/14 et le 22/04/14, dont un mâle qui stationne au moins 7 jours à proximité de la Maison Forestière de Varailles, Vouillé (VenJ).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (29-9-16)

Un premier ind. femelle est observé le 1/11/13 à Saulgé (PoiCy), puis des ind. plutôt isolés ou par petits groupes, avec un max. de 8 femelles sur l'Étang du Plantis à Journet, le 8/03/14 (LiéB), sont mentionnés régulièrement jusqu'au 15/03/14, à Iteuil (BusR).

Canard chipecu *Anas strepera* H, S (98-16-23)

En 2013, première mention le 29/10 sur l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN) ; en 2014, dernière observation le 4/08 sur le même lieu (RanN). Espèce mentionnée tous les mois dans cet intervalle, sur de nombreux plans d'eau du département. Généralement un à quelques ind. mâles et femelles, avec un maximum de 10 ind. observés ensemble le 9/03/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (MétA). Quelques couples observés pendant la période de reproduction, mais une seule nidification certaine mentionnée à l'Étang du Léché à Saulgé, avec 1 femelle et 4 poussins le 8/06/14 (OuvR).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (142-22-31)

Espèce très présente dans notre département tout au long de l'année. Des ind. assez isolés (4 maximum le 14/08/14 au Grand Étang à La Puye (DesE)) sont signalés en période nuptiale et postnuptiale (d'avril à août), toutefois aucun indice de nidification n'est mentionné par les observateurs. Il faut attendre la fin août pour voir les effectifs grossir avec un maximum de 85 unités comptées sur l'Étang de Beaufour à Saulgé le 24/11/13 (FaiC, PoiCy).

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (837-141-346)

Canard pilet *Anas acuta* M (17-10-12)

L'espèce est peu contactée en hiver et la majorité des observations provient de la remontée au printemps. Première mention d'un groupe de 30 ind. en vol le 19/09/13 à Pressac (SmiM), puis toujours de 30 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé le 11/11/13 (CroD). La dernière observation est signalée le 6/04/14 à Craon (FaiC). Rarement plus de quelques unités ensemble.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (10-5-5)

Quelques rares observations d'un à 2 ind. maximum. En 2013, dernière observation le 27/09 avec 1 ind. sur l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR). Première mention 2014 le 9/03 toujours avec 1 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GarR). La dernière mention de la période concerne un mâle et une femelle le 11/04/14 sur l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (FaiC).

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (90-16-20)

Présent toute l'année, le plus gros rassemblement a été observé sur le Plan d'eau de Saint-Cyr le 12/09/13 (TilJ) avec 95 ind. Malgré des observations couvrant la période de reproduction, aucun indice de nidification n'a été rapporté.

Nette rousse *Netta rufina* H, E (4-2-2)

Quelques ind. (jusqu'à 8) observés à plusieurs reprises sur l'Étang de Beaufour à Saulgé du 4/02/14 au 23/02/14 (GuéT *et al.*) et 3 ind. sur le Plan d'eau de Saint-Cyr le 7/03/14 (TilJ).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (132-23-36)

Espèce observée toute l'année avec des reproductions attestées par la présence de poussins sur l'Étang de Lambertière à Mauprévoir, le 30/05/14 (BouAC), sur l'Étang de Beaufour à Saulgé et sur l'Étang de Chez Vincent à Pressac, le 8/06/14 (OuvR), sur l'Étang de Chez Séguier à Pressac, le 29/07/14 (DorM). En période hivernale, le plus gros attroupement a rassemblé jusqu'à 114 ind. sur l'Étang de Beaufour à Saulgé le 18/01/14 (WilT, DubT, PoiCa).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (110-11-19)

L'espèce est présente sur de nombreux plans d'eau et observée tout le long de l'année. Le plus gros effectif, de 18 ind., est noté à deux reprises à Liglet le 19/01/14 (CouBM) et le 8/03/14 (LiéB).

mais 4 sites (Étang de Beaufour et la Sablière à Saulgé, Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy, Liglet) ont accueilli des groupes de 10 ind. et plus. Il est noté nicheur certain à l'Étang de Beaufour à Saulgé, où 9 poussins appartenant à 2 ou 3 familles ont été observés le 8/06/14 (OuvR).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (126-59-111)

Perdrix grise *Perdix perdix* S (164-56-144)

Caille des blés *Coturnix coturnix* E (344-70-276)

Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii* ? (2-2-2)
Deux observations : 2 ind. le 17/12/13 à Coussay-les-Bois (TaqE) et 1 mâle le 3/06/14 à Dangé-Saint-Romain (MeiC).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (217-85-169)
À noter un groupe d'au moins 12 ind. mélaniques le 6/09/13 à Quinçay (VenJ).

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (203-37-60)

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (336-41-79)

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (10-6-7)

Un ind. est observé en période postnuptiale à l'Étang du Léché à Saulgé le 26/09/13 (VenJ). En 2014, la première observation de 2 ind. en plumage d'été est notée le 21/02 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN). Les observations font mention de 1 à 2 ind. sauf le 1/03/14, encore à l'Étang de Beaufour, où 4 oiseaux dont 3 en plumage nuptial, sont observés (PoiCy). Outre ces deux sites, l'oiseau est noté également le 25/02/14 à Arçay (ArMA), sur l'Étang Gardéché à Journet le 10/03/14 (VenJ), le 16/03/14 à Liglet (CouBM), sur l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy le 26/03/14 (RanN), et enfin la dernière observation est réalisée à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 8/05/14 (FaiC).

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (402-79-158)

ARDÉIDÉS

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (14-6-8)

La dernière observation d'un ind. en période postnuptiale de 2013 correspond à un immature posé sur le site du Golf du Haut-Poitou à Saint-Cyr le 5/10 (RaiR). La première observation de l'année 2014 est faite le 14/06 sur le Grand Étang à La Puye, un immature en plumage de deuxième année (OuvR). À part une mention de 2 ind. observés simultanément le 26/09/13 au-dessus du bourg de La Puye (AirV, GauS), toutes les autres observations signalent la présence d'un seul oiseau. Malgré plusieurs observations de jeunes erratiques de première année sur les sites de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr à 3 reprises en juillet 2014 (TilJ), de l'Étang de L'Écotière à Bellefonds le 26/07/14 (TilJ), de l'Étang Neuf à Saulgé le 28/07/14 et à Dissay le 9/08/14 (TilJ), aucun indice de nidification n'a été rapporté.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* M (2-2-2)

Un ind. est vu le 15/09/13 à Bonnes (OuvR), puis une seconde

observation est signalée le 8/06/14 au niveau de la queue du Grand Étang à La Puye, d'un ind. en train de se nourrir (DubT).

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* S (44-16-23)

Des observations d'individus isolés ou de petits groupes (jusqu'à 7) sont faites pendant toute la période hivernale. Un rassemblement plus conséquent (20 ind.) est noté le 14/06/14 en vol au-dessus du Grand Étang à La Puye (OuvR), ainsi que les 14/07/14 et 15/07/14 à Vicq-sur-Gartempe de 20 et 15 ind., respectivement (MeiC, DesJ). Malgré des observations régulières pendant la période de reproduction, aucune preuve de nidification n'est rapportée pour cette espèce.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (134-35-60)

L'espèce est présente toute l'année sur ou à proximité de nombreux plans d'eau du département, avec un maximum de 11 ind. signalés à Dangé-Saint-Romain le 4/12/13 (MeiC) et un autre groupe de 11 ind. également à Antran le 7/02/14 (MeiC). Cependant, la grande majorité des observations font état de 1 à 4 ind. seulement. En ce qui concerne la nidification de cette espèce, notons la présence répétée d'ind. (maximum 6) sur l'Étang de Lambertière à Mauprévoir, le 8/06/14 (BouAC) et le 29/06/14 (OuvR), et un adulte en train de couvrir le 29/06/14 sur le site de l'Étang de Chez Séguier à Pressac (OuvR).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (433-70-173)

Présente toute l'année, cette espèce fréquente régulièrement de nombreux plans d'eau du département. Jusqu'à 27 ind. sont vus ensemble le 1/11/13 sur l'Étang de Beaufour à Saulgé (PoiCy) où des groupes importants sont mentionnés régulièrement. Aucune preuve de nidification de l'espèce dans notre département n'est rapportée.

Héron cendré *Ardea cinerea* S (950-171-515)

Des héronnières occupées sont recensées sur 12 sites totalisant entre 240 à 264 couples nicheurs.

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (62-21-35)

La dernière observation pour la période postnuptiale de 2013 (1 jeune de première année) est notée le 29/10 à Rouillé (CouP). Les 2 premiers oiseaux de retour d'hivernage sont mentionnés le 29/03/14 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). La reproduction est attestée sur le site de l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec notamment 4 jeunes observés le 29/06/14 en présence de 4 adultes (OuvR). Le site de l'Étang Pétaveau à Journet, avec un minimum de 26 nids occupés, constitue encore le principal site de nidification recensé (VenJ). L'Étang Baro à Mauprévoir pourrait aussi avoir hébergé un nid puisqu'un nourrissage y a été observé le 29/06/14 (OuvR).

CICONIIDÉS

Cigogne noire *Ciconia nigra* M (24-20-22)

Entre le 16/08 et le 24/09/13, ce sont 14 ind. qui ont été notés, les deux dernières cigognes traversant le ciel de Naintré (DavS). Le passage prénuptial débute avec 1 ind. le 9/03/14 à Poitiers (Gild). Par la suite, des oiseaux sont notés chaque mois et notamment en mai et juin (période de nidification) à Bourg-Archambault (LyoTh), Montreuil-Bonnin (BraM) et Chouppes (BouAC). On retiendra également ces 4 ind. volant avec 14 Cigognes blanches à Pressac le 19/09/13 (SmiM).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (52-40-51)

Observée durant toute la période sauf en novembre. À noter les 100 ind. posés dans un champ le 4/09/13 à Pouillé (VenJ).

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche *Platalea leucorodia* A (5-3-3)

Cinq données sur la période : à Saint-Cyr, 2 ind. le 24/09/13 (Tilj), 2 ind. le 18/10/13 (ChaiA) et 1 ind. le 24/11/13 (BouAC, PoiCa), à La Puye 1 ind. le 7/12/13 (DubT) et à Arçay 1 ind. le 27/05/14 (DebÉ).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (60-32-53)

La dernière observation concernant la migration postnuptiale a été faite le 10/09/13 à Valdivienne (BoiP). Le retour d'Afrique est noté le 23/04/14 à Craon (FaiC, PoiCa). Aucun cas de nidification certaine n'est signalé.

Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M (2-2-2)

Seulement 2 observations : l'une le 1/03/14 à Millac (FaiC), l'autre le 28/04/14 à Saint-Pierre d'Exideuil (BouN).

Milan noir *Milvus migrans* E (208-77-152)

Un migrateur très tardif est noté à Château-Larcher le 3/10/13 (JomL). On assiste au retour de l'espèce le 8/03/14 au Vigeant (BusR). Une seule nidification certaine à l'Étang de Combourg à Pressac (OuvR), mais elle est probable dans dix autres communes, souvent à proximité d'étangs.

Milan royal *Milvus milvus* M (26-18-25)

Noté tous les mois de la période sauf en septembre et en janvier, la grande majorité des observations étant faites entre octobre et décembre.

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* A (3-2-3)

Un jeune gypaète mâle de deuxième année, nommé Layrou, a survolé le département à deux reprises - à l'aller (26 et 27/05/14) et au retour (5/06/14) - lors d'une escapade qui l'a mené des Causses aveyronnais jusqu'en Normandie, puis en Bretagne. Informations fournies par la balise Argos dont l'oiseau était équipé (pour plus de détails, voir l'article dans L'Outarde n° 51, pp. 21-25).

Vautour fauve *Gyps fulvus* A (1-1-1)

Cinq Vautours fauves sont passés au-dessus de la commune de Cherves le 22/05/14 (DeIC), se dirigeant vers le sud-est.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (74-35-57)

La dernière observation date du 29/09/13 à Saulgé (PoiCa *et al.*) et le retour est noté le 7/03/14 à Château-Larcher (JomL). On observe un transport de branchettes le 15/03/14 à Iteuil (BusR), puis 2 ind. en parade le 17/04/14 à Montmorillon (Venj) et des indices laissent également supposer la nidification à Lussac-les-Châteaux (GraCé), Savigny-Lévescault (CouBM) et Senillé (OuvR). La reproduction est avérée à Quinçay (VanB, Venj) et Chauvigny (DubT). Dans les deux cas, le jeune a pu être observé.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (91-38-69)

Observations de fin d'été assez nombreuses concernant des oiseaux adultes ou immatures. Ils se joignent régulièrement aux autres busards dans les dortoirs. Le 15/09/13, on note à Massognes un mâle de deuxième année bagué au nid aux Pays-Bas (PoiCy). Peu d'observations hivernales mais celles-ci deviennent nombreuses à partir de mars avec le passage des migrateurs. Il est nicheur probable tantôt en secteur céréalier, par exemple à Moncontour (ArmA) et Champigny-le-Sec (PoiCy), tantôt en milieu humide comme à Journet (Venj).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (764-132-494)

C'est le rapace le plus répandu dans le département après la Buse variable et le Faucon crécerelle. Il est observé dans les dortoirs en fin d'été mais très souvent on le remarque lors de ses chasses. La première parade est notée le 1/04/14 à La Grimaudière (PoiCy). Il est nicheur certain dans 9 communes : Charrais (BonJ), Craon (FaiV, PoiCy), Migné-Auxances (LerA), Moncontour (DebÉ), Pouant (GriB), Saint-Gaudent (Venj), Senillé (OuvR), Villiers (FaiC) et Vouillé (Venj).

Busard pâle *Circus macrourus* M (1-1-1)

Un mâle adulte en migration pré-nuptiale à Poitiers le 10/04/14 (PoiCa).

Busard cendré *Circus pygargus* M, E (439-91-307)

En 2013, le dernier suivi de dortoir a permis de compter 15 Busards cendrés dont 6 jeunes le 26/08 à Champigny-le-Sec (PoiCy), le dernier oiseau a été vu le 8/09 à Charrais (PoiCa). Retour de l'espèce le 7/04/14 à Vouillé (LerA), puis le 11/04/14 à Cissé (Venj). Les observations deviennent quotidiennes à partir du 13 avril. Le 19/04/14, 2 couples paraded à Saint-Cyr (PoiCy), tout comme le 20/04/14 à Doussay (PoiCy). Un premier transport de proie est observé le 5/05/14 à Vouneuil-sur-Vienne (DupL), et ils deviennent réguliers à partir de la troisième décennie de mai. Un nid avec 2 poussins juste nés est découvert dans un blé le 16/06/14 à Pouant (GriB). Il est nicheur certain dans 12 communes et la reproduction est avérée dans la plupart des cas. En 2014, le suivi estival des dortoirs de busards mentionne le Busard cendré presque toujours majoritaire. Un rassemblement d'environ 85 busards toutes espèces confondues est observé le 13/08/14 à Craon (BouAC, LerA).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (22-20-22)

La reproduction est avérée à Quinçay et à Vouillé (BerJ). Dans les deux cas, 2 jeunes à l'envol. La nidification est probable à Saulgé avec un mâle en parade le 7/06/14 (Venj, PouO).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (226-86-169)

Buse variable *Buteo buteo* S (1018-201-743)

Aigle botté *Aquila pennata* M, E (2-2-2)

Deux observations avec un premier ind. de forme sombre le 23/04/14 à Valdivienne (Venj) et un second de forme claire le 29/06/14 à Château-Larcher (JomL).

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* M (25-13-16)

En migration postnuptiale, il est noté du 21/09/13 à Pressac (SmiM) au 9/11/13 à Saint-Cyr (Tilj). La migration pré-nuptiale court du 8/03/14 à L'Isle-Jourdain (BusR) au 19/04/14 à La Chapelle-Moulière (PouO). Un individu, sans doute erratique, est observé le 18/05/14 à Bonnes (DubD).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (837-182-611)

Faucon kobez *Falco vespertinus* A (2-1-2)

Deux notes pour un seul oiseau de première année le 31/08/13 à Craon (FaiC, Tilj, BusR). La date est d'importance car si le Faucon kobez est observé presque chaque année depuis 2005, c'est quasi exclusivement lors de la migration pré-nuptiale (en mai principalement).

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (27-22-25)

Les observations s'étalent du 13/10/13 à Château-Larcher (JomL) au 23/03/14 à Craon (FaiC, PoiCy). Les oiseaux sont souvent vus posés sur une motte ou en chasse comme à Blaslay le 7/11/13 avec capture d'un passereau (RoyD).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (131-56-103)

Le dernier oiseau en partance pour l'Afrique tropicale - un ind. de première année - a été noté le 3/10/13 à Château-Larcher (JomL). Le retour vers les sites de reproduction est annoncé dès le 29/03/14 - date précoce - à Chauvigny (DubT), les observations se faisant plus nombreuses à partir de la deuxième décennie d'avril. Un couple est cantonné le 13/04/14 à Vouillé sur un site occupé la saison passée (VenJ), mais aucune preuve de reproduction certaine dans le département n'a pu être apportée cette année.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (55-26-28)

En dehors de juillet, le Faucon pèlerin est observé chaque mois de l'année. Cette saison, six aires ont été occupées et un seul couple a connu l'échec. Au total, 11 jeunes ont pris leur envol, comme l'an passé (JeaÉ *et al.*). On l'a vu capturer un Vanneau huppé le 2/12/13 à Vouillé (VenJ), attaquer une Mouette rieuse le 8/03/14 à Usson-du-Poitou (BusR) et proposer un Pigeon ramier au menu de sa progéniture le 15/06/14 (JeaÉ).

RALLIDÉS**Rôle d'eau *Rallus aquaticus* S (33-15-18)**

Observations rares mais régulières sur l'année. Un pic postnuptial en octobre 2013, et pré-nuptial en mars 2014. À noter qu'il n'y a aucune donnée en avril, mois pourtant connu comme période de migration pré-nuptiale. Le seul contact avec plus de deux ind. est noté à l'Étang de Beaufour à Saulgé le 29/10/13 (RanN). Une nidification possible à l'Étang du Tinturier à Leignes-sur-Fontaine avec une observation le 25/05/14 (DubT).




Figure 1. Nombre de Râles d'eau observés par mois.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (525-112-230)

Le 11/11/13 à Châtellerault, un ind. vole de rameau à rameau dans un figuier à la manière d'un pigeon pour picorer dans les dernières figues accrochées alors que le sol en est jonché (DupL).

Foulque macroule *Fulica atra* S, M (528-61-127)**GRUIDÉS****Grue cendrée *Grus grus* M (333-103-229)**

La première observation postnuptiale a lieu le 28/08/13 à Chaunay

avec 50 ind. (FaiC). La descente vers le sud se concentre sur la mi-novembre avec une journée du 13/11/13 qui regroupe près de 11% des observations de la période considérée et des effectifs de plusieurs milliers d'oiseaux : 7 000 ind. à Brigueil-le-Chantre (LyoTh), 2 700 ind. à Champagné-le-Sec (BaxA) ou encore 3 000 ind. à Valdienne (BoiP). En 2014, de nombreux vols pré-nuptiaux s'observent à partir de la mi-février pour se terminer brutalement le 9/03 où près de 9% des données de la période sont rapportées ce jour. À compter de cette date, une seule observation sera notée avec 1 ind. le 25/05/14 à Sillars (DubT). À noter les journées du 23 et 24/02/14 (21% des données) avec des effectifs élevés : 10 300 ind. à Montmorillon (PlaP), 6 000 ind. à Moussac (JeaÉ), 7 000 ind. à Payroux (BouAC), 11 146 ind. à Saulgé (VenJ), 10 111 ind. à Sillars (LiéB et RenG).




Figure 2. Pourcentage des observations de Grues cendrées par mois.

OTIDIDÉS**Outarde canepetière *Tetrax tetrax* E (965-40-275)**

L'effectif départemental maximal des rassemblements postnuptiaux est de 188 oiseaux dont 179 sur les plaines du Mirebalais-Neuvillois le 28/09/13 répartis sur 6 sites. À noter une observation en limite de la commune de Craon mais côté Deux-Sèvres d'un groupe de 150 ind. observé par l'ONCFS le 9/10/13. La dernière observation est particulièrement tardive avec 2 oiseaux observés par un agriculteur à Massognes le 2/11/13. Les deux premiers oiseaux de retour de migration, également signalés par un exploitant, ont été vus le 10/03/14 à Saint-Jean-de-Sauves ; 5 mâles sont observés le lendemain au même endroit (PoiCy). Les 3 seules observations de reproduction certaine nous ont été transmises par des agriculteurs : 1 femelle et 2 poussins à Cherves vers la mi-juillet, 1 femelle et 3 jeunes à peine volants à Mazeuil vers le 20 juillet et enfin une femelle et 3 poussins à Saint-Sauvant le 30/07/14.

RÉCURVIROSTRIDÉS**Échasse blanche *Himantopus himantopus* M (4-3-3)**

Quatre mentions au passage printanier : 1 ind. le 5/05/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL), 4 femelles et 2 mâles le 6/05/14 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind. le 6/05/14 à l'Étang de Chez Séguier à Pressac (RicE) et 1 ind. le 9/05/14 à l'Étang de la Pétolée (BusR).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* M (1-1-1)

Un groupe de 24 ind. en vol le 13/09/13 au Plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ).

BURHINIDÉS

OEdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

E, S (854-129-506)

L'effectif maximal observé sur un même site de rassemblement postnuptial est de 203 ind. à Vouzailles (PoiCa), le 28/09/13 à l'occasion du troisième comptage simultané des sites de rassemblement. Lors de ce comptage, 2 103 ind. ont été observés sur tout le département dont 1 132 ind. pour les seules plaines du Mirebalais-Neuville. Malgré quelques recherches en décembre sur des sites de rassemblement postnuptiaux, les derniers individus observés l'ont été le 30/11/13 avec 2 ind. à Vouillé (Venj) et 5 ind. à Coulombiers (PoiCy). Les premiers retours sont constatés dès le 1/03/14 avec 3 oiseaux à Mauprévoir (BouAC) et 1 ind. à Vouzailles (AleNJ). Les observations de reproduction certaine concernent majoritairement des ind. observés en train de couvrir et s'étalent du 20/04/14 au 5/06/14.

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot *Charadrius dubius* **M, E (56-16-19)**

18 indices de nidification collectés en 2014 sur 7 communes : Bonneuil-Matours (FraS, DubT), Craon (FaiC, BouAC), Saint-Cyr (DupL *et al.*), Sillars (BouAC *et al.*), Les Trois-Moutiers (DubT), Usson-du-Poitou (JomL) et Valdivienne (BoiP). Premier cantonnement observé à Valdivienne le 4/05/14 (BoiP), famille observée le 26/06/14 à Sillars (Venj) et dernier comportement reproducteur noté le 10/07/14 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 1 adulte alarmant (Tilj).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* **M (13-7-8)**

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* **M, H (72-39-66)**

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* **M (1-1-1)**

Un ind. le 15/09/13 à La Grimaudière (PoiCa, PoiCy).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* **H, S (501-126-338)**

52 indices de nidification collectés sur 22 communes. Reproduction prouvée à Doussay avec 1 à 5 jeunes observés entre le 5/06 et le 16/06/14 (PoiCa, PoiCy), et 2 poussins à Savigny-sous-Faye le 16/06/14 (PoiCy).

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* **M (1-1-1)**

1 ind. le 14/05/14 à Craon (BouAC).

Bécasseau minute *Calidris minuta* **M (4-2-2)**

1 ind. les 12 et 13/9/13 à l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN). 2 ind. le 2/10/13 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL). 1 ind. le 5/08/14 à l'Étang des Brandes de la Châtre (RanN).

Bécasseau variable *Calidris alpina* **M (10-5-5)**

Trois mentions au passage postnuptial 2013 du 01/10 au 04/10. Sept mentions au passage pré-nuptial 2014 du 21/03 au 9/05. Le maximum est de 7 ind. le 23/03/14 à Arçay (FaiC et PoiCy).

Combattant varié *Philomachus pugnax* **M (17-8-9)**

Six mentions au passage postnuptial 2013, toutes concernant des ind. de première année observés à l'unité. Dernière mention postnuptiale le 27/09/13 à l'Étang de la Pétolee à Usson-du-Poitou (BusR). Neuf mentions au passage printanier 2014 notées du 21/03

au 27/05. Deux mentions pour la migration postnuptiale 2014 avec 1 ind. dès le 16/07 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* **M (4-3-3)**

1 ind. le 24/09/13 à l'Étang de la Roche à Sillars (PlaP). 1 ind. le 30/10/13 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). 1 ind. le 13/01/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). 1 ind. le 10/04/14 à Montmorillon (Venj).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

H, M (105-24-33)

La répartition mensuelle des données indique les deux pics migratoires : octobre et mars. Maximum de 23 ind. le 31/10/13 à l'Étang de Beaufour à Saugé (CauM et ChÉT). Premier migrateur postnuptial 2014 le 29/07 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj).




Figure 3. Nombre d'observations de Bécassines des marais par mois.

Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* **A (1-1-1)**

1 ind. le 7/05/14 à Craon (BouAC). Première mention départementale de cette espèce soumise à homologation nationale.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* **S, H (29-19-26)**

La majorité des données est collectée en période hivernale, le plus souvent à l'unité, avec un maximum de 4 ind. le 16/02/14 à Fleix (BoiP). La croule est notée le 9/04/14 à La Bussière (DubT) et le 21/06/14 à Montamisé (PicY). Un cas de reproduction certaine est relevé à Valdivienne avec une femelle couvant le 13/06/14 (BoiP).




Figure 4. Nombre d'observations de Bécasses des bois par mois.

Barge à queue noire *Limosa limosa* **M (3-3-3)**

10 ind. le 8/09/13 à l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (GiLD). 19 ind. le 18/03/14 à Savigné (GriP). 1 ind. le 22/03/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (FaiC).

Barge rousse *Limosa lapponica* M (3-2-2)

L'espèce avait été mentionnée dans la Vienne une seule fois en avril 1992 dans les données récentes ; pas étonnant pour un oiseau dont la migration est normalement strictement littorale. 2 ind. le 28/09/13 à Rouillé (RenG). 1 ind. de première année le 1/10/13 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL). Un mâle adulte le 6/05/14 à l'Étang de la Pétolée (JomL).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* M (5-4-5)

2 ind. le 23/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). 4 ind. le 30/04/14 à Migné-Auxances (TilJ), 1 ind. le 2/05/14 à Usson-du-Poitou (BusR), 6 ind. le 3/06/14 à Champigny-le-Sec (FaiC).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (146-23-67)

Des oiseaux sont encore présents sur les sites de reproduction en plaine jusqu'à début septembre à Craon (TilJ, BusR), La Grimaudière (TilJ), Massognes (FaiC), Saint-Sauvant (CouP), et sont notés en 2013 jusqu'au 16/10 avec 1 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les premiers retours sont observés le 23/02/14 à Sillars en deux localités avec un mâle chanteur (SavF, RenG). Des nicheurs probables sont notés sur 15 communes dont 11 localisées en secteur de grande plaine céréalière.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (6-4-4)

Six mentions printanières : 1 ind. le 28/03/14 à Arçay (MétA), 1 ind. le 23/04/14 à Craon (FaiC, PoiCa), 3 ind. le 26/04/14 à Craon (BouAC), 2 ind. le 30/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (MinN), 1 ind. le 23/04/14 à Arçay (PoiCy et PoiCa), 8 ind. le 29/05/14 à Amberre (VenJ).

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (49-13-14)

Le passage prénuptial 2014 est noté du 8/03, avec 5 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (CouD), au 12/06 avec 1 ind. également sur le même site (GuÉT). Maximum de 11 ind. le 23/03/14 à Arçay (FaiC et PoiCy). 1 ind. est contrôlé le 25/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (PoiCa et TilJ) bagué dans sa première année le 10/08/10 à la Réserve Naturelle Nationale de Moëze. L'observation du 10/07/14 de 2 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) est vraisemblablement le fait de migrateurs postnuptiaux précoces.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (57-15-18)

Passage postnuptial 2013 du 27/08, avec 1 ind. à l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN), au 13/10 avec 3 ind. en vol à Quinçay (VenJ). Migration prénuptiale 2014 étalée du 8/04 avec 1 ind. à Arçay (PoiCy) au 26/06 avec 1 ind. à Sillars (RanN).




Figure 5. Nombre d'observations de Chevaliers aboyeurs par mois.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (109-32-47)

Observé tous les mois de la période considérée avec un pic en octobre et un autre en avril. Maximum de 10 ind. le 14/08/14 au Grand Étang à La Puye (DubT).




Figure 6. Nombre d'observations de Chevaliers culblancs par mois.

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (16-8-8)

Dernière mention postnuptiale le 30/08/13 de 1 ind. à l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Migration prénuptiale à partir du 26/04/14 avec 1 ind. à Craon (BouAC). Maxima de 3 ind. les 7/08/14 et 9/08/14, respectivement, à La Bussière (DubT) et Saint-Jean-de-Sauves (PoiCy).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (101-38-43)

Pas de données en période hivernale. Habituellement, il reste toujours un faible effectif d'hivernants. Maximum de 20 ind. le 6/05/14 à Valdivienne (BoiP). Passages migratoires centrés en août et mai.




Figure 7. Nombre d'observations de Chevaliers guignettes par mois.

STERCORARIIDÉS**Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* A (1-1-1)**

Troisième donnée départementale : 1 adulte phase claire en plumage internuptial le 29/10/13 à l'Aéroport de Biard. Repéré posé au sol par un pilote, récupéré et apporté au siège de la LPO, visiblement affaibli.

LARIDÉS**Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* M (3-3-3)**

Trois mentions en février 2014 : 1 ind. le 8/02 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (PoiCy), 1 ind. le 11/02 à Lusignan (PréO) et 1 ind. le 11/02 à Arçay (ArMA).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (110-40-58)

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* M (5-1-1)

Cinq mentions, toutes provenant du Plan d'eau de Saint-Cyr : 1 ind. le 17/10/13 (Tilj), 1 ind. le 27/10/13 (BouAC), 1 ind. le 8/11/13 (Tilj), 2 ind. le 8/04/14 (MétA) et 1 ind. le 18/04/14 (Tilj).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (4-3-4)

1 ind. le 15/02/14 à Chasseneuil-du-Poitou (Tilj), 3 ind. le 20/03/14 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr (DupL, Tilj), 1 ind. le 20/03/14 à Arçay (DebÉ) et 1 ind. le 22/03/14 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr (FaïC).

Goéland cendré *Larus canus* H (1-1-1)

1 ind. le 25/08/13 à La Chapelle-Montreuil au sein d'un groupe de laridés dans un labour (Venj).

Goéland leucopée *Larus michahellis* M, H (57-19-29)

Observé en groupes importants en période postnuptiale comptant plusieurs dizaines d'ind. souvent dans des labours. Maximum de 200 ind. le 5/11/13 à Rouillé (NadY). Au printemps, généralement noté à l'unité (maximum de 5 ind. le 17/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC)).




Figure 8. Nombre d'observations de Goélands leucopées par mois.

Goéland argenté *Larus argentatus* H (1-1-1)

1 ind. de troisième année le 24/11/13 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB).

Goéland brun *Larus fuscus* H (3-3-3)

2 ind. le 9/10/13 à Port-de-Piles (MeiC), 2 ind. le 31/07/14 à Lusignan (PréO), 1 ind. le 10/08/14 à Vouillé (PoiCy).

STERNIDÉS**Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* A (1-1-1)**

Troisième mention départementale : 1 ind. le 21/05/14 au Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* A (1-1-1)

Première mention de l'espèce en Vienne : 1 ind. le 19/09/13 au Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj et FaïC).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (48-7-10)

Dernière mention de la migration postnuptiale 2013 avec 1 ind. le 20/09 au Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj). Premier migrateur printanier le 28/03/14 au Plan d'eau de Saint-Cyr également (Tilj). Comportements reproducteurs notés sur 2 sites : la Réserve ornithologique de Saint-Cyr et une ancienne gravière à Bonneuil-Matours avec succès sur ce dernier site : 1 couple avec 2 poussins le 26/07/14 (Tilj).

Sterne naine *Sternula albifrons* M (1-1-1)

1 ind. le 21/05/14 au Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (19-6-7)

Migration postnuptiale du 16/04/14 au 23/05/14 avec des maxima de 17 et 23 ind. notés au Plan d'eau de Saint-Cyr les 23/04 et 21/05/14 (Tilj). À noter 16 ind. le 17/06/14 au Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj), pouvant correspondre à des reproducteurs méridionaux recherchant un nouveau site de nidification.

Guifette noire *Chlidonias niger* M (11-2-3)

Observée sur seulement 3 localités : Plan d'eau et Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj *et al.*) et Étang Baro à Mauprévoir (BusR). Passage postnuptial du 18/09/13 au 30/10/13 et pré-nuptial du 18/04/14 au 21/05/14, avec toujours 1 ou 2 ind..

COLUMBIDÉS**Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (32-22-27)**

Répartition homogène de l'espèce sur le territoire. Les rassemblements observés sont modestes, 25 ind. le 4/10/13 à Pressac (SmiM) et 25 ind. le 13/10/13 à Craon (PoiCy) pour les plus importants.

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (1567-185-918)**Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (623-137-361)****Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* E (523-137-407)**

Dernière mention 2013 le 3/11 avec 1 ind. à Saint-Léomer (ChaR). Premières mentions 2014 le 13/04 à Vouneuil-sur-Vienne (PicC) et à Lusignan (CouP) toujours avec 1 ind..

PSITTACIDÉS**Inséparable masqué *Agapornis personatus* ? (1-1-1)**

Première donnée départementale : 1 ind. observé à Poitiers le 27/05/14 à proximité du Jardin des Plantes (Venj).

CUCULIDÉS**Coucou gris *Cuculus canorus* E (562-124-427)**

Pas de donnée en 2013 dans la période considérée. Première mention 2014 le 9/03 avec un mâle chanteur à Biard (BouV).

TYTONIDÉS**Effraie des clochers *Tyto alba* S (163-69-126)****STRIGIDÉS****Petit-duc scops *Otus scops* E, M (3-1-1)**

Des contacts signalés à Coussay-les-Bois avec le chant d'1 ind. le 8/04, puis de 2 ind. les 13 et 15/04 (DesC).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (355-92-213)**Chouette hulotte *Strix aluco* S (243-78-171)****Hibou moyen-duc *Asio otus* S (94-47-70)****Hibou des marais *Asio flammeus* S (25-7-9)**

La première observation est signalée le 10/11/13 à Saulgé (RanN).

Un dortoir regroupant jusqu'à 15 oiseaux est signalé à Champigny-le-Sec le 23/02/14 (TilJ) et le groupe reste sur les lieux au moins jusqu'au 6/03/14 (TilJ). Quelques observations en période de nidification : 1 ind. régulièrement observé de mars à juin à la Grimaudière (BouAC), et surtout ces parades de 2 ind. avec des claquements d'ailes à Vouillé le 15/05/14 (LeRA) qui laissent présager une nidification probable.

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* E (105-31-49)

En 2013, les 2 dernières observations mentionnent 1 et 2 ind. le 4/09 à Chauvigny (DubT). Le premier ind. de retour de migration est noté le 22/04/14 à Quinçay (VenJ).

APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* E (339-84-252)

Les derniers ind. signalés en période postnuptiale sont observés le 28/08/13 au-dessus de Poitiers (BezÉ), alors que les premiers retours sont mentionnés à partir du 14/04/14 à Poitiers (BusR, LiéB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (297-75-134)

L'espèce est observée tout au long de l'année et notée nicheuse certaine dans au moins 10 communes : Bonneuil-Matours (TilJ), Celle-Lévescault (PréO), Château-Larcher (JomL), La Grimaudière (FaiC), Lésigny (DesJ), Pleumartin (DupL), Poitiers (FilÉ), Quinçay (VenJ), Saint-Cyr (TilJ) et Valdivienne (BoiP). Notons, par exemple, des transports de nourriture à Poitiers le 1/05/14 (FilÉ) et à Celle-Lévescault le 14/05/14 (PréO), le nourrissage d'un jeune de première année le 1/06/14 à Quinçay (VenJ) ou encore des jeunes observés à Pleumartin le 3/07/14 (DupL).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (39-15-25)

En 2013, les derniers oiseaux ont été vus le 1/09, 4 ind. dont 2 posés, à Vicq-sur-Gartempe (DesC) et le 20/09, 15 ind. en vol de migration, à Brigueil-le-Chantre (WelB). Au printemps suivant, les 7 premiers individus sont observés sur un site de nidification le 30/04/14 à La Roche-Posay (DesJ). Cette saison 2014 aura vu 61 couples se reproduire sur 15 sites, 11 en rivière et 4 en carrière. La colonie la plus importante comptait 16 couples (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* E (275-105-212)

Deux observations en septembre 2013 : 1 ind. le 11/09 à Savigny-Lévescault (GuÉT) et 1 ind. le 15/09 à Quinçay (VenJ). En 2013, la dernière huppe a été vue le 20/10 à Moussac (JeaÉ). Retour du premier migrateur le 8/03/14 à Asnières-sur-Blour et à Usson-du-Poitou (BusR).

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (15-13-14)

En période postnuptiale, la dernière observation est effectuée à Pressac le 10/10/13 (SmiM) et le premier individu de l'année 2014 est observé à Montmorillon le 14/04 (PlaP). Un couple nicheur installé dans un robinier est signalé à Saint-Léomer le 2/06/14 (VenJ).

Pic vert *Picus viridis* S (695-139-409)

Pic noir *Dryocopus martius* S (178-57-115)

Espèce contactée tout au long de l'année. Des preuves de nidifications probables à Lussac-les-Châteaux et Quinçay (VenJ), à Valdivienne (BoiP), à Vivonne (PréO) et à Vouillé (DucS), mais aucune preuve de nidification certaine. À noter cette femelle qui semble donner une leçon de cris à son jeune perché à proximité à Vouillé le 23/06/14 (BerJ).

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (720-141-433)

Pic mar *Dendrocopos medius* S (67-21-49)

L'espèce est mentionnée tout au long de l'année à l'exception des mois d'août et septembre. Deux nidifications certaines à Quinçay (DupJ) et à Vouillé (VenJ).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (69-39-62)

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* E (1-1-1)

Une unique observation d'un ind. au Rochereau le 9/06/14 (OuvP).

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (112-49-82)

La majorité des observations vient du nord-ouest du département. Une nidification certaine est notée à Vouillé le 19/05/14 (VenJ).



Figure 9. Répartition des observations de Cochevis huppés.

Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (60-26-47)

L'espèce est souvent notée à l'unité ; mentionnons cependant ces maxima de 35 ind. le 31/10/13 à Pressac (SmiM) et de 12 ind. le 7/12/13 à Curzay-sur-Vonne (RoyD). Le 8/03/14, plus de 20 ind. sont comptés en 5 heures de suivi de migration à Château-Larcher (JomL). Seulement des cas probables de nidification à Journet (VenJ) et sur 3 sites distincts à Archigny (OuvR).

Alouette des champs *Alauda arvensis* S, M, H (1883-137-1056)

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (48-21-32)

Dernière mention 2013 le 2/10 à Château-Larcher, 1 ind. (JomL). Première mention 2014 le 20/03 à Mazerolles, 2 ind. (VenJ).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (779-179-589)
Dernière mention 2013 le 31/10 à Pressac, 2 ind. (SmiM). Premières mentions 2014 le 8/03 à Château-Larcher, 2 ind. (JomL), et à Availles-Limouzine, 3 ind. (BusR).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (263-107-184)
Dernière mention 2013 le 2/10 à Château-Larcher, 4 ind. (JomL). Première mention 2014 le 23/03 à Moncontour, 1 ind. (FaiC, PoiCy). À noter 5 nids encore occupés par des jeunes le 13/09/13 à Saint-Cyr (Tilj).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (5-5-5)
Seulement cinq mentions, chacune avec 1 ind. à Champigny-le-Sec le 5/09/13 (Venj), à Château-Larcher le 2/10/13 (JomL), à Saint-Sauvant le 3/05/14 (JomL), à Valdivienne le 31/05/14 (BoiP) et à Charroux le 6/06/14 (DevP).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (282-75-196)
Dernière mention 2013 le 4/10 à Vivonne, 1 ind. (JomL). Premières mentions 2014 le 24/03 à La Grimaudière (FaiC) et à Saint-Pierre-de-Maillé (DubT) avec 1 ind..

Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (235-96-181)

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (25-11-13)
Les observations sont réparties entre le 1/10/13, 1 ind. à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), et le 28/03/14, 1 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). Un maximum de 7 ind. est noté le 21/03/14 à l'Étang de Sejotte à Bourg-Archambault (Venj).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (751-67-488)
En 2013, observée régulièrement jusqu'au 13/10 avec 1 ind. à Château-Larcher (JomL). En 2014, les mentions deviennent courantes à partir du 22/03 avec 1 ind. à Avanton (FaiC) et à Dangé-Saint-Romain (Tilj). À noter l'observation précoce d'1 ind. durant un comptage migratoire le 8/03/14 à Château-Larcher (JomL). Les maxima sont de 38 ind. le 29/08/13 à Ayron (GiaC), plus de 40 ind. le 15/09/13 à Vouzailles (PoiCa, PoiCy) et 30 ind. le 25/04/14 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (7-5-6)
Une mention postnuptiale : 4 ind. le 26/09/13 à Saulgé (PlaP). Six mentions pré-nuptiales entre le 13/04/14, 1 ind. à Avanton (LecF), et le 25/04/14, 1 ind. à Jaunay-Clan (Tilj) et à Usson-du-Poitou (BusR).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava x iberiae* E, M (2-2-2)
Deux mentions de cette hybridation aussi appelée Bergeronnette centratlantique : 1 ind. le 6/04/14 à Avanton (FaiC) et 2 ind. le 16/05/14 à Villiers où il est possible qu'elle ait niché (PoiCa).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (145-56-106)

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (561-150-341)
À noter des dortoirs hivernaux de 300 ind. le 13/01/14 à Poitiers (ChaA) et de plus de 150 ind. le 11/03/14 à Loudun (FaiC).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (17-9-12)

L'espèce est notée entre le 18/11/13, 2 femelles à Poitiers (FaiC), et le 26/03/14, 1 femelle à l'Étang de Beauregard à Iteuil (FaiC). Une observation tardive le 5/05/14 avec 1 mâle à Vendevre-du-Poitou (PoiCa).

CINCLIDÉS

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* S (1-1-1)
Pas d'évidence de nidification dans le département mais un jeune de première année est signalé sur la Gartempe à Lathus-Saint-Rémy le 26/06/14 (Venj).

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (726-141-428)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (533-94-274)

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (912-139-471)

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (793-142-594)

Dernière mention 2013 le 4/09 à Sillars, 1 ind. (Venj). Première mention 2014 le 25/03 à Journet, 2 ind. (Venj).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (38-14-20)
Trois observations marquent le passage postnuptial avec 1 ind. le 14/09/13 à Pressac (SmiM), 1 ind. le 24/09/13 à Sillars (PlaP) et 1 ind. le 2/10/13 à Château-Larcher (JomL). Le début de la migration pré-nuptiale est noté par 1 ind. le 10/04/14 à Rouillé (HaiM) et 1 ind. le 14/04/14 à Usson-du-Poitou (FaiC). La reproduction est notée dans 2 communes, 1 jeune et 1 adulte le 16/06/14 à Craon (FaiC) et 2 familles le 22/06/14 à Cherves (PoiCy).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (556-138-340)

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (208-62-134)

Dernières mentions 2013 le 2/10 à Château-Larcher (JomL) et à Ligugé (GodG) avec 1 ind. Première mention 2014 le 20/03 à Valdivienne, 1 ind. (BoiP).

Rougequeue noir x à front blanc *Phoenicurus ochruros x phoenicurus* (1-1-1)

Bien qu'il ne soit pas possible de statuer sur l'hybridation ou la sous-espèce orientale *Phoenicurus ochruros phoenicuroides*, il est probable que ce mâle, observé à Poitiers le 12/04/14 (PouO), soit un cas d'hybridation étant donné qu'il existe des mentions en France et que la sous-espèce est, du coup, très rare.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (57-32-51)

La première note de la migration postnuptiale mentionne 1 ind. le 16/08/13 à Saulgé (BouAC) ; la dernière 1 ind. le 30/09/13 à La Bussière (DubT). Le maximum est de 8 ind. le 8/09/13 à Pressac

(SmiM). L'observation de la migration pré-nuptiale débute par 3 ind. le 8/04/14 à Rouillé (RenG) et se termine par 1 ind. le 18/05/14 à Archigny (OuvR).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (570-132-370)

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (155-59-132)

L'observation de la migration d'automne s'étend jusqu'au 19/10/13 avec un maximum de 9 ind. le 8/09/13 au Rochereau (PoiCa) ; la dernière note mentionne 4 ind. le 30/11/13 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (LiéB). L'observation de la migration pré-nuptiale débute par 1 ind. le 12/03/14 à Coulombiers (VenJ) ; le passage est régulier jusqu'à fin mai. Seulement un indice de nidification probable avec 1 couple cantonné le 13/06/14 à Villiers (FaiC).

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (5-4-5)

Deux observations en automne : 1 ind. le 2/10/13 et 2 ind. le 4/10/13 à Château-Larcher (JomL). Trois observations au printemps : 1 ind. le 29/03/14 à Sainte-Radegonde (CouP), 1 ind. le 14/04/14 Vouneuil-sur-Vienne (GILD) et 1 mâle le 17/04/2014 à Chouppes (FaiC).

Merle noir *Turdus merula* S (1587-187-908)

Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (62-42-59)

La première donnée est notée le 3/11/13 à Vouneuil-sur-Vienne avec 2 ind. (PicC), et la dernière le 5/04/14 à Blaslay, 27 ind. (RoyD).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (370-112-260)

Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (71-35-63)

Première observation le 4/10/13 à Château-Larcher avec 2 ind. (JomL). Dernière donnée le 24/03/14 à Craon avec au moins 4 ind. (FaiC).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (313-85-222)

SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (48-15-22)

Aucune preuve de reproduction mais elle est suspectée dans 10 communes.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (8-6-6)

La reproduction est prouvée à Bourg-Archambault avec un transport de nourriture les 18 et 19/04/14 (AusM). Des indices permettent de penser qu'elle a aussi niché à Bonneuil-Matours (DupL), Craon (FaiC, PoiCa), Saires (GILD *et al.*) et Savigné (GriP).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (62-11-25)

Premier chant entendu le 5/04/14 à Saint-Cyr (FaiC). La grande majorité des contacts ont eu lieu en Forêt de Moulière (FaiC *et al.*) et Forêt de Vouillé (VenJ *et al.*), dans des parcelles de brande ou en régénération. Notée plus rarement en bordure d'étang, exemple le 30/05/14 à l'Étang de Lambertière à Mauprévoir (BouAC).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (9-4-5)

La première donnée de la saison date du 28/03/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ, FraS). Un couple a élevé au moins deux jeunes à l'Étang de Beaufour à Saugé, les parents les nourrissant le 19/06/14 (BouAC). À noter cet oiseau trouvé mort sur un trottoir de Poitiers le 4/05/14 (WILT).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

M, E (74-24-31)

Dernier chant (discret) entendu le 25/08/13 à La Puye (OuvR) et dernier contact le 17/10/13 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). C'est également à cet endroit qu'apparaît le premier migrateur le 28/03/14 (TilJ, FraS). L'espèce s'y est par ailleurs reproduit (TilJ), ainsi qu'à Saint-Maurice-la-Clouère (FaiC). Dans 22 autres communes, la nidification est probable. Des concentrations ont été notées au Marais de la Culée à Moncontour avec au moins 10 chanteurs le 18/05/14 (BerJ) et au Grand Étang à La Puye avec 10 chanteurs le 8/05/14 (DubT) et 12 le 22/06/14 (OuvR).

Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* E (356-100-261)

Dernier contact : 26/08/13 (LipD) - Premier migrateur : 3/04/14 (DesE) - Premier chant : 12/04/14 (BusR) - Dernier chant : 21/07/14 (GriP).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (66-7-22)

La plupart des observations ont été faites dans les landes du Pinail où, dès le 19/04/14, un mâle apportait des chenilles au nid (LiéB). Plus au nord, à Antran, un couple avec 2 jeunes a été observé le 2/06/14 (LanJ). Les autres données laissant supposer la reproduction proviennent du Montmorillonnais (VenJ) et de Chauvigny (DubT).

Fauvette grisette *Sylvia communis* E (822-121-562)

Dernier contact : 2/10/13 (JomL) - Premier migrateur et premier chant : 3/04/14 (DubT) - Dernier chant : 14/07/14 (BouAC, VenJ).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (73-36-56)

Dernier contact : 2/10/13 (JomL) - Premier migrateur : 10/04/14 (DupL) - Premier chant : 22/04/14 (BoiA) - Dernier chant : 30/07/14 (FleJ).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (1278-169-788)

Premier chant : 28/02/14 (BoiA) - Dernier chant : 29/07/14 (DorM).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

M (1-1-1)

Une seule observation le 28/09/13 à Biard (BouV). C'est la troisième mention pour le département de ce pouillot sibérien qui apparaît de plus en plus régulièrement dans l'ouest de l'Europe lors de ses migrations ou en hivernage.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (112-37-72)

La première observation et le premier chant datent du 28/03/14 à Sèvres-Anxaumont (BusR). Pas de preuve de reproduction certaine cette année malgré les contacts réguliers. Les dernières observations de la saison ont été faites le 7/07/14 à Anché (DorM) et à Smarves (CroD) où l'oiseau était chanteur.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* E (38-8-15)

L'arrivée de ce migrateur est notée le 13/04/14 avec un chanteur en Forêt de Vouillé (VenJ). Dans ce même massif, une femelle construit un nid le 30/04/14 (BerJ), puis, dans trois parcelles différentes, le nourrissage de jeunes au nid est observé entre le 2/06/14 et le 10/07/14 (BerJ). La dernière donnée de la saison provient de la Forêt de Mareuil et date du 13/07/14 (DubT).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (927-165-551)

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (78-45-64)

Lors de la migration post-nuptiale, un dernier individu est ob-

servé le 14/10/13 à Civray (BouN). Le passage printanier s'amorce dès le 8/03/14 à Montreuil-Bonnin avec un oiseau chanteur (AleJF) et se poursuit jusqu'à début mai. Le retour de l'espèce en migration vers le sud est noté le 13/08/14 à Château-Larcher (JomL).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (36-19-28)

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (365-76-234)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (47-30-41)

La migration postnuptiale est visible jusqu'au 4/10/13 à Château-Larcher (JomL). On note le retour de l'espèce dans la même commune avec un chanteur le 3/05/14 (JomL). Il est nicheur certain dans quatre communes : transports de nourriture observés à Quinçay le 29/06/14 (VenJ) et à Poitiers le 3/07/14 (BusR), jeunes vus à Anché le 11/07/14 (VenJ) et à Savigné le même jour (VenJ).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (64-35-48)

Observations quasi quotidiennes entre le 22/08 et le 22/09/13 lors de la migration postnuptiale. Les derniers oiseaux sont vus le 5/10/13 à Châtellerauld (MeiC). Seulement deux données au passage printanier, le 19/03/14 à Savigné (GriP) et le 30/03/14 à Saulgé (CroD). Le début du passage postnuptial est noté le 13/08/14 à Ligugé avec une femelle chassant, en bordure de rivière, en compagnie de Gobemouches gris (BerJ) et à Poitiers où une femelle également est observée (DubT).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (368-112-251)

PARIDÉS

Mésange nonnette *Poecile palustris* S (153-45-110)

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* S (80-26-62)
Surtout observée en période hivernale, l'effectif maximum est de 5 ind. le 18/03/14 à Bonneuil-Matours (RosF). Une seule note de nidification certaine le 27/05/14 aux Trois-Moutiers (DubT).

Mésange noire *Periparus ater* H, S (5-3-4)

Observée uniquement en hiver. La première observation mentionne 2 ind. le 20/12/13 à Chauvigny (DubT), la dernière 1 ind. le 6/03/14 à Château-Larcher (JomPS).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S (906-146-494)

Mésange charbonnière *Parus major* S (1176-165-595)

SITTIDÉS

Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (326-83-214)

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (364-107-253)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (2-2-2)

Seulement deux mentions de cette espèce : 2 ind. le 14/12/13 à Iteuil (JomL) et 9 ind. le 19/03/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN).

ORIOOLIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (290-100-238)

Dernière mention 2013 le 7/09 à Poitiers (VenJ). Première observation printanière le 22/04/14 à Ingrandes (BoiA).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (193-60-129)

La dernière observation 2013 est notée le 26/09 à Saulgé (VenJ) et la première donnée de retour concerne un mâle vu le 30/04/14 à Vouillé (LerA). La nidification est prouvée dans 5 communes seulement : Bonneuil-Matours avec 8 données (TilJ), Chouppes (BonJ), Châtellerauld (DupL), Valdivienne (BoiP) et Saint-Julien-l'Ars (MorC).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (51-2-12)

Un ind. aurait été observé pendant deux mois à Thuré (notes des 9 et 10/01/14 (FraB, DupL)). L'espèce est également observée sur une longue période entre le 31/10/13 (CauM) et le 10/03/14 (VenJ) à Saulgé avec la confirmation de 2 ind. le 2/03/14 (RanN, VenJ, FaiC).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (20-8-11)

Dernière observation 2013 le 10/09 à Lathus-Saint-Rémy (RanN) et première mention 2014 le 4/05 à Savigny-Lévescauld (GuÉT). La nidification est suivie du 22/07/14 au 10/08/14 à Savigny-Lévescauld (CouBM).

CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (573-139-376)

Pie bavarde *Pica pica* S (812-138-446)

Le suivi du dortoir du Campus universitaire de Poitiers donne en effectif minimal : 536 ind. le 12/03, 517 le 20/03, 432 le 27/03 et 158 le 2/04/14 (BusR).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (293-81-148)

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (310-84-207)

Corneille noire *Corvus corone* S (1214-174-812)

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (1013-164-637)

Dortoir au Grand Étang à La Puye avec plus de 500 ind. composé à environ 90 % d'immatrices de première année le 1/06/14 (OuvR). À noter des tentatives de prédation au nid de jeunes Hirondelles de fenêtre réalisées par 2 ind. le 28/05/14 à Montamisé (BusR).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus* S (749-154-397)

Moineau friquet *Passer montanus* S (24-10-13)

Seulement 24 mentions réparties entre le 27/11/13, 2 ind. aux Roches-Prémarie-Andillé (FloJ), et le 14/06/14, 2 ind. à Valdivienne (BoiP). La situation de cette espèce, observée sur 10 communes, est de plus en plus préoccupante. Seul un cas d'une probable nidification est rapporté sur Valdivienne (BoiP). Les maxima sont de 20 ind. le 11/12/13 aux Ormes et 7 le 26/03/14 à Dangé-Saint-Romain (DupL).



Figure 10. Répartition des observations de Moineaux friquets.

FRINGILLIDÉS**Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (1455-199-825)**

Groupe de plus de 3 000 ind. dans un champ de tournesol à Château-Larcher le 14/12/13 (JomL).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (69-37-56)

Les premiers hivernants, 2 ind., sont notés le 2/10/13 à Château-Larcher (JomL). À partir de cette date, ils sont régulièrement observés jusqu'au 10/03/14, 1 ind., à Vouneuil-sur-Vienne (DavS). Une dernière donnée, 2 ind., le 27/03/14 à Ligugé (LauG). Effectif maximal de 60 ind. le 25/01/14 à Lésigny (GreG).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (241-59-137)**Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (592-127-343)****Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (715-146-419)**

À noter un jeune au nid le 28/08/13 à Quinçay (VenJ).

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (64-26-45)

Effectif maximal de 50 ind. le 9/02/14 à Usson-du-Poitou (SavF).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (732-113-488)**Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (12-6-8)**

Les observations s'étalent du 20/10/13 au 15/03/14 sur les communes de Béruges (BusR), Brigueil-le-Chantre (PlaP), Liniers (LipD), Montreuil-Bonnin (VenJ), Poitiers (FaiC) et Vouillé (VenJ *et al.*). Notons ce groupe d'une quarantaine d'ind. le 13/12/13 à Montreuil-Bonnin (VenJ).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (22-11-21)

Seulement 22 mentions sur les communes de Béruges (RibA,

GreF, VenJ), Château-Larcher (JomL), Chauvigny (DubT), Civray (BouN), Lussac-les-Châteaux (VenJ), Nouaillé-Maupertuis (VenJ), Quinçay (VenJ), Les Trois-Moutiers (DubT), Valdivienne (BoiP), Vouillé (VenJ, BusR), Vouneuil-sous-Biard (MétA).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (90-37-68)

Une nidification certaine avec un nid construit le 30/03/14 à Liglet (PlaP).

Fringille hybride *Fringillidae x Fringillidae sp.* (1-1-1)

1 ind. observé du 1/01 au 23/02/14 à la mangeoire à Saint-Benoît (BouAC).

EMBÉRIZIDÉS**Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (326-80-230)****Bruant zizi *Emberiza cirius* S (464-114-305)****Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (248-23-142)**

Le premier oiseau, un mâle, a été vu le 20/04/14 à Frozes (ChaA). Les observations deviennent régulières à partir du 28/04/14, date à laquelle un chanteur est noté à Amberre (FaiC). Des femelles transportent des matériaux le 12/05/14 à Frozes (VenJ) et le 18/05/14 à Varennes (PicY). Les observations cessent le 25/06/14 avec un chanteur à Chouppes (BouAC). La distribution est conforme aux années passées et touche uniquement le Mirebalais, le Neuvilleois et le Loudunais.



Figure 11. Répartition des observations de Bruants ortolans.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* S, H (125-41-71)

Un migrateur est noté le 2/10/13 à Château-Larcher (JomL), mais il faut attendre la fin octobre pour que l'espèce soit observée régulièrement. Les données sont nombreuses jusqu'en mars, plus rares en avril, mais un ind. est encore présent et fait entendre son chant le 23/04/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Bruant proyer *Emberiza calandra* S (1154-98-716)




	Possible	Probable	Certain
Aigle botté	●		
Aigrette garzette			●
Autour des palombes			●
Bécasse des bois			●
Bondrée apivore		●	
Busard cendré			●
Busard des roseaux		●	
Busard Saint-Martin			●
Buse variable			●
Caille des blés		●	
Canard chipeau			●
Canard colvert			●
Chevalier guignette	●		
Chevêche d'Athéna			●
Chouette hulotte			●
Cigogne noire	●		
Circaète Jean-le-blanc			●
Coucou gris		●	
Courlis cendré		●	
Cygne tuberculé			●
Effraie des clochers			●
Engoulevent d'Europe		●	
Epervier d'Europe			●
Faisan de Colchide			●
Faucon crécerelle			●
Faucon hobereau		●	
Faucon pèlerin			●
Foulque macroule			●
Fuligule milouin			●
Fuligule morillon			●
Gallinule poule-d'eau			●
Grand Cormoran	●		




	Possible	Probable	Certain
Grèbe castagneux			●
Grèbe huppé			●
Guêpier d'Europe			●
Héron cendré			●
Héron garde-boeufs	●		
Héron pourpré			●
Hibou des marais		●	
Hibou moyen-duc			●
Huppe fasciée			●
Martin-pêcheur d'Europe			●
Martinet noir			●
Milan noir			●
Mouette rieuse	●		
Edicnème criard			●
Outarde canepetière			●
Perdrix grise			●
Perdrix rouge		●	
Petit Gravelot			●
Pic épeiche			●
Pic épeichette			●
Pic mar			●
Pic noir		●	
Pic vert			●
Pigeon colombin		●	
Pigeon ramier			●
Râle d'eau	●		
Sarcelle d'hiver	●		
Sterne pierregarin			●
Tadorne de Belon	●		
Torcol fourmilier			●
Tourterelle des bois		●	
Tourterelle turque			●
Vanneau huppé			●

Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.



	Possible	Probable	Certain
Accenteur mouchet			●
Alouette des champs			●
Alouette lulu		●	
Bergeronnette des ruisseaux			●
Bergeronnette grise			●
Bergeronnette printanière			●
Bergeronnette centratlantique (Mf. flava x iberiae)	●		
Bouscarle de Cetti		●	
Bouvreuil pivoine		●	
Bruant des roseaux	●		
Bruant jaune			●
Bruant ortolan		●	
Bruant proyer			●
Bruant zizi			●
Chardonneret élégant			●
Choucas des tours			●
Cincle plongeur	●		
Cisticole des joncs			●
Cochevis huppé			●
Corbeau freux			●
Corneille noire			●
Étourneau sansonnet			●
Fauvette à tête noire			●
Fauvette des jardins		●	
Fauvette grisette			●
Fauvette pitchou			●
Geai des chênes			●
Gobemouche gris			●
Gorgebleue à miroir			●
Grimpereau des jardins			●
Grive draine			●
Grive musicienne			●
Grosbec casse-noyaux			●
Hirondelle de fenêtre			●
Hirondelle de rivage			●



	Possible	Probable	Certain
Hirondelle rustique			●
Hypolaïs polyglotte			●
Linotte mélodieuse			●
Locustelle tachetée		●	
Loriot d'Europe			●
Merle noir			●
Mésange à longue queue			●
Mésange bleue			●
Mésange charbonnière			●
Mésange huppée			●
Mésange nonnette			●
Moineau domestique			●
Moineau friquet		●	
Phragmite des joncs			●
Pie bavarde			●
Pie-grièche à tête rousse			●
Pie-grièche écorcheur			●
Pinson des arbres			●
Pipit des arbres			●
Pipit farlouse	●		
Pouillot de Bonelli		●	
Pouillot siffleur			●
Pouillot véloce			●
Roitelet à triple bandeau			●
Roitelet huppé	●		
Rougegorge philomèle			●
Rougegorge familier			●
Rougequeue à front blanc			●
Rougequeue noir			●
Rousserolle effarvatte			●
Serin cini			●
Sittelle torchepot			●
Tarier pâtre			●
Traquet motteux		●	
Troglodyte mignon			●
Verdier d'Europe			●

Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.



	Août		Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Balazard pêcheur																																								
Bécassine des marais																																								
Bihoreau gris																																								
Bondrée apivore																																								
Busard cendré																																								
Caille des blés																																								
Canard pilet																																								
Canard siffleur																																								
Chevalier aboyeur																																								
Chevalier gambette																																								
Chevalier guignette																																								
Cigogne blanche																																								
Cigogne noire																																								
Circaète Jean-le-blanc																																								
Coucou gris																																								
Engoulevent d'Europe																																								
Faucon émerillon																																								
Faucon hobereau																																								
Grande Aigrette																																								
Grue cendrée																																								
Guépier d'Europe																																								
Guifette moustac																																								
Guifette noire																																								
Héron pourpré																																								
Huppe fasciée																																								
Martinet noir																																								
Milan noir																																								
Milan royal																																								
Édicnème criard																																								
Oie cendrée																																								
Outarde canepetière																																								
Petit Gravelot																																								
Pluvier doré																																								
Sarcelle d'été																																								
Steme pierregarin																																								
Torcol fourmilier																																								
Tourterelle des bois																																								

Tableau III. Présence des non-passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2013 14 août 2014.



	Août		Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Bergeronnette printanière																																								
Bergeronnette de Yarrell																																								
Bruant ortolan																																								
Fauvette des jardins																																								
Fauvette grisette																																								
Gobemouche gris																																								
Gobemouche noir																																								
Gorgebleue à miroir																																								
Grive litoré																																								
Grive mauvis																																								
Hirondelle de fenêtre																																								
Hirondelle de rivage																																								
Hirondelle rustique																																								
Hypolaïs polyglotte																																								
Locustelle tachetée																																								
Loriot d'Europe																																								
Merle à plastron																																								
Phragmite des joncs																																								
Pie-grièche à tête rousse																																								
Pie-grièche écorcheur																																								
Pinson du Nord																																								
Pipit des arbres																																								
Pipit farlouse																																								
Pipit rousseline																																								
Pipit spioncelle																																								
Pouillot de Bonelli																																								
Pouillot fitis																																								
Pouillot siffleur																																								
Rémiz penduline																																								
Rossignol philomèle																																								
Rougequeue à front blanc																																								
Rousserolle effarvate																																								
Tarier des prés																																								
Tarin des aulnes																																								
Traquet motteux																																								

Tableau IV. Présence des passereaux migrants ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2013 - 14 août 2014.