

*La circulaire mensuelle du
Centre Ornithologique
Rhône-Alpes section Ain*

Mai 2011

SOMMAIRE

- 2** Par ici la sortie. Le Val de Saône et ses prairies humides
17/04/11 (B. Fournier)
- 4** Revue de presse (B. Sonnerat)
- 5** Prochaines activités

CORA Ain - Association d'étude et de protection des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens



Par ici la sortie !

Compte-rendu de la sortie Le val de Saône – 17 avril 2011

B. Fournier

Zone d'inondation pour la rivière quand elle décide de quitter son lit. Mais, en ce dimanche d'avril, peu d'eau dans les prés, un sol sec. Barges à queue noire et courlis cendrés seront-ils au rendez-vous ? Il vous faudra patienter encore quelques lignes.

A peine sorti de l'auto, Marc s'attelle à la prise de notes pour l'atlas, un rouge queue à front blanc sur une antenne télé, les chants d'un grimpereau des jardins, du rossignol. Il s'entraîne pour son futur cours avec des élèves un peu particulier. La ballade débute sous un beau ciel bleu et un grand soleil. De marche en pose observatoire, le groupe s'achemine vers la rive gauche de la Saône.

D'abord le long d'une route qui serpente entre prés et bosquets. La température fluctue fortement, air frais à l'abri des arbres, sensations chaudes en plein soleil. Les courlis cendrés donnent de la voix mais sont difficiles à voir. L'air chaud s'élevant au dessus du sol floute l'observation. Puis, certains volent de part et d'autre de la route, se posant dans les herbes hautes pour aussitôt disparaître. Le courlis est le plus grand des limicoles, reconnaissable à son long bec recourbé vers le bas. Des bergeronnettes printanières, virevoltant du fil de fer d'une barrière au béton de la route mettent les nerfs de nos photographes à rude épreuve. André choisit de pointer un piquet, d'autres n'hésitent pas à tenter le suivi de la star, profil droit, gauche, de face, de dos, sur un piquet puis sur le sol. Les appareils chauffent.



Aurons-nous parmi les *Motacilla flava*, tête gris-bleu souligné par un sourcil blanc et poitrine jaune vif pour le mâle, une sous-espèce telle la *M. flavissima* ? Pour ma part, je n'ai vu que des *M. flava*. Une bergeronnette grise s'étant glissé dans le groupe, nous comparons leurs tailles. La bergeronnette printanière est beaucoup plus petite.

Nous observons aussi des tariers des prés, deux espèces de bruants, le bruant proyer, avec sa tache noire sur la poitrine, affectionnant les piquets et le bruant des roseaux, tête, gorge noires, préférant la tige d'un roseau sortant d'un fossé où s'écoulent quelques centimètres d'eau. Trois barges à queue noire en vol nous permettent d'admirer les dessins parcourant les plumes des ailes, une grande barre alaire ainsi qu'un croupion blanc terminé par une queue noire. Puis, un mâle, arborant sa tenue nuptiale, se fait remarquer, perché, attitude caractéristique d'un nicheur potentiel, même si sa zone de nidification est plus nordique.

Nous poursuivons notre chemin vers la Saône, atteignant les prés que nous emprunterons désormais. Vols de geais, de huppés fasciés, un très bel oiseau, une aigrette garzette, une cigogne blanche cerclant, profitant des courants d'air ascendant chaud, un milan noir.

Les locataires des prés (normandes, montbéliardes, chevaux) sont conquis par le savoir et l'entrain de notre animateur. Et c'est avec beaucoup d'attention qu'ils écoutent les commentaires.



Une alouette des champs, dressant les plumes de sa tête, joue à cache cache dans nos jumelles. Des courlis longent les bosquets qui bordent la Saône, l'herbe plus rase permet une meilleure observation. Des dizaines de bergeronnettes printanières volettent de touffes en monticules de terre, quand, soudain, un épervier d'Europe crée un vent de panique, malheureusement pour lui et heureusement pour elles sans conséquence.

La Saône atteinte, une île apparaît, couverte de grands arbres, où se distinguent des nids. Deux jeunes hérons cendrés, un peu ébouriffés, se cachent dans les branchages. Un cygne tuberculé se prélassse, un faucon crécerelle, un goéland leucophée passent.

Mais il faut rentrer, certains s'impatientent, l'estomac donnant des signes de faim, d'autres s'attardent au bord d'un lavoir. Une eau propice aux amphibiens, présence de potamots luisants mais une sortie rendue difficile par les parois abruptes. Benoît plonge son filet plusieurs fois sans succès. Pendant ce temps, un milan noir protégeant son territoire s'en prend à une buse variable. Des attaques aériennes en cascades pour lui, des figures d'évitement pour elle, avec un looping digne de la patrouille de France.

Revue de presse

B. Sonnerat

Impact du Rat noir *Rattus rattus* sur le succès reproducteur du Puffin cendré

Ornis Svecica, 18 (2) 2008: 114-122

En 2006, on a étudié l'impact du Rat noir *Rattus rattus* sur le succès reproducteur du Puffin cendré *Calonectris diomedea*, et ce sur l'île minuscule de Linosa, située entre la Sicile et la côte tunisienne. Pour ce faire, on a marqué du 6 au 10 juin 231 nids en activité, que l'on a de nouveau contrôlés en juillet, septembre et octobre. En juillet, 121 nids seulement contenaient des œufs ou des poussins, dans les 110 autres nids on n'a retrouvé que 4 œufs abandonnés, 1 œuf défoncé, 80 œufs prédatés et 23 poussins victimes des rats. Deux nids étaient encore gardés par les parents, mais le contenu avait disparu. En septembre on n'a plus retrouvé que 91 œufs ou poussins, alors que 30 autres nids avaient été visités par les rats. En octobre la prédation avait arrêté. Le succès de la reproduction n'atteignait que 39% tandis que le Rat noir avait pris 59% des prédatations à son compte. Seulement 2% des pertes étaient d'origine naturelle.



Prochaines activités

Mai 2011

→ Attention : nouvelle sortie au programme !

Samedi 7

A la recherche du pélodyte ponctué en basse vallée de l'Ain. Sortie nocturne (RDV 20h devant l'église de Saint-Vulbas. Prévoir lampe frontale et bottes.

Vendredi 13

Réunion mensuelle. 20h30 Châtillon-sur-Chalaronne

Dimanche 17

La Dombes- limicoles rares en halte migratoire et premières nidifications. RDV 7h30 parc des oiseaux de Villars -les- Dombes

Juin 2011

Vendredi 17

Réunion mensuelle. 20h30 Châtillon-sur-Chalaronne

Dimanche 19

Le Bargy – Col de la Colombière (74) Randonnée pédestre consacrée à la recherche du Gypaète Barbu, Perdrix Bartavelle, Monticole de Roche et Niverolle alpine. Points de RDV, horaires et covoiturages seront précisés dans la circulaire.

→ Attention : nouvelle sortie au programme !

Dimanche 26

A la recherche des serpents en vallée bleue... Nous explorerons les secteurs secs et bien exposés du Bas Bugey, secteurs les plus propices aux reptiles. RDV 8 devant l'église de Montagnieu.

