



Chronique ornithologique de juin 2011 pour le département de l'Ain

par Alain Bernard, CORA 01

Nouvelles données de reproduction des **cygnes tuberculés** (familles toutes différentes de celles signalées en mai) : **Dombes**- 19 familles sur 18 étangs totalisent 89 pulli (de 2 à 8, tous âges confondus ; moy. = 4,68) (mC, pC, aL, bR, bS) ; les plumages notés pour 24 ind. indiquent 15 blancs (=cygnes 'polonais'), 4 bruns et 1 seul gris (pC, aL) -**Val de Saône**- familles de 3 pulli à Feillens (pC) et de 4 à Trévoux (mdC) -**Bresse**- 3 familles totalisent 12 pulli (de 2 à 7, tous âges confondus ; moy. = 4) (mC, pC) -**Plaine de l'Ain**- 1 famille compte 1 pullus à Pérouges (bS) -**Haute vallée de l'Ain**- 3 familles totalisent 14 jeunes (de 3 à 6 ; moy. = 4,66-mC) -**Vallée du Rhône**- 5 familles totalisent 22 pulli (de 2 à 7 ; moy. = 4,4) (aB, pC, sL) ; les 9 ind. dont la couleur a été notée étaient gris (aB, pC). Un couple de **cygnes chanteurs** (*), probablement des attardés de la troupe hivernale, est présent sur un étang de l'est de la Dombes jusqu'au 7 (mB, pC). La situation des **oies cendrées** en Dombes devient confuse : de nouvelles familles sont découvertes à St-André-sur-Vieux-Jonc (effectif non précisé-pC), Versailleux (5 jeunes-mC), Birieux (3 nouvelles familles : 5, 7 et 8 jeunes sur 1 étang qui en avait déjà 2-fD, mC, pC) et à Lapeyrouse (4 familles : 5 et 8 sur 1 étang qui en comptait déjà 2 et 5 et 7 sur 1 autre étang proche-pC, bS) alors que des familles plus précoces commencent à se disperser çà et là. Nous en sommes donc à un minimum local de 18-19 familles pour 2011 qui devient de très loin la meilleure année pour l'espèce en Dombes mais nous sommes encore loin des 35 couples supposés nicheurs (Tiné in De Seynes et al. 2011) ; la fécondité moy. pour l'ensemble de ces familles est de 4,77 jeunes par famille (de 1 à 8, tous âges confondus). Une **bernache du Canada** à Foissiat le 3 (mC) alors que l'habituel ind. de Challex y est observé tout le mois (sL). Les 2 **ouettes d'Egypte** de St-Denis-les-Bourg (v. chronique précédente) sont rejointes par un 3^{ème} ad. à partir du 20. Ailleurs, 2 à St-Germain-sur-Renon le 2 (pC), 2 à St-Paul-de-Varax le 12 (mC, pC) et 2, très bruyantes, le 29 à Versailleux (fB). Stationnement de **tadornes de Belon** tout le mois (mC, pC, mG, gPa, bS) à Birieux où 1 famille née localement est signalée (mB) ; une seconde famille locale (8 pulli) est trouvée sur la réserve de Villars-les-Dombes ; à noter aussi une troupe de 19 ad. en escale le 29 à St-Paul-de-Varax (pC).

Le **canard mandarin** mâle de Sandrans (v. chronique précédente) y est noté jusqu'au 18 (pC) ; 1 ind. à l'Etournel (01/74) le 9 (sL). Deux **canards siffleurs** dont 1 mâle ad. le 4 à St-Paul-de-Varax (fP) : date tardive ! Présence d'1 **canard chipeau** mâle à l'Etournel les 1^{er} et 29 (bP), d'1 mâle à la Vallée bleue (Serrières-de-Briord-01/38) le 4 (pC) ; la bonne surprise vient de Sermoyer (01/71) où 1 famille de 3 jeunes est observée le 18 (bP). Plus classiquement, les premiers pulli dombistes sont notés le 2 à Marlieux (pC) ; dans cette région, 16 familles (mC, pC, aL) totalisent 130 jeunes (de 5 à 13), soit une bonne moyenne de 8,125 (7,99 au 20^{ème} siècle et 6,61 de 2001 à 2010). Six **sarcelles d'hiver** à Birieux le 11 et des obs. régulières en très petits nombres en Dombes ensuite (pC) indiquent probablement le début des mouvements postnuptiaux. Cinquante-quatre familles départementales de **canards colverts** (32 de Dombes-mdC, mC, pC, mK, aL, rP, bS ; 3 de Bresse-pC ; 3 de la Plaine de l'Ain-aB, sL ; 2 de la Haute vallée de l'Ain-mC ; 2 du Bugey-vM, bV ; 3 du haut-Rhône-pC, sL, pRo ; 8 du Pays de Gex-sG, sL, bP, yS, 1 de la vallée de la Valserine à 860 m-sG) totalisent 389 pulli (de 3 à 19 [à Belley], tous âges confondus, moy. = 7,20). Quques **sarcelles d'été** estivant çà et là en Dombes (mC, pC, aL, mfP) avec 1 seule famille observée : 6 pulli de 8-10 j. le 11 à Dompierre-sur-Veyle (bR) ; à retenir aussi la mention d'un couple à Pérouges (Plaine de l'Ain) le 18 (bS). Quques **canards souchets** en Dombes (Birieux, Villars-les-Dombes, Marlieux, Saint-Paul-de-Varax et Condeissiat (mC, pC) avec un maxi. de 9 le 26 à Birieux (pC).

Toujours la présence de **nettes rousses** en Plaine de l'Ain à Priay où, en plus de 11 ad., 4 pulli de 10-15 j. sont observés le 25 (même site qu'en 2010) et à Pérouges (v. chronique précédente) entre le 6 (aB) et le 18 (bS), et en Bresse où 1 ind. est noté à Vescours le 3 (mC) ; la présence estivale est confirmée sur le Haut Rhône avec une belle série d'obs. : 20 le 3 (sL) puis 30 le 19 (pRo) à Cressin-Rochefort ; 4 le 4 à la Vallée bleue (pC) ; une famille de 2 pulli le 18 à l'Etournel (bD), une apparente première historique ici alors que l'espèce se reproduit

depuis une dizaine d'années sur le Rhône genevois tout près de là. A noter aussi une 3^{ème} famille sur le lac de Divonne-les-Bains (bP). Plus classiquement, 33 familles dombistes totalisent 198 pulli (de 2 à 10, tous âges confondus- mC, pC, aL, bR, rR) pour une moy. de 6, nettement supérieure à celle de 5,37 calculée pour la décennie précédente. Rares **fuligules milouins** hors Dombes : 12 ind. à Vescours le 3 (mC), 2 à Bregnier-Cordon le 5, 1 à l'Etournel le 9 (sL) et 5 à Cressin-Rochefort le 19 (pRo) ; 40 familles dombistes totalisent 193 pulli (de 1 à 11, tous âges confondu-mdC, mC, pC, mK, dT), soit une moy. de 4,82, la seconde plus élevée au 21^{ème} siècle et de presque un demi point supérieure (4,389) à celle de la décennie précédente. Qques **fuligules nyrocas** (maxi. de 4 ind. le 18) sont notés hors du site habituel de reproduction de St-Jean-de-Thurigneux (mdC, pC, mK, gM). Premiers pulli (2 familles de 5 et 9 pulli) de **fuligules morillons** le 17 à Birieux (mC) ; 12 familles dombistes (dont au moins 11 sur un seul étang à Birieux) totalisent 59 pulli (de 2 à 9) soit une moy. de 4,91 (mC, pC), la quatrième meilleure valeur au 21^{ème} siècle, assez nettement supérieure à celle (4,47) de la décennie précédente. Toujours un couple d'**eiders à duvet** adultes sur la retenue de Coiselet (01/39) (mC). Des **harles bièvres** notés à Ste-Julie (jusqu'à 18 ad. le 8-ca), Varambon (rR), Brégner-Cordon (2 familles : 2 et 11 pulli-sL), Cressin-Rochefort, Virignin (1 famille : 7 ou 8 pulli-pRo), Collonges (1 famille de 14 pulli-yS), Pougny (au moins 1 famille de 8-10-sL, bP), Challex (1 famille de 2 pulli-sL) et au lac de Divonne-les-Bains (sG).

Des **gélinittes** (dont une famille d'une dizaine de jeunes tout juste capables de voler le 13) sont notées sur 2 communes du Jura gessien (mD, tP). Le **grand téttras** est noté également sur 2 communes du Jura gessien (mD, cFo, bP).

Des **perdris rouges** notées à Chaleins, Rancé (mdC), Meximieux (bS), Mezeriat et Dommartin (pC) sans indice probant de reproduction. Des **cailles** chantant sont notées à Reyrieux, Rancé (mdC), St-Didier-sur-Chalaronne, Vésines, Manziat (fB), Arbigny (bP), St-Julien-sur-Reyssouze (mC), St-Denis-les-Bourg (pC), Varambon (1 chanteur dans le village le 26 !-rR), Ste-Julie (ca), Corcelles (bS, bV), Brénod (pC, bS), Izenave (bS), Challex (bP) et Crozet (sG). Un **faisan vénéré** mâle cantonné à St-Nizier-le-Désert (nouveau site pour l'espèce) à partir du 6 (mC, pC). Deux premiers pulli (les seuls signalés !) de **Faisan de Colchide** le 17 à St-Nizier-le-Désert (bP).

Premiers pulli de **castagneux** le 3 à Civrieux et St-André-de-Corcy (mdC). Hors Dombes, 3 **grèbes à cou noir** le 3 à Malafreraz (pC).



Grèbes à cou noir, Dombes, juin 2011 (© M. Cruzier)

Un-deux **pélicans frisés** ad. originaires du parc ornithologique voisin à Lapeyrouse du 11 au 29 (pC).

Un **butor étoilé** mi-juin à Birieux (info fB). Des **blongios** sont notés sur 9 étangs de 5 communes dombistes (fB, mC, pC, cF, aL, mfP, bS) et sur 3 sites du Pays de Gex (bD, sG, sL, bP). Silence volontaire sur la situation et les effectifs des colonies d'**ardéidés**. Qques mentions de **bihoreaux** (maxi. de 3 le 14) à l'Étournel du 14 (bP) au 29 (1ou 2 juv. volant suggèrent une reproduction locale-sG, bP) ; pour l'anecdote, relevons l'obs. d'un ind. longuement posé en pleine eau et flottant comme un canard le 23 à St-Denis-les-Bourg où le 1^{er} juv. volant est noté le 24 (pC). Reproductions certaines d'un couple de **crabiers** à St-Paul-de-Varax (pC) et sur le parc de Villars-les-Dombes (eB). Premier **garde-bœufs** juv. volant le 16 à St-Denis-les-Bourg (pC). Présence d'**aigrettes garzettes** tout le mois en Plaine de l'Ain (cA, eA, aB, sL, bS), du 1^{er} au 21 sur le Rhône entre Collonges et Challex (bD, sG, sL, bP) avec un maxi. de 13 ind. le 20 à l'Étournel (sL, bP) ; premier juv. volant le 21 à St-Denis-les-Bourg (pC) ; 7 ind. le 26 à Bregnier-Cordon (sL). En Dombes, des **grandes aigrettes** en plumage nuptial sont notées les 2 et 18 à Bouligneux (pC), le 10 au Montellier et à Chtenay (mC) ; ailleurs, 1^{er} oiseau postnuptial le 19 à Montrevel (bP). Rares **hérons pourprés** hors Dombes : 1 à Vescours et 1 à St-Etienne-du-Bois le 3 (mC), 1 à Villette-sur-Ain (aB) et 1 à Beynost (rP) le 7, 2 à St-Denis-les-Bourg le 8 (pC) et 1 à Challex le 18 (sL).

Après que des **cigognes blanches** (allant s'alimenter sur la décharge de la Tienne ?) aient été vus à Viriat entre le 2 (jIC) et le 10 (eA) avec un maxi. de 22 le 3 (mC), un nouveau nid est trouvé sur cette commune le 20 (pC) ; à noter aussi la confirmation de la reproduction dans le Val de Saône où 3 nids sont occupés (pC, bP).

La colonie de **spatules** n'est pas réoccupée cette année malgré des essais infructueux mais l'obs. d'un juv. tout juste volant quémendant sans cesse auprès d'un ad. le 25 à Marlieux suggère pourtant une reproduction locale ; il faut toutefois remarquer qu'un groupe de 8 ind. observé le 26 à Birieux comportait 3 juv. dont 2 avaient été bagués au nid en Camargue, ce qui indique une dispersion postnuptiale très rapide (pC).



Milan noir, l'Étournel, juin 2011 (© B. Piot)

Remarquable troupe de 269 **milans noirs** semblant se diriger vers un dortoir le 24 à St-Denis-les-Bourg (pC). Des **milans royaux**, isolés ou plus rarement par 2, sont vus à Péron (bP), au Petit-Abergement (pC), à Cormaranche-en-Bugey (eA), Thezillieu, St-Rambert-en-Bugey (bV), Druillat (rR), Sandrans (pC), Birieux (rP) et Ambérieux-en-Dombes (xBC) mais sans indice probant de reproduction ; le statut local de l'espèce reste en suspens. Un **vautour fauve** le 12 au Fort-l'Écluse (bP) et 3 le 24 à Divonne-les-Bains (plD). Des **busards des roseaux** sont signalés sur 4 communes du Val de Saône (cA, fB, pC) et 11 de Dombes (mdC, mC, pC, mK, aL, mfP). Toujours de bien rares **busards St-Martin** avec des mentions à Manziat (fB), St-Nizier-le-Bouchoux (bP), Attignat (info vJ), St-Paul-de-Varax (pC), Certines (rR), Château-Gaillard (aB, mC), Châtenay (mC), Bourg-St-Christophe (bS), Villeneuve (aL), Mionnay (cF), Civrieux (mdC).

Cinq jeunes **faucons crecerelles** volant le 18 à Reyrieux (mdC), 1 le 20 à Collonges (bP). Des **faucons hobereaux** sont notés sur 12 communes dombistes (mC, pC, aL, njMZ, gP, rP, mfP, bR, bS), 4 de la Plaine de l'Ain (aB, rR, bS), 2 de Bresse (pC, rR), 4 du Pays de Gex (bD, sL, bP), bien plus sporadiquement ailleurs : Sermoyer (bP) et Grand-Corent. En dehors des sites de reproduction ou de leur proximité, il faut retenir 1 **faucon pèlerin** ad. le 23 à St-Triviers-sur-Moignans (pC).

Premiers pulli de **gallinules poules d'eau** le 3 à Malafretaz et St-Julien-sur-Reyssouze (mC). En dehors des sites classiques de basse altitude (divers observ.), des reproductions de **foulques** sont mentionnée en altitude : 764 m. à Hauteville (bP), 824 m. à Thezillieu (bV), 841 m. à Champdor (pC), 882 m. (pC, sG) et 908 m. (pC) à Brénod. et 900 m. à Mijoux (pC).

Sans exclure des reports de sites suite à des abandons dus à des inondations, env. 151 **échasses** adultes se reproduisent sur 16 étangs dombistes (jB, mC, pC, mG, mK, bP, rP, bS), des nids étant toujours couvés à la fin

du mois ; un couple est présent à l'Étournal les 11 (rL) et 14 (cris du mâle ce jour, comportement inhabituel pour des erratiques-bP).

Des **oedienèmes** sont notés à Civrieux (2 sites), Reyrieux (2 sites), Toussieux, Chaleins (mdC), Ars-sur-Formans (aL), Certines (rR), Ambronay, Château-Gaillard et Chazey-sur-Ain (aB). Assez peu de données sur le **Petit Gravelot** : la nidification certaine est citée de 3 communes dombistes (pC, mG), 1 de Bresse (mC) et 2 du Pays de Gex (mais ces deux dernières ont probablement échoué) (sL, bP) alors que des probabilités sont rencontrées sur 4 communes dombistes (mC, pC, mG), 1 de Bresse (pC), 2 sites d'une commune de la Plaine de l'Ain (cA) et 1 commune du Pays de Gex (pM).



Petit Gravelot, Bresse, juin 2011 (© M. Crouzier)

Deux **combattants** mâles ad. nuptiaux le 25 à Bouligneux (pC) sont les 1^{ers} ind. du passage postnuptial. Des **bécasses** sont entendues à la croûle sur 2 communes du Jura gessien (mC, pC, bP) jusqu'au 4. En dehors des sites habituels du Val de Saône (ymG), des **courlis cendrés** sont notés à Foissiat, St-Jean-sur-Reyssouze, Dommartin, Chanoz-Châtenay, St-Paul-de-Varax, au Plantay (pC), à Sandrans (mC, pC), Bouligneux (mdC, pC, fD, mK, dT), Birieux (pC, mG), St-Maurice-de-Rémens (aB) sans certitude de reproduction sur ces sites, une partie de ces oiseaux étant probablement des erratiques postnuptiaux. Premier **chevalier arlequin** postnuptial, 1 ind. nuptial, le 18 à Sandrans ; suivant le 29 à Birieux (pC). Statut inconnu pour un **chevalier gambette** ad. le 4 à Lapeyrouse (mfP). Dernier **chevalier aboyeur** printanier le 2 à Bouligneux ; la migration s'inverse dès le 13 à Sandrans, toutes les mentions à partir de cette date ne concernant que la Dombes et des ind. isolés (pC). Mentions de **chevaliers culblancs** en petits nombres (maxi. de 13 ind. au Plantay le 25-pC) tout le mois ça et là en plaine (divers observ.). Passage postnuptial de **chevaliers sylvains** à partir du 17 (4 ind. à Versailleux) avec un maxi. de 5 à Birieux le 29 (pC). Déjà un **chevalier guignette** le 18 à Birieux (mK) puis 1, éventuellement un oiseau local) le 26 à Bregnier-Cordon (sL).

Première **mouette rieuse** juv. volant le 11 à Sandrans et déjà 32 ind. en dispersion postnuptiale le 13 à St-Denis-les-Bourg ; qqes pulli encore très loin de l'envol le 30 au Plantay (pC). La reproduction du **goéland leucophée** n'est démontrée qu'à l'Étournal (3 pulli-bP, sG).

Belle série de mentions de **sternes pierregarins**, peut-être déjà en erratisme postnuptial : 2 ad. au Plantay le 3 ; 3 ad. à Lapeyrouse le 4 ; 1 ad. à Ste-Olive (fP) et 1 ad. à Marlieux le 6 ; 1 ind. à Birieux le 7 (gB) ; 1 ad. à Sandrans le 11 (pC) ; 1 ind. à Collonges le 12 (sG) et 1 à l'Étournal le 21 (bP). Au moins 2 des 4 colonies dombistes de **guifettes moustacs** pâtissent des inondations, une étant même totalement abandonnée. Le total constaté ce mois est donc de 135-155 nids en 3 colonies (pC, fD, mK, bS), le plus faible constaté ces trois dernières décennies ! A noter aussi la mention de 12 ind. le 3 à Vescours (mC). Deux **guifettes noires** le 2 à Sandrans (pC) puis présence de 2 à 4 ad. selon les jours, apparemment attirés par la colonie de **moustacs**, à Lapeyrouse du 6 (pC, mfP, bS) au 13 (pC).



Bien rares **pigeons colombins**, l'espèce n'étant notée qu'à Lapeyrouse (2 sites-pC, fD), Birieux (rP), Joyeux (pC), Ambronay (aB) et Ferney-Voltaire (2 sites-sG, bP). Des **pigeons ramiers** chanteurs sont notés jusqu'à l'altitude de 1425 m à Gex et 1435 m. à Péron (bP).

Un **coucou-geai** (*) de 2^{ème} année le 6 à Lapeyrouse (pC). Un **coucou gris** fem. de morphé roux le 4 à Jayat (mC) ; 1 chanteur en zone pavillonnaire le 14 à Château-Gaillard (aB).

Coucou-geai, Lapeyrouse, 6 juin 2011 (© P. Crouzier)

L'**Effraie** est toujours aussi rare et ne fournit des mentions qu'à Reyrieux (mdC), Replonges, Vésines, St-Didier d'Aussiat, Bereziat et St-Paul-de-Varax (pC).

Un **petit-duc** chanteur en Valbonne le 6 (aB). Des **grands-ducs** sont seulement notés sur 3 communes du Bas Bugey (pC, bS), 1 du Bugey (dP, bS) et 1 du Haut Rhône ; 1 juv. volant déjà bien le 12 (bS) ; à noter surtout le 1^{er} cas de reproduction en Dombes des étangs (info bC) sur un site tenu secret. Encore 1 chant de **Chevêchette** le 12 sur 1 site tenu secret (mD). Des **chevêches** sont notés sur 1 commune de la Plaine de l'Ain (aB), 5 de Dombes (pC, aL, bR rR, dT), 2 de Bresse (pC), 1 du Revermont (jIC), 1 du Bugey (868 m) (pC), 1 du Haut Rhône (cP) et 2 du Pays de Gex (bP). La reproduction de **moyens-ducs** est démontrée sur 1 commune du Val de Saône (mdC), 2 de Dombes (fB, bS), 6 de Bresse (pC, gM), 1 de la Plaine de l'Ain (bS) et 3 du Pays de Gex (bP).

Aux 9 communes occupées par des **engoulevents** en mai (v. chronique précédente), il faut ajouter en juin : Sault-Brenaz (bS), Priay (aB), Treffort-Cuisiat, Bolozon, Corveissiat et, de manière plus surprenante, Lent (1 chanteur le 3) (rL), en Dombes où l'espèce demeure quasi exceptionnelle.

Comme en 2010, un nid de **martinet noir** est situé à un peu moins de 4,5 m. en gare d'Ambérieu-en-Bugey. Observations insolites d'1 **martinet à ventre blanc** le 6 à Chazey-sur-Ain (aB) et surtout d'1 groupe dans le secteur Varambon-Priay du début du mois au 19 (maxi. de 10 ce jour) (rR) ; cela annonce-t-il une tentative d'occupation des bâtiments, encore inconnue dans l'Ain alors que c'est le cas depuis un certain temps dans le Rhône ?

Les citations de **martins-pêcheurs** deviennent régulières dès le début du mois (divers observ.), suggérant le début de la dispersion postnuptiale ; toujours un nid occupé à l'Etournel le 29 (bP). Env. 10 **guêpiers** à St-Vulbas le 14 (aB) et 1 à Arbigny (v. chronique précédente) le 18 (bP) suggèrent des implantations proches. Des **huppes** cantonnées à Relevant (dT), St-Paul-de-Varax, Chânoz-Châtenay, Condeissiat St-Denis-les-Bourg, Jayat, (pC), Feillens (cA), Arbigny (bP) et St-Bénigne (eA).

Des **torcols** cantonnés sont notés à Drom (bS), Coligny (mC), Seillonaz (pRo), Aranc (pC), Thezillieu (bV) et Songieu (eGi). Toujours de jeunes **pics épéiches** nourris au nid le 7 à Challex (bP). Des **pics tridactyles** (*) sont observés sur 4 sites de 2 communes du Jura gessien (divers observ.) avec des envols les 21 et 22 pour 2 jeunes d'un des couples (mDu, gP).

En dehors des 9 communes citées en mai (v. chronique précédente), des **alouettes lulus** sont observées à Seillonnaz, Innimond (pRo), Thezillieu (sG, bV), Priay (1 le 11 : seule mention du printemps en Plaine de l'Ain !) (bS), Boyeux-St-Jérôme (pC), Drom (bS) et Thoiry (bP).

Premières **hirondelles de rivage** erratiques le 11 : 80 à Birieux (pC) et 5 à Villette-sur-Ain (bS) ; nouvelles colonies trouvées à Arbigny (env. 60 ind.-bP) et Hautecourt (env. 20 'trous'-pC). Des **hirondelles rustiques** potentiellement nicheuses sont notées jusqu'à l'altitude de 915 m. à Mijoux (mC, sG) contre 1061 m. à Mijoux (sG) et 1157 m. à Belleydoux (sL) pour l'**hirondelle de fenêtre**.

Deux **pipits des arbres** chanteurs à 1690 m. dans le canyon (1690 m.) du Crêt de la Neige à Thoiry le 15 (bP). Trois mentions de **pipits farlouses** : 1 à Anglefort le 3 (sL) ; 1 famille d'au moins 1 juv. le 15 à Thoiry (mBu, bP) amène un des rares cas démontrés de reproduction de l'espèce dans l'Ain ; 1 ind. paradant le 19 à Brénod (bS), sur le même site qu'en mai (v. chronique précédente). Des **pipits spioncelles** sont mentionnés de 4 communes du Jura gessien (bC, bP, yS) et 1 du Massif du Grand Colombier (mD, cG). Deux mentions de **bergeronnettes printanières** en Plaine de l'Ain où elles ne se reproduisent pas : 1 le 7 à Meximieux (bS) et 1 le 10 à Charnoz (aB) ; ailleurs, l'espèce est notée sur 7 communes du Val de Saône (cA, mdC, bP) et 11 de Dombes (xBC, mdC, mC, pC, aL) ; 1 chanteur du type B. printanière de l'Est (*cinereocapilla x flava*) est noté à Lapeyrouse le 18 (pC). Une **bergeronnette des ruisseaux** juv. volant le 20 à l'Etournel (bP) est la première en erratisme postnuptial.

Le nouveau record d'altitude de l'année pour le **rossignol** est de 635 m. à Lompnas le 19 (pRo). Une famille de **rougequeue noirs** au canyon du Crêt de la Neige à Thoiry le 15 (bP). Des **rougequeue à front blanc** chanteurs sont notés à 959 m. à Lalleysriat et 1037 au Grand-Abergement le 4 (sG). La distribution du **traquet motteux** est très proche de celle du pipit spioncelle : 3 communes du Jura gessien (bC, tP, bP) et 1 du Massif du Grand Colombier (pRo).



Traquet motteux, Jura gessien, juin 2011 (© T. Petit)

Encore 1 **monticole de roche** chanteur le 15 sur le Jura gessien. Un **merle à plastron** jusqu'au sommet du Crêt de la Neige (1720 m.) les 15 (bP) et 19 (tP). Des **grives litornes** aux comportements d'oiseaux nicheurs sont (enfin !) découvertes sur 2 communes de la vallée de la Valserine (mC, pC, sG) alors que l'obs. de 2 ind. le 26 sur le Jura gessien (sG) sera suivie en juillet (v. chronique suivante) de celle d'une famille. En dehors des sites classiques du relief (divers observ.) (jusqu'au canyon du Crêt de la Neige le 15-bP) et de Dombes (mdC, pC), l'obs. d'1 **grive draine** à Blyes le 14 (aB) amène la 1^{ère} mention de l'espèce en période de reproduction en Plaine de l'Ain.

Deuxième mois sans **bouscarle** : les qqes obs. d'avril n'auront été qu'un feu de paille ! Une **cisticole** le 6 à St-Germain-sur-Renon (pC). Des **locustelles tachetées** cantonnées sont notées sur 8 communes dombistes (pC, mK, mfP), 3 du Val de Saône (cA, pC, bP) et à Béon (mD). Extrême rareté des **locustelles luscinioides** qui ne sont plus entendues que sur 2 étangs dombistes, à Villars-les-Dombes et Condeissiat (pC) ; pour qui sonne le glas ? Deux seuls **phragmites des joncs** chanteurs hors Dombes : 1 à Vescours le 3 (mC) et 1 à Manziat le 24 (cA). Des **rousserolles verderolles** sont notées à Divonne-les-Bains (sG), Lelex (mC, pC), Mijoux (mC, pC, sG), Grilly, St-Genis-Pouilly (bP), aux Neyrolles (sG), à Béon (mD), Hauteville-Lompnes (bP), Cormaranche-en-Bugey (mG, bP), au Petit-Abergement, à Brénod (pC, bP, bS), Champdor et Aranc (pC). En dehors de chanteurs isolés à Brénod (882 m.) le 4 (pC) et au Petit-Abergement (959 m.) le 18, toutes les mentions de **rousserolles effarvattes** sont effectuées à des cotes inférieures à 500 m. L'**hypolaïs polyglotte** atteint les altitudes de 841 et 865 m. sur 2 sites de Brénod le 19 (bS), tous les autres sites se situant à moins de 700 m. La **Fauvette grisette** pulvérise son record de mai (v. chronique précédente) avec des territoires occupés à 958, 1007 et 1023 m. à Innimond (pC) alors que la **fauvette à tête noire** progresse un peu, atteignant le canyon du Crêt de la Neige le 15 (bP). Des **pouillots de Bonelli** sont notés sur 20 communes du relief (divers observ.), jusqu'aux alentours de 1650 m. sous le Crêt de la Neige le 15 (bP). Les **pouillots siffleurs** sont toujours étonnamment rares, notés seulement sur 7 communes : St-Jean-le-Vieux (nG), Ceignes (bS), Anglefort (pRo), Champfromier (sG), Challex, Thoiry (bP) et Gex où la reproduction est constatée à l'altitude de 1420 m. (yS). Un **pouillot vélocé** chanteur au Crêt de la Neige le 15 (bP). Les **pouillots fitis** sont devenus bien rares à l'ouest du relief : 1 chanteur le 11 à Château-Gaillard (bS) et le 18 à Arbigny (bP), nid occupé le 19 à St-Jean-de-Thurigneux (mdC) ; c'est bien peu ! Deux **roitelets huppés** construisant un nid le 9 à Varambon (rR) sont les seuls observés à l'ouest du relief.

La répartition du **gobemouche gris** est toujours aussi lacunaire puisque il est cité de seulement 18 communes de Birieux à Gex dont 16 nouvelles en comparaison avec mai.

Vingt-trois groupes familiaux (de 3 à 20 ind. !) de **mésanges à longue queue** (divers observ.) comptent en moyenne 8,04 ind.

Une **mésange nonnette** chantant le 15 à Thoiry (bP) est observée à l'altitude remarquable pour l'espèce de 1240 m., 'seulement' 200 m. plus bas que la plus haute des **boréales** signalée à 1440 m. à Gex (pC) alors que la **mésange huppée** est notée jusqu'au canyon du Crêt de la Neige le 15. Nidification rupestre d'un couple de **mésanges noires** à Thoiry où l'espèce atteint l'altitude de 1575 m. Curieusement, les **Mésanges bleue** (1475 m. à Péron) et **charbonnière** (1580 m. à Thoiry) atteignent des altitudes très comparables à celles obtenues pour les espèces plus liées aux résineux (bP).

Ce mois, le **grimpeur des bois** a une amplitude altitudinale située entre 802 et 1440 m à Gex-cFo, bP) alors que celle du **grimpeur des jardins** varie entre 170 m. à St-Bernard (mdC) et 777 m. à Leaz (sG), sauf 1 chanteur à 1018 m. à Giron le 13 (sL).

Le **loriot**, quant à lui, confirme son 'aversion' pour l'altitude en ne dépassant que rarement celle de 450 m., aucune observation n'ayant été effectuée à plus de 500 m.

L'année ne semble pas bonne pour la **pie-grièche écorcheur** ; le nombre et la densité d'oiseaux cantonnés ne semble pas très élevés (divers observ.) ; ainsi, seuls deux couples sont recensés en Plaine de l'Ain (aB) qui n'a certes jamais été un bastion de l'espèce. La reproduction paraît bien tardive et aucune famille n'est signalée en juin.

Reproduction probable de la **pie** à 900 m. env. à Mijoux (pC). Des **cassenoix** sont notés à Culoz (cG), au Poizat, à Champfromier (sG), à Thoiry (Crêt de la Neige) (mBu, bP), à Vesancy (mC, pC) et à Gex (sL). Deux **corbeaux freux** le 9 à Thoiry et 3 le 22 à Preveissin-Moëns (bP) sont probablement des erratiques postnuptiaux mais des ind. encore sur la colonie à Bouligneux et au Plantay (pC) et tout juste volant à Coligny (mC) sont notés le 30. Une **corneille noire** leucique le 29 à Versailleux (fB). Une **corneille mantelée** pure, visiblement appariée à une c. noire les 5 et 9 à Foissiat (pC) et 1 ad. pure le 23 à St-Rambert-en-Bugey (cF).

Le **moineau friquet** demeure bien peu répandu ; il n'est cité que de 7 communes dombistes (mC, pC, aL, rR), 8 de Bresse (mC, pC, bR), 3 du Revermont (mC, pC), 5 du Pays de Gex (jC, bD, bP), très rarement ailleurs : St-Maurice-de-Rémens (1 seul ind. ! aB) et Ceyzérieu (mD).

Des **venturons montagnards** sont notés sur 4 communes du Jura gessien (cFo, bP, tP). Mention 'classique' d'un **tarin** à Gex le 2 ; bien plus curieuse, car sur un site inhabituel, est celle d'1 ind. le 20 à Innimond (pC). Ce mois encore (v. chronique précédente), des **linottes** ne sont citées que du relief ou du Pays de Gex (divers observ.). Une famille de **bouvreuils** à Dommartin le 5 (pC), la seule signalée en plaine. Sept puis 1 **grossbecs** à Birieux les 2 (bS) et 25 (pC) sont les seuls à l'ouest du département.

Un **bruant jaune** chanteur atteint l'altitude de 1159 m. à Billiat le 11 (sL). Des **bruants fous** ne sont observés qu'à Boyeux-St-Jérôme (pC), Oncieu (nG) et Champfromier (sG). En dehors des sites classiques du Val de Saône (cA, fB, pC, bP), un **bruant proyer** est à nouveau noté à Aranc le 4 (pC).

Liste des observateurs

cA = C. d'ADAMO, eA = E. AMOR (CREN), mB = M. BENMERGUI, aB = A. BERNARD, jB = J. BERNIER, xBC = X. BIROT-COLOMB, gB = G. BROUARD, mBu = M. BUENO, fB = F. BULLIFFON, eB = E. BUREAU, jIC = J.L. CATHALA, bC = B. CASTANIER, mdC = M. des CHÂTELLIERS, jC = J. CHOLET, bC = B. COTTE, CREN = Conservatoire Régional des Espaces Naturels, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, pID = P.L. DALBAN, fD = F. DOMENJOUR, mD = M. DUCRUET, bD = B. DUPONT, mDu = M. DURAFFOURG, cFo = C. FOSSERAT, cF = C. FREGAT, sG = S. GARDIEN, cG = C. GIACOMO, eGi = E. GIRAUDOT, nG = N. GORIUS, mG = M. GUINET, vJ = V. JOUNIOT, mK = M. KERDRAON, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, rL = R. LETSCHER, pM = P. MARTIN, vM = V. MOLINIER, njMZ = N. & J. MORENO-ZORZI, gM = G. MURTI, gPa = G. PAUCHER, tP = T. PETIT, bP = B. PIOT, dP = D. POMMIER, gP = G. PONTIUS, rP = R. POULET, mfP = M. & F. POUMARAT, cP = C. PREVOST, bR = B.

RAFFIN, pRo = P. ROCHAS, rR = R. RUFER, yS = Y. SCHMIDT, bS = B. SONNERAT, dT = D. TISSIER, bV = B. VINCENT.

Abréviations

Ad = adulte(s), env. = environ, fem. = femelle(s), ind. = individu(s), info = information recueillie par, j. = jours, juv. = juvénile(s), m. = mètres, maxi = maximum, moy. = moyenne, obs. = observation(s), observ. = observateurs, pullus, pulli = poussin (s), qqes = quelques, St(e) = Saint(e), v. = voir.
(*) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale.

Bibliographie

SEYNES (de) A. & les coordinateurs –espèce (2011). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2010. *Ornithos* 18 (3) : 145-181.



Fauvette à tête noire, Collonges, juin 2011 (© B. Dupont)