


Résultats de la Dombes

Un automne très doux et un début d'hiver bien peu rigoureux avec une migration peu perceptible laissaient mal augurer du nombre d'Anatidés présents en Dombes mi-janvier 2012. C'est toutefois moins mal qu'on ne le craignait et il faut parler d'une année moyenne en Dombes ! Le total de 20 205 Anatidés est le 12ème plus élevé depuis 1975 et la situation des espèces reflète assez bien ce sentiment de moyenne. En effet, si deux espèces sont à leur maximum local depuis 1975, l'Oie cendrée avec 404 individus (précédent : 278 en 2009) et le Pilet avec 263 oiseaux (204 en 2007), les autres Anatidés se situent entre leur 5ème meilleure année (Chipeau, Siffleur, Sarcelle d'hiver, Nette, Nyroca) et seulement la 22ème (Souchet). Pour l'anecdote, on retiendra le nombre record d'espèces d'Anatidés (19) mais seulement 16 ont une origine sauvage. Le Cygne noir, l'Oie à tête barrée et les Oies cygnoïdes apportent une touche d'exotisme qui peut s'avérer inquiétante à terme.



Fuligules milouins (photo Marc Crouzier)

La douceur de l'hiver explique sans doute les effectifs records du Grèbe castagneux (17 contre 13 en 2003), du Bihoreau gris (52 contre 31 en 2007 et 2011) et de la Grande Aigrette (757 contre 678 en 2008) et la bonne présence du Grand Cormoran (1 026 individus, la 3ème meilleure année) mais, paradoxalement, des espèces voisines ne sont pas aussi bien représentées avec par exemple seulement la 7ème meilleure année du Héron cendré, la 9ème du Grèbe huppé, la 13ème du Garde-bœufs ou de la Foulque. On retiendra aussi la remontée des effectifs d'aigrettes garzettes qui chutaient depuis 2008

[Consulter les résultats détaillés de la Dombes](#)



Cygnets de Bewick (photo Marc Crouzier)

