



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4^e trimestre 2008

- Octobre-Novembre-Décembre -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ, E. GUILLOU,
B. MARCHADOUR, G. MOURGAUD, R. PROVOST

PRÉAMBULE

Après l'arrêt des chroniques saisonnières - dernière parution dans le *Crex 9*, Beaudoin *et al.*, 2006 - un petit groupe d'observateurs a eu l'envie de remettre en place un comité de rédaction afin de publier à nouveau une synthèse des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire. Les données transmises par les différents ornithologues seront analysées sur un pas de temps trimestriel et les synthèses seront consultables sur le site Internet de la LPO Anjou et également téléchargeables.

ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD ? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.lpo.fr/homologation/>)

H1, H2... : oiseau de 1^{er} hiver, 2^e hiver...

Ind. : individu.

Juv. : juvénile.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Octobre : globalement bien ensoleillé mais plutôt frais, les températures maximales restant en moyenne inférieures aux normales saisonnières. Outre des épisodes pluvieux réguliers de faible ampleur, la fin de mois est perturbée et le département subit le passage de forts vents d'ouest accompagnés de précipitations.

Remarque : vidange de l'étang de Chevigné le 31 octobre.



www.lpo.fr

Novembre : plutôt doux, hormis en fin de mois, mais connaît de nombreuses perturbations instables accompagnées de précipitations régulières et de vent. Des pluies abondantes en début de mois provoquent une crue de la Loire et de la Maine aux alentours du 7 (Loire jusqu'à 3,5 m). Après une nette décrue, une nouvelle montée des eaux a lieu le 28.

Décembre : assez froid, première quinzaine avec des minimales n'excédant pas -3/-4°C, puis courte période de redoux avant un nouveau coup de froid à partir du 24. Les niveaux d'eau sur les BVA restent élevés tout le mois.

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Oie cendrée *Anser anser* : début des passages noté dans la première quinzaine d'octobre avec quelques petites troupes (≤ 60 ind.) puis très forte augmentation des observations à la fin du mois et surtout dans le courant du mois de novembre. Minimum 7 900 Oies cendrées ont transité par le département au cours du mois de novembre avec un pic le 17.11, où env. 6 400 ind. ont été notés.

Bernache cravant *Branta bernicla* : 1 du 7 au 24.11 au lac du Verdon et également 1 le 22.11 à Cheigné.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : nombreuses données à partir de novembre sur 8 sites différents, avec en particulier 2 belles troupes, 11 à Cheigné le 22.11 et 12 au lac du Verdon le 23.11.

Canard siffleur *Anas penelope* : arrivée à partir de la mi-novembre, 440 le 19.11, 185 le 28.11, 215 le 4.12, 280 le 10.12, 745 le 17.12, > 965 le 29.12 sur l'île Saint-Aubin, 86 le 15.12 au lac du Verdon.

Canard chipeau *Anas strepera* : arrivée à partir de la mi-novembre, stationnement important sur l'île Saint-Aubin en raison d'un niveau d'eau favorable et sans doute aussi en raison d'une vague de froid plus au nord ; des échanges ayant très probablement lieu entre ce site et le lac de Maine, maximum de 297 le 19.11 sur l'île Saint-Aubin (effectif record pour le département), > 279 le 25.12 au lac de Maine (record pour le site).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : faible effectif jusqu'à fin novembre, 50 le 23.11 au lac du Verdon, 60 le 4.12, 140 le 10.12, 260 le 17.12 et 620 le 29.12 sur l'île Saint-Aubin.

Canard pilet *Anas acuta* : très peu d'oiseaux notés avant décembre, 50 le 10.12, 105 le 17.12 et 174 le 29.12 sur l'île Saint-Aubin.

Canard souchet *Anas clypeata* : 40 le 11.11 aux gravières de Bré, 63 le 19.11 sur l'île Saint-Aubin, 80 le 23.11 au Verdon et 116 le 4.12, 175 le 17.12, 160 le 29.12 sur l'île Saint-Aubin.

Nette rousse *Netta rufina** : 1 femelle du 4 au 10.10 à la carrière Ragonneau (CHD?), 1 mâle le 11.11 aux Monteaux (CHD?).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : 120 le 4.10 à la carrière Ragonneau, 80 le 10.10 à l'étang de Beaurepaire, 90 le 11.11 aux Monteaux, 150 le 28.11 à l'étang de Péronne, 131 le 28.11 au lac de Maine, 115 le 17.12, 199 le 23.12, 225 le 29.12 au



www.lpo.fr

Pré de l'Abbesse, 185 le 29.12 à l'étang de Péronne. Contrôles de 12 oiseaux marqués en France.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : 1 mâle le 4.11 à la carrière Ragonneau (CHD+), 1 mâle les 6-7.11 puis les 23-26-27-29.11 à l'étang des Hayes (CHD+), 1 mâle vu régulièrement (mais absent certains jours) entre le 14.12 et la fin du mois aux Monteaux (CHD+) (le même individu qui circule entre ces sites ?).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : noté toujours en petit nombre sur divers plans d'eau, les effectifs augmentent un peu à partir de décembre, 15 le 8.12 au lac de Maine, 13 le 24.12 à la carrière Ragonneau. Contrôle d'un oiseau marqué en France.

Fuligule milouinan *Aythya marila** : 1 couple du 8 au 14.12 au lac de Maine revu le 23.12 (CHD?), 1 femelle à partir du 24.12 et sans doute présente jusqu'à la fin du mois à la carrière Ragonneau (CHD±).

Macreuse brune *Melanitta fusca** : 1 femelle/immature du 24.11 au 8.12 au lac de Maine (CHD+).



Harle piette *Mergellus albellus* : 1 femelle/immature le 23.12 à la carrière Ragonneau.

Harle huppé *Mergus serrator** : 1 femelle/immature le 18.11 à l'étang de Péronne (CHD?), 2 femelles/immatures les 27-28.11 sur la Loire aux Rosiers-sur-Loire (CHD+).

Harle bièvre *Mergus merganser* : 2 femelles le 9.12 au lac du Verdon, 1 femelle le 13.12 aux gravières des Bretonnières, 2 femelles le 15.12 à l'étang des Noues et au lac du Verdon (les mêmes ?), 3 femelles du 25 au 30.12 au lac du Verdon.

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis** : 2 le 6.10, 1 les 14-16.10 puis de nouveau 2 le 22.10 à l'étang Chevigné (CHD?), 3 le 10.10 à l'étang de Beaurepaire (CHD ?).

Podicipédidés

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : beau rassemblement à l'étang des Hayes au cours du mois d'octobre et novembre avec un effectif maximum de 50-60 ind. du 10 au 17.10 ; 33 le 26.10 à Chevigné.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : 75 le 28.12 au lac du Verdon. Seulement 150 le 29.11 au lac de Maine, loin du record du 24.12.07 de 596 individus.



www.lpo.fr

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 1 le 5.10 aux Monteaux puis 1 le 8.10 à proximité, à la carrière Ragonneau (même individu ?), le lac de Maine en accueille quant à lui 2 le 7.10 puis 1 le 3.11.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : 660 posés sur une grève en Loire aval le 8.10 et un vol de 800 le 23.10 à Savennières. Contrôles de 14 oiseaux bagués en provenance de France (5), Danemark (3), Hollande (3), Angleterre (1), Belgique (1) et Norvège (1).

Ardéidés

Butor étoilé *Botaurus stellaris** : d'abord 1 individu le 12.10 (CHD+) à Chevigné puis 2 les 13-14.10 (CHD ?).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : 3 dortoirs notables, un à l'étang des Noues avec 146 ind. le 15.12, un à l'étang de la Thévinière avec 200 le 7.11, l'autre au lac de Maine où près de 500 ind. sont fréquemment dénombrés en début de période (lors d'un comptage fin septembre il était possible d'envisager 700 ind.).

Grande aigrette *Casmerodius albus* : de beaux rassemblements sur 3 sites en particulier, jusqu'à 24 aux gravières de Bré le 5.10, 26 à l'étang des Hayes le 26.12 et 44 à Chevigné le 29.10. Contrôle de 13 oiseaux bagués en provenance du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique).

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : données tardives avec 3 en vol le 19.10 à Chênehutte-Trèves-Cunault puis 1 le 6.11* à Saint-Hilaire-Saint-Florent (CHD ?). Auparavant l'observation la plus tardive datait du 21.10.94 avec 1 juvénile (Beaudoin *et al.*, 1998).

Threskiornithidés

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : plusieurs données en Loire amont ainsi qu'au lac du Verdon et Ribou en octobre et novembre. Données tardives pour le département avec 1 immature les 11-12.11 aux Monteaux, puis 1 le 2, 11 et 14.12 à Chevigné.

Accipitridés

Milan royal *Milvus milvus* : 1 le 18.10 à Villedieu-la-Blouère, 1 le 21.11 en forêt de Bécon, 1 le 6.12 à Châtelais, 1 le 18.12 à l'étang de Péronne.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : 1 juv. le 13.9 aux coteaux du Pont-Barré, dernière mention de l'espèce.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 1 à Luigné le 9.10, 1 à l'étang de Beaurepaire le 10.10, 1 à Saint-Rémy-la-Varenne le 18.10, 2 juv. le 19.10 à Fontevraud, 1 aux gravières des Bretonnières le 23.11.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : seulement 4 mâles et 1 femelle/immature le 19.10 à Fontevraud, sur un site qui a pu accueillir jusqu'à 70 individus l'année



dernière (11.2007) les effectifs cette année sont particulièrement bas, faute de campagnols.

Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : 5 ou 6 ind. entre La Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire et 3 à Parnay le 18.9, dernière observation le 19.11 sur la Tau.

Falconidés

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 1 femelle baguée, retrouvée morte le 29.12 à St-Jean-des-Mauvrets, originaire d'Allemagne.

Faucon émerillon *Falco columbarius* : une première donnée précoce d'un individu les 20-21.09 à Saint-Mathurin-sur-Loire (CHD+), 1 à Chevigné le 12.10, 3 le 19.10 à Fontevraud, 1 le 19.10 au coteau Blanc, 1 le 25.10 à Blou, 1 mâle le 15.12 près de Mouliherne.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : le dernier individu a été observé le 12.10 puis le 14.10 à Chevigné.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* :

1 le 9.10 à la Bohalle, 1 le 4.11 à Montfort, 1 le 16.11 à Chevigné, 1 le 17.11 à Doué-la-Fontaine. Le 19.11 première mention d'un individu sur la cathédrale Saint-Maurice à Angers, cet oiseau a été observé à de nombreuses reprises et était toujours présent le 30.12. L'oiseau porte une bague métal au tarse droit non lue jusqu'à présent. L'origine de cet oiseau reste



inconnue, le plumage de cet individu adulte laisse en effet planer quelques doutes sur la sous-espèce à laquelle il appartiendrait (*peregrinus/calidus*). 1 ad. le 28.11, sur l'île Saint-Aubin, observé jusqu'au 14.12 (le 7.12, 2 ind. sont observés, probablement 1 mâle et 1 femelle), 1 le 1.12, à Chevigné, 1 le 7.12 à Toutlemonde, 1 le 12.12 à Chalonnes-sur-Loire. 1 ind. H1 observé et photographié le 11.12 à Saint-Germain-des-Prés.

Rallidés

Râle d'eau *Rallus aquaticus* : 1 entendu à Chevigné les 13-14.10, 3 entendus le 17.11 à l'étang des Hayes, 1 le 19.11 à l'observatoire d'Écouflant, 2 le 6.12 aux Trinottières. À l'étang de Joreau, 1 vu le 13.10 et 1 entendu le 2.12.

Gruidés

Grue cendrée *Grus grus* : passage en limite de département le 3.11, avec 10 en vol au-dessus du lac de Rillé.



www.lpo.fr

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : pas d'observation au cours de la période, dernière observation le 19.9 d'un groupe de 6 ind. sur la butte de Douvy. Cette date de départ paraît précoce, en 2007 un groupe était toujours présent sur une réserve de chasse le 29.9 en Vienne. L'effectif maximal atteint lors des rassemblements postnuptiaux était de 41 individus le 28.7.08.

Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 2 le 7.10 puis 1 jusqu'au 9.10 à La Bohalle.

Récurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : le classique passage de novembre commence avec 2 le 28.10 au lac de Maine, 7 le 17.11 aux Rosiers-sur-Loire, 1 le 18.11 sur l'île Saint-Aubin, bel afflux le 22.11 avec 104 signalées (4 aux Monteaux, 21 aux Bretonnières, 54 à Montsoreau, 17 + 8 aux Rosiers-sur-Loire) et encore 30 le 23.11 (14 au Verdon, 2 sur l'île Saint-Aubin, 9 aux Bretonnières, 5 à Chevigné), 2 le 26.11, 14 le 10.12 aux Rosiers-sur-Loire et dernières (4) le 23.12 à Chevigné.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* : sur le site classique de Ville-Trouvée/Bouchemaine : 76 le 19.10 mais seulement 26 le 27.10, 53 le 30.10, 32 le 23.11, 5 le 4.12 puis plus rien par la suite. À Douvy, rassemblement tout le mois d'octobre avec encore 80-100 le 26.10. 70-80 à Montfort le 4.11.

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : derniers signalés le 18.10 en Loire amont.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : sur la Loire 4 + 7 le 7.10.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 3 le 4.10 à Saint-Rémy-la-Varenne, 1 à La Bohalle les 7-13.10.

Scolopacidés

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 le 7.10 à La Ménitrie, 1 le 23.11* (date record, auparavant le 19.10.88, CHD +) à Chevigné (étang vidé).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : à la faveur de la vidange de l'étang (pêché le 31.10), 1 le 31.10 à Chevigné.

Bécasseau minute *Calidris minuta* : 5 à Saint-Rémy-la-Varenne, 6 au Thoureil le 4.10, 4 le 2.11 à Chevigné.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 1 le 4.10 au Thoureil.

Bécasseau variable *Calidris alpina* : à la faveur de la vidange de l'étang (pêché le 31.10), présence du 31.10 au 15.12 (avec un maximum de 37 le 31.10) à Chevigné.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 1 les 16-17.11 à Chevigné, 5 le 18.11 sur l'île Saint-Aubin.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 le 30.12 à Chalonnes-sur-Loire.



www.lpo.fr

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : à la faveur de la vidange de l'étang (pêché le 31.10), présence du 6 au 23.11 (avec un maximum de 69 le 18.11) à Chevigné ; à signaler aussi, à la faveur des inondations : ≥ 200 le 5.12 à l'embouchure du Layon à Chalonnes-sur-Loire.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : 1 le 15.11 à Bré, 1 le 12.12 à Gennes et 1 le 14.12 à Boudré.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : à la faveur de la vidange de l'étang (pêché le 31.10), 7 le 31.10 à Chevigné.

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : quelques individus s'attardent sur la Loire à l'automne : 1 H1 le 26.10 à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1 ad. le 28.11 aux Rosiers-sur-Loire. 1 H1 vu les 4-17.11 et 14.12 est un possible candidat à l'hivernage au lac de Maine.

Mouette pygmée *Larus minutus* : le lac de Maine fournit la plupart des données avec 1 ad. le 4.10 et le 8.10, 1 H2 le 4.10 puis 1 H1 les 3-6-8 et 9.10. En novembre, le lac de Maine accueille à nouveau 1 H1 le 3.11. Enfin 3 ad. sont observés le 7.11 au lac du Verdon suivis d'un H1 et 1 ad. le 4.12.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : le comptage¹ du 14.12 totalise 36 260 ind. sur l'ensemble du département ce qui constitue un record (maximum précédent de 31 000 le 17.12.05). Pour l'anecdote, le 4.11 au lac de Maine, un individu ad. avec les deux tarse sectionnés juste sous l'articulation tibio-tarsienne se pose sur le ponton sud de la Pyramide, et se tient relativement bien en équilibre sur ses moignons ! Contrôles de 2 oiseaux bagués, originaires du d'Allemagne et de la Hollande.

Goéland cendré *Larus canus* : 1 H1 parmi des Mouettes rieuses sur un labour le 12.11 entre les lieux-dits « la Chatellerie » et « la Durelière » à Daumeray. 1 H1 le 26.11 à la carrière Ragonneau. Quelques rares observations au dortoir du lac de Maine : 1 H1 le 18.11 puis 1 H2-H3 le 14.12. Enfin, 1 ad. le 30.12 au lac du Verdon.

Goéland leucophaée *Larus michahellis* : 200 sont dénombrés le 8.10 au dortoir du lac de Maine. Le comptage national du 14.12 ne mentionne que 240 ind. sur les différents dortoirs. Contrôles de 4 oiseaux bagués, originaires de France (3) et d'Allemagne (1).

Goéland marin *Larus marinus* : 1 H1 sur la Loire le 7.10 à La Daguenière et le 9.10 à Saint-Rémy-la-Varenne. 3 ind. (2 H1, 1 H2) le 1.11 au lac de Maine puis 1 H1 les 14 et 25.12.

Goéland brun *Larus fuscus graellsii/intermedius* : arrivée des premiers groupes importants au dortoir du lac de Maine début octobre avec 300 ind. le 8.10. Le comptage de mi-décembre indique un total évalué à 12 605 ce qui constitue un

¹ Les comptages de Laridés au dortoir sont réalisés sur 10 sites différents : Loire à Ingrandes, de La Bohalle à Saint-Mathurin, aux Rosiers, à Saumur et Montsoreau, étang Saint-Aubin de Pouancé, île Saint-Aubin sur les BVA, lac de Maine, étang de Sainte-Christine, étang des Noues et lac du Verdon.



www.lpo.fr

nouveau record. Le précédent remonte à l'hiver 2000-2001 avec 11 850 principalement aux lacs de Maine et du Verdon. La fermeture du CET de Tiercé n'a en rien entraîné une diminution des effectifs, les oiseaux s'étant reportés sur le CET de Champteussé-sur-Baconne ou du Louroux-Béconnais.

Données obtenues par lecture des bagues : 171 lectures effectuées sur la période provenant des CET

de La Séguinière (6 séances dont 2 à 19 lectures), de Champteussé-sur-Baconne (8 séances dont 1 à 20 lectures) et du Louroux-Béconnais (5 séances) et du lac de Maine. Elles concernent 126 ind. différents. Les oiseaux sont originaires des Pays-Bas (59), Belgique (25), Grande-Bretagne (19), Allemagne (10), Espagne (4), France (4), Norvège (2), Danemark (1) et Islande (1), plus un de provenance encore inconnue. Les âges s'échelonnent entre quelques mois et plus de 16 ans !

Islandais, [LBBW(>Y972),RBM(339901)], 9^e année.



© Alain Fossé

Goéland argenté *Larus argentatus* :

- **Ssp. *argenteus*** : au moins 2 immatures (H1 et H2) séjournent en Loire amont début octobre (7 et 9.10). Au lac de Maine, l'effectif n'excède pas la dizaine d'ind. au dortoir : 8 dès le 7.10 (2 ad., 2 H2, 4 H1), au moins 8 le 17.11 lac de Maine (1 ad., 1 H2, 6 H1). Ce sont là des minima, compte tenu de la difficulté d'identification des jeunes de l'année le soir à la tombée de la nuit au cœur du dortoir de Goélands bruns. Un effectif remarquable est noté le 5.12, sur le CET de La Séguinière avec 150 ind. estimés. C'est de loin l'effectif le plus élevé enregistré jusqu'ici en Maine-et-Loire : 25 à 45 estimés en décembre 2004 pour l'ensemble du département dans le cadre du comptage national, moins de 30 en décembre 2007 mais environ 45 sur 1 000 goélands le 8 janvier 2008 sur cette même décharge de La Séguinière. Cet afflux de Goélands argentés est confirmé lors du comptage national du 14.12 avec 230 ind., effectif quasiment identique à celui des Goélands leucophées. Le 30.12, il ne subsiste plus que 70 ind. sur le CET de La Séguinière et lac du Verdon.

- **Ssp. *argentatus*** : cette sous-espèce nordique originaire de la Baltique et de la Scandinavie présente un manteau plus sombre que la sous-espèce précédente et des pattes roses parfois jaunes (certaines populations). Quelques observations attentives permettent de confirmer la présence de cette sous-espèce : 1 ad. probable le 5.12 au CET de La Séguinière et confirmé sur ce même site le 30.12. ; 1 ad. le 23.12 et 25.12 au lac de Maine.

Goéland pontique *Larus cachinnans** : une meilleure connaissance des critères d'identification permet désormais de détecter plus aisément l'espèce dans de bonnes conditions, essentiellement sur les CET. Ainsi, 1 H2 le 9.10 au Louroux-Béconnais (CHD+), 1 H1-H2 le 24.11 à Champteussé-sur-Baconne (CHD+), 1 H2 le



www.lpo.fr

30.12 à La Séguinière (CHD+). Sur les dortoirs, 1 H2 est observé le 9.10 à Saint-Rémy-la-Varenne. 1 H1 est observé le 7.10 et 1.11 au lac de Maine puis 1 H2 y est régulièrement vu les 10.10 (CHD+, ressemblant fortement à celui vu le 9.10 au CET du Louroux-Béconnais), 18.10, 22.10 et 18.11. Au lac de Maine 1 ad. le 25.12. Le 30.12, 1 H2 au CET de La Séguinière (CHD+) et quelques heures plus tard, 2 H2 (CHD ?) au lac du Verdon (dont, peut-être, celui du CET ?)

Sternidés

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* : 1 observation tardive d'1 juv. le 27.10 au lac de Rillé.

Guifette noire *Chlidonias niger* : 1 juv. le 14.10 à Chevigné.

Columbidés

Pigeon ramier *Columba palumbus* : plus de 3 000 ind. en dortoir le 14.12 sur l'île du Grand Buisson à Saint-Rémy-la-Varenne.

Strigidés

Hibou moyen-duc *Asio otus* : 16 individus le 12.12 au dortoir sur l'hippodrome de Verrie.

Hibou des marais *Asio flammeus* : 2 individus signalés le 29.11 sur la Champagne de Méron.

Caprimulgidés

Engoulevent sp. *Caprimulgidae* : 1 individu très tardif le 27.11* au lieu-dit « la Grotte », commune de Chalonnes-sur-Loire (donnée homologuée comme Engoulevent sp. *Caprimulgidae*, la description fournie ne permet pas d'attribuer avec certitude cette observation à l'Engoulevent d'Europe). L'observation la plus tardive pour *C. europaeus* date du 29.9.1981.

Hirundinidés

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : dernier individu observé le 26.11* à Chalonnes-sur-Loire (CHD ?).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : derniers individus observés sur la Loire le 1.11*, 4 individus à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD ?), et le 2.11*, 1 individu à Chalonnes-sur-Loire (CHD ?).

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : encore 2 le 3.10 aux Rosiers-sur-Loire.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* : énorme groupe, 200-300 ind., sur l'étang de Péronne le 12.10.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* : plusieurs groupes importants observés à Chevigné : 40, 120 et 106 individus, respectivement les 25.10, 6.11 et 19.12.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* : 1 000 individus estimés au dortoir près du Carrefour Saint-Serge (Angers) le 11.12.



www.lpo.fr

Turdidés

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* : 4 individus bagués (1 contrôle de bague et 3 oiseaux retrouvés morts), originaires de Belgique (2), Danemark (1) et Pologne (1).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : encore 3 le 11.10 au Puy Saint-Bonnet.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : 2 le 4.10 sur la plaine de Douvy, 1 le 17.10 à Noyant/Soulaire-et-Bourg, et 1 individu tardif le 4.11 sur la plaine de Chétigné.

Grive litorne *Turdus pilaris* : premières migratrices le 30.10 à Longué, peu de groupes signalés par la suite (env. 50 le 24.11 au Verdon, 57 le 27.12 sur la plaine des Douces)

Grive mauvis *Turdus iliacus* : premières signalées le 24.10 aux Rosiers-sur-Loire, date tardive...

Sylviidés

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : 5 le 14.12 aux gravières de Bré (rare donnée après la vague de froid de début décembre).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : 1 individu *abietinus* (sous-espèce nordique) parmi 19 *collybita* (occidentaux) le 2.10 au parc Balzac.

Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis** : retour d'un individu le 18.11 au lac de Maine, même lieu même date que l'année dernière. Encore présent sur le site le 7.12.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1 le 22.10* au parc Balzac (CHD ?), 2^e date record après celle du 29.10.94.

Roitelet huppé *Regulus regulus* : le gros du passage postnuptial s'est effectué entre le 19.10 et la mi-novembre, période durant laquelle l'espèce est notée isolément ou par petits groupes (jusqu'à 12 ind. dénombrés dans la partie ouest du lac de Maine le 18.11), souvent en rondes mixtes avec mésanges, pouillots.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* : toujours plus rare que son cousin huppé. Quelques données en octobre et décembre : lac de Maine-Balzac à partir du 1.10, Chalonnes-sur-Loire le 11.10, Saint-Georges-sur-Loire le 26.10, étang des Noues le 8.12, Boudré le 14.12, Denée le 21.12, Trélazé le 22.12, Beaucouzé le 23.12.

Muscicapidés

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : encore 1 H1 le 4.10 au parc Balzac.

Paridés

Mésange noire *Parus ater* : mouvements invasionnels marqués à partir de mi-octobre : 15 ind. en migration active le 14.10 à Saumur, troupe la plus importante cet automne. Notée ensuite isolément ou par petits groupes (au moins 55 données du



© Alain Fossé



www.lpo.fr

15.10 au 31.12). Certains de ces oiseaux s'avèrent très peu farouches, probablement originaires de lointaines contrées nordiques.

Laniidés

Pie-grièche grise *Lanius excubitor** : 1 mâle le 18.11 sur la plaine de Méron (CHD+), rare mention de cette espèce en Anjou ces dernières années...

Corvidés

Pie bavarde *Pica pica* : un dortoir de 71 ind. signalé le 23.11 à l'étang du Pavillon, un autre important de 127 ind. à l'étang des Noues à Cholet cet automne et 180 le 22.12 aux Ardoisières de Trélazé.

Fringillidés

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : premiers signalés le 18.10 (Le Thoureil).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* : entre autres 40 en migration active le 12.10 aux Coteaux-Blancs, env. 70 le 26.10 aux Montils/Longué et le 31.10 à Saumur, 40 le 30.10 à Beaucouzé, env. 50 le 14.11 au lac de Maine et jusqu'à 200 à Brain-sur-Allonnes le 31.12.

Sizerin flammé *Carduelis flammea* : 1 en vol le 22.12 à Trélazé.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : afflux important cet automne. L'espèce est notée sur quelques massifs forestiers du département : domaine de Boudré, forêts de Chandelais, Milly et Péronne, et sur 4 autres sites, pour un total cumulé d'au moins 186 ind. Maximum : env. 70 près de Serrant/Saint-Georges-sur-Loire le 30.11.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : régulier cet automne, toujours en petits groupes hormis une bande de 19 dans le bocage de Denée le 26.10 et jusqu'à 40 ind. dans les ifs d'un parc de Beaucouzé le 23.12. Quelques observations aux mangeoires (1 à Tiercé depuis début décembre, 1 à Cholet le 9.12, 1 à Denée le 26.12, 2 à Angers le 28.12).



www.lpo.fr

Embérizidés

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : jusqu'à 260 individus capturés au dortoir de Noyant/Soulaire-et-Bourg (25.10), dont 2 contrôles d'oiseaux bagués en Belgique.

Pour finir cette chronique nous souhaitons revenir sur quelques observations rares en Maine-et-Loire qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2008 :

Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*** : 1 juvénile du 17 au 28.9 à Saint-Mathurin-sur-Loire (CHN+). Il s'agit de la 3^e mention en Maine-et-Loire pour cette espèce américaine, après celle, 20 ans plus tôt, d'un individu à La Bohalle le 18.9.88 et celle, 37 ans plus tôt, d'un juvénile au lac de Maine le 15 et 16.5.71.



Busard pâle *Circus macrourus*** : 1 mâle adulte le 21.4 du côté de Saint-Macaire-du-Bois au lieu-dit « Saint-Macaire », et également 1 femelle (3^e année) le 11.5 à Savennières. Si ces observations sont validées pas le CHN, il s'agira des 2^e et 3^e mentions en Maine-et-Loire après celle du 20.3.93 (1 mâle adulte à Montreuil-Bellay, Beaudoin *et al.*, 1997).

Glaréole à collier *Glareola pratincola** : 1 adulte nuptial aux Bretonnières le 27 et 28.4 (CHD+). Il s'agit de la 3^e mention en Maine-et-Loire.



www.lpo.fr

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus** : 1 immature de forme intermédiaire en Loire amont le 25.9 (CHD+). La dernière observation en Maine-et-Loire remontait au 16.10.04 avec 1 ind. au lac du Verdon.



LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

S. Angebault, J.-Cl. Beaudoin, P. Benesteau, É. Beslot, L. Besson, D. Bizien, P. Bizien, A. Blin, J.-P. Boisdrion, J.-M. Bottereau, R. Bourigault, Cl. Bretaudeau, A. Bruggeman, J. Bruniès, N. Cailleret, F. Cauet, S. Courant, S. Desgranges, D. Farges, A. Fossé, S. Frison, B. Gaudemer, B. Gautier, E. Gautier, F. Gautier, Groupe de Chalonnes, Y. Guenescheau, E. Guillou, F. Halligon, L. Hauchecorne, S. Havet, B. Hubert, N. Issa, J.-L. Jacquemin, M. Jumeau, J. Laîné, G. Landebrit-Hardy, R. Le Bihan, B. Legendre, V. Leray, A. Liger, J.-M. Logeais, L. Lortie, B. Même-Lafond, O. Loir, R. Madier, W. Maillard, B. Marchadour, B. Moreau, G. Mourgaud, P. Nogues, T. O'Hara, D. Potaux, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, J.-C. Raymond, F. Recoquillon, J.-P. Richou, W. Raitière, F. Rayer, A. Rolland, K. Schmale, E. Séchet, C. Stevenin, J.J. Talneau, J. Tudoux, É. Van Kalmthout, J.-D. Vri gnault, B. Wälchli, T. Williamson.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIEES

Balzac (parc)/Angers
Beaurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
Bécon (forêt de)/Saint-Augustin-des-Bois
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chétigné (plaine de)/Distré
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire



www.lpo.fr

Coteaux-Blancs/Chalonnnes-sur-Loire
 Croix-Verte (étang de la)/Saint-Macaire-en-Mauges
 Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine
 Douvy (plaine de)/Épièdes
 Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
 Joreau (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
 Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
 Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
 Monteaux (carrière des)/Vivy
 Noues (étang des)/Cholet
 Pavillon (étang du)/Le Longeron
 Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois
 Pointe (la)/Bouchemaine
 Pont-Barré (coteau du)/Beaulieu-sur-Layon
 Pré de l'Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
 Puy Saint-Bonnet (le)/Cholet
 Ragonneau (carrière)/Longué-Jumelles
 Ribou (lac du)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
 Rillé (lac de)/ Breil ; Rillé, Channay-sur-Lathan (37)
 Saint-Aubin (île)/Angers
 Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil
 Trinottières (les)/Seiches-sur-le-Loir
 Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
 Verrie (hippodrome de)/Saumur



BIBLIOGRAPHIE

- www.lpo.fr
 Beaudoin J.-C., Fossé A., Mourgaud G., 1997. Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 5-22.
- Beaudoin J.-C., Fossé A., Mourgaud G., 1998. Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1994 à la nidification 1995 en Maine-et-Loire (avec compléments 1993-1994). *Crex*, 3 : 5-17.
- Beaudoin J.-C., Fossé A., Gaudemer B., Legendre B., Mourgaud G., 2006. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 2000 à la nidification 2001 en Maine-et-Loire. Corrections et compléments des faits marquants 1998-2000. *Crex*, 9 : 3-19.
- Fossé A. et le comité d'homologation départemental 49, 1999. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1996. *Crex*, 4 : 19-28.