



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 1^{er} trimestre 2009

- Janvier-Février-Mars -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ,
B. MARCHADOUR, G. MOURGAUD, R. PROVOST

avec la collaboration de J.-Cl. BEAUDOIN

PRÉAMBULE

L'année 2008 s'est achevée avec au bilan au moins 236 espèces observées. 2009 débute bien et permet d'envisager une belle année ornithologique. En effet, à la faveur de la vague de froid qui a eu lieu lors de ce premier trimestre, des espèces dont la présence n'avait pas été notée depuis plusieurs années ont été observées : Cygne chanteur, Oie des moissons, Harle piette, Goélands à ailes blanches et bourgmestre.

Fin 2008 le comité d'homologation départementale de Maine-et-Loire (CHD49) s'est réuni afin de revoir la liste des espèces soumises à homologation dans le département et la liste phénologique. Ces dernières sont téléchargeables sur le site de la LPO Anjou à la page suivante : <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>.

ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.lpo.fr/homologation/>)

Étg : étang.

H1, H2... : oiseau de 1^{er} hiver, 2^e hiver...

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.



www.lpo.fr



CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Janvier : l'hiver 2008-2009 s'est avéré particulièrement agité. La première décade connaît une vague de froid intense avec des températures matinales localement inférieures à - 12 °C (- 9,6 °C sous abri à Angers durant la nuit du 3 au 4) : la majorité des plans d'eau du département sont gelés, et des glaçons sont même observés sur la Loire les 10-11. La vague de froid sévit sur l'ouest du pays du 3 au 11, et l'Anjou subit même quelques épisodes neigeux suite à l'arrivée d'un front humide. Un fort coup de vent d'ouest est noté dans la nuit du 17 au 18. Survient ensuite une violente dépression de SO du 23 au 25, avec des vents violents, surtout dans le quart SO du pays : en Anjou, les rafales n'excèdent guère les 80 km/h. Le redoux et les précipitations durant la dernière décade du mois provoquent une crue rapide de la Loire et de la Maine (3,14 m le 29 aux Ponts-de-Cé).

Février : après un début de mois agité (tempête de SO à O du 9 au 10.2 avec rafales de 100-110 km/h), février est globalement doux et sec, avec quelques belles journées ensoleillées en fin de mois. L'absence de précipitations durant la seconde moitié du mois induit une baisse des niveaux d'eau importante sur les BVA.

Mars : débute par une période perturbée avec des précipitations assez variables. Les perturbations de secteur ouest maintiennent une certaine douceur printanière à partir du 7 mars, avec une succession de journées ensoleillées et anormalement douces pour la saison. Les dernières nappes d'eau disparaissent dans les BVA (hormis bec du Loir et Baumette), les premiers bancs de sable font leur apparition sur la Loire. La dernière décade du mois est plus mitigée et voit se succéder passages pluvieux et éclaircies, avec des vents de secteur ouest modérés mais frais.

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Cygne chanteur *Cygnus cygnus** : 1 ad. découvert le 5.3 sur les prairies de la Baumette, toujours présent fin mars (CHD+). Cette espèce est rarissime en Maine-et-Loire, seuls sept hivers ont fourni des données depuis 1960. La dernière observation dans le département remonte toutefois, à l'hiver dernier, avec 1 ind. le 13.1.08 à l'étang des Hayes (CHD+).



© A. Fossé



www.lpo.fr



Oie des moissons (de toundra) *Anser fabalis rossicus** : 2 ad. du 23.1 au 7.2 à Cheffes (CHD+). Espèce peu fréquente dans le département, seize hivers ont fourni des observations depuis 1960. Depuis la dernière donnée parue dans le *Crex* n° 1 (BEAUDOIN *et al.*, 1996), l'Oie de toundra a été observée à cinq reprises : 4 le 10.1.04 et 29.1.03 sur l'île Saint-Aubin (CHD?), 4 le 19.1.03 sur le communal de Tiercé (CHD+), 1 le 28.1.02 au lac de Maine (CHD?) et un stationnement prolongé de 7 ind. du 30.1 au 26.2.02 sur le communal de Soulaire (CHD+).

Oie rieuse *Anser albifrons** : belle troupe en Loire amont entre Le Thoureil et La Ménittré avec 21 le 16.1 (CHD+) puis 22 du 20.1 au 23.1, avec également 3 ind. supplémentaires le 21.1 aux Rosiers-sur-Loire (CHD+). Sur les prairies de la Baumette, du 26.2 au 8.3, 1 immature (CHD+).


Oie des moissons

Oie rieuse



Oie cendrée *Anser anser* : passages débutant dès la fin janvier et s'étalant jusqu'au début du mois de mars, avec plus particulièrement de nombreux vols observés du 14 au 25.2. Les niveaux d'eau étant favorables, de beaux stationnements ont été observés dans les BVA (voir le graphique suivant) : 716 ind. posés le 25.2 sur l'île Saint-Aubin.

Comptages pré-nuptiaux BVA



www.lpo.fr



Bernache du Canada *Branta canadensis* : 7 du 9.1 au 28.2 dans les BVA entre les prairies de Cheffes/Tiercé et l'île Saint-Aubin ; également 3 ind. le 31.1 en amont du pont d'Ingrandes.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : l'espèce a donné lieu à de nombreuses observations réparties sur 19 sites, essentiellement dans les BVA, sur la Loire et en vallée de la Tau. Ce dernier site accueille le plus gros effectif avec 22 ind. le 19.2.

Canard siffleur *Anas penelope* : quelques regroupements sur les plus vastes plans d'eaux pendant le coup de froid avec 151 le 17.1 au Verdon et 196 le 18.1 au lac de Maine, maximum de l'ordre de 635 le 12.2 sur l'île Saint-Aubin.

Canard chipeau *Anas strepera* : suite à l'afflux de cet automne, toujours beaucoup d'individus au lac de Maine avec 222 pendant la vague de froid de janvier, de nombreux petits groupes sont aussi notés sur la Loire à cette même période. Maximum d'env. 270 sur l'île Saint-Aubin le 8.2 et encore 87 le 29.3 à Cheigné.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : effectifs relativement restreints cet hiver à cause du gel, 117 le 18.1 au lac de Maine, 150 le 18.1 sur l'île Saint-Aubin, 124 le 17.1 au Verdon, maximum de 495 le 6.3 sur l'île Saint-Aubin.

Canard pilet *Anas acuta* : premiers mouvements d'oiseaux notés vers la mi-janvier, 65 le 9.1 puis 110 le 18.1 au lac de Maine, 60 le 18.1 sur l'île Saint-Aubin et 25 sur le Pré de l'Abbesse, puis le passage s'accélère en février avec environ 600 ind. le 1.2 sur l'île Saint-Aubin, 1 200 le 9.2 et maximum de 1 700 le 22.2. Beau rassemblement également début mars avec jusqu'à 1 700 oiseaux le 11.3, concentrés sur l'une des dernières nappes d'eau, au Bec du Loir/Briollay.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : premières notées tardivement le 9.3 avec 2 mâles sur les prairies de la Baumette, et jusqu'à 11 ind. observés le 24.3 sur ce même site.



www.lpo.fr



© P. Bironneau

Canard souchet *Anas clypeata* : au moins 50 le 4.1 au Verdon, 96 le 18.1 au lac de Maine, 305 le 6.3 sur l'île Saint-Aubin et jusqu'à 310 le 11.3 à la Baumette.



*Décompte hivernal des Anatidés
en Maine-et-Loire des 17 et 18 janvier 2009
(Wetlands International)*

Sites	Canard siffleur	Canard chipeau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Fuligule milouin	Fuligule morillon
Baugeois								
Étgs de Singé, Sélène, Oisellerie et Grand Maison		8	21	126		2	14	13
Étg des Hayes				58			14	
Étgs des Hautes Belles et des Loges							97	
Étgs de Rochefoulques et de l'Égout				13				
Le Loir				12				
Mauges								
<u>Lacs du Verdon et du Ribou</u>	151	3	124	680		9		
Étgs du Pavillon et de Péronne				265			12	
Étgs de la Roussière et de la Thévinère				24			4	
Étg du Bois Ham				114				
Étg des Noues et de la Godinière				63				1
Saumurois								
Étgs de Marson et de Joreau				73				
Étgs des Monteaux et des Youis		3	3	865			37	4
Segréen								
<u>Étg de Cheigné</u>	4		60	197			6	13
Étg de Maubusson				40			14	
Réservoir Saint-Aubin			4	100			11	
Étgs de la Primaudière et du Fourneau	13		9	24			32	19
Étg de Tressé			41					
Carrière de la Jonchère			7	148				
Étgs de la Farauderie et prairie du Louroux			4	53				
Étgs de Piard et de la Clémencière			6	127			7	
Val de Loire et BVA								
<u>La Loire : Gennes à Montsoreau</u>		7	11	1 165	9	1	7	19
<u>La Loire : St-Mathurin à Gennes</u>			4	1 980	12			
La Loire : Montjean/Loire à St-Florent et abords				419	1		28	6
Bré, la Charpenterie et les Bretonnières		3	20	532		4	33	10
Fosse de Sorges				543				
Pré de l'Abbesse et Baillie de Noyant (BVA)	60	24	7	10	25	9	85	
<u>Île Saint-Aubin</u>	25	10	150	37	60	25		
<u>Lac de Maine et la Baumette</u>	196	222	117	1 203	110	96	269	71
Totaux	449	280	588	8 871	217	146	670	156

Remarque : les sites soulignés font partie des sites nationaux de recensements hivernaux des oiseaux d'eau.



www.lpo.fr



Nette rousse *Netta rufina** : 1 mâle les 4 et 5.1 sur le plan d'eau de l'île Ponneau/Saint-Lambert-des-Levées (CHD+), 1 femelle le 24.2 sur le Pré de l'Abbesse (CHD+).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : env. 300 les 4 et 5.1 sur l'île Ponneau, nombreux individus réfugiés sur les grands cours d'eaux pendant la vague de froid (42 le 10.1 à la Pointe, 30 le 10.1 à Saumur, etc.), 360 le 12.1 au lac de Maine, 360 le 6.2 à Beaurepaire, 462 le 8.2 au Pré de l'Abbesse. Durant la période d'observations, 58 contrôles de 26 oiseaux marqués en France.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca** : toujours le mâle des Monteaux présent jusqu'au 7.1 (CHD+), 1 mâle sur la Sarthe devant l'île Saint-Aubin le 10.1 (CHD+), retour du mâle à l'étang des Hayes du 28.1 au 22.2 (absent certains jours), 1 mâle le 18.2 à Beaurepaire (CHD+), 1 le 22.2 au Pré de l'Abbesse (CHD+). Les observations permettent d'envisager 3 individus différents.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : maximum de 70 le 12.1 au lac de Maine, 21 le 15.1 sur le Loir à Seiches (noté en petit nombre sur les cours d'eaux pendant le gel des plans d'eau), 38 le 10.2 à Bré, 29 le 10.3 à Chevigné. 14 contrôles de 5 oiseaux marqués en France et 14 contrôles d'un oiseau marqué au Portugal.

Fuligule milouinan *Aythya marila** : toujours 1 femelle aux Youis jusqu'au 3.1 (CHD+), 1 couple du 8 au 15.3 à Chevigné (CHD+).

Fuligule milouin x Nette rousse *Aythya ferina x Netta rufina* : 1 ind. femelle présentant les caractères d'un tel hybride du 11 au 13.1 au lac de Maine.

Fuligule milouin x Fuligule nyroca *Aythya ferina x Aythya nyroca* : 1 ind. femelle présentant les caractères d'un tel hybride du 7 au 11.3 à Montreuil-Juigné.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 1 femelle le 4.1 et du 17.1 au 2.2 aux Hayes, 1 mâle le 8.1 aux Rosiers-sur-Loire, 1 mâle les 10 et 11.1 à la Pointe, 2 femelles le 15.1 sur le Loir à Seiches puis à Bré du 19 au 29.1 et du 11 au 15.2, 1 femelle le 24.1 à Chevigné, 1 mâle le 29.1 aux Youis, 1 femelle le 9.2 aux Youis, 2 mâles du 4 au 12 puis 3 mâles le 15 et 1 du 16 au 18.2 aux Bretonnières, 1 femelle les 6 et 8.3 puis 2 femelles les 9 et 12.3 aux Youis et enfin 1 femelle le 30.3 à Bré.

Macreuse brune *Melanitta fusca** : 4 (dont 1 mâle de 1^{er} hiver) du 3 au 18.1 au lac de Maine (CHD+), 1 femelle/immature effectue un séjour prolongé aux Youis à partir du 17.1 (CHD+ ; encore présente début avril !), 1 mâle de 1^{er} hiver à Chevigné à partir du 15.2 (CHD+ ; lui aussi toujours sur place début avril).

Harle piette *Mergellus albellus** : 1 mâle le 18.1 à Bré (CHD+), 1 femelle/immature du 20.1 au 21.2 circulant entre les Monteaux et les Hayes (CHD+).

Harle huppé *Mergus serrator** : 1 femelle/immature le 21.3 sur la Loire à Béhuard (CHD+).

Harle bièvre *Mergus merganser** : toujours les 2 femelles au Verdon jusqu'au 19.2 (CHD?), 1 mâle en vol le 10.1 sur la Loire à Turquant (CHD?), 1 mâle et



www.lpo.fr



2 femelles en vol le 11.1 au lac de Maine (CHD+), 4 femelles les 28 et 30.1 aux Hayes (CHD+), 1 femelle les 6 et 7.3 au Verdon (CHD?).

Erismaire rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 du 6 au 18.1 au lac de Maine.

Gaviidés

Plongeon arctique *Gavia arctica** : 1 immature le 4.1 aux gravières du Sol de Loire (CHD+).

Podicipédidés

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : pas d'effectif record mais tout de même 235 le 8.1 au Verdon et 305 le 9.1 au lac de Maine. Une observation de ponte précoce : 1 nid avec 4 œufs le 7.3 à Cholet.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : premier signalé le 24.2 dans les BVA au Pré de l'Abbesse. Au moins 15 mentions sur 6 sites durant la période, avec en particulier 7 le 8.3 à Chevigné, 7 au Verdon et 4 au lac de Maine le 15.3, puis 5 le 24.3 sur ce même site.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : 2 002 ind. recensés dans le département lors du comptage concerté du 16.1 (voir le tableau de synthèse suivant). Pour mémoire : 2 040-2 093 ind. pour 14 dortoirs en 2005 et 2 021 pour 17 dortoirs en 2007.

Recensement Grand Cormoran hiver 2008/2009

Secteurs	Nombre de dortoirs	Nombre d'individus
BVA et abords	9	945
Loire amont	5	568
Loire aval	2	369
Segréen	1	92
Mauges	1	28
Totaux	18	2 002

Au moins 5 nids tenus par des ad. le 21.2 dans la colonie du lac de Maine : après l'installation tardive de l'année dernière (caractéristique d'oiseaux pionniers), la chronologie est conforme à ce qui est observé sur les colonies ayant une certaine ancienneté. Fin mars, 9 nids semblent occupés...

Contrôles de 11 oiseaux bagués en provenance de France (3), Norvège (3), Hollande (2), Angleterre (1), Belgique (1) et Danemark (1).

Ardéidés

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 1 le 21.1 à l'étang de Joreau, 1 le 28.1 à l'étang des Hayes et 1 probable le 14.2 à Beaufort-en-Vallée. Un chanteur noté au cours de la première quinzaine de mars sur un étang privé du quart nord-ouest du département.



www.lpo.fr



Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : l'hivernage de l'espèce n'est pas fréquent, l'hiver 2008/2009 apporte toutefois des données concernant l'observation d'au moins 4 ind. différents. Stationnement d'un ad. du 5.1 au 23.2 sur un petit étang à La Ménitré ; 1 immature les 18 et 24.1 au lac de Maine et 2 ad. le 15.3 au bord du Thouet.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : la vague de froid survenue au cours de l'hiver semble avoir délocalisé l'espèce (les dortoirs habituels ont été désertés, de plus, plusieurs cadavres ont été trouvés). L'ensemble des données répertoriées durant la période ne relate pas plus d'une dizaine d'individus par observation. L'espèce semble amorcer son retour à partir de la mi-mars : on note la présence de quelques ind. sur les deux sites de reproduction connus dans le département.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : bien présente tout l'hiver, ne semble pas avoir souffert de la vague de froid. Encore 13 ind. le 20.1 à l'étang des Hayes ; et on notera également un groupe de 16 le 21.3 dans les BVA sur la baillie de Noyant. Contrôle de 4 oiseaux bagués en France.

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : première mention le 27.3 avec 1 en vol à Vernantes.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : passages pré-nuptiaux bien marqués avec au moins 18 données, s'étendant du 2.2 au 20.3. Trois observations concernent des groupes supérieurs à 10 ind. : 14 le 1.3 à Mouliherne, 12 le 16.3 à Saint-Crespin-sur-Moine et 16 le 19.3 à Seiches-sur-le-Loir. Observation de 2 ind. bagués originaires de Normandie : l'un de Saint-Vigor-d'Ymonville (76) et l'autre de Monfréville (14).

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 1 le 18.1 dans la vallée de la Tau et également 1 ind. le 22.3 au lac de Maine, prémices d'une nouvelle reproduction sur le site comme en 2008 ?

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : trois observations hivernales avec un juvénile très affaibli le 11.1 au lac de Maine, 1 le 27.2 sur le communal de Soulaire-et-Bourg et 1 le 8.3 aux Bretonnières. Cette dernière, baguée en Hollande, aura 17 ans en juillet 2009 !

Accipitridés

Milan noir *Milvus migrans* : premier individu observé le 12.3.

Milan royal *Milvus milvus* : 5 mentions au cours du mois de janvier concernant des individus seuls, le 2.1 à Mazé, le 3.1 près de Mouliherne, le 11.1 près de Jarzé, le 16.1 à Chaumont-d'Anjou et le 18.1 à Saint-Michel-et-Chanveaux ; également une donnée le 30.3 près de Mouliherne avec 1 individu.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : première observation de l'espèce le 15.3* avec 2 ind. au nid (CHD+). Il s'agit de la donnée la plus précoce obtenue jusque là, auparavant le 17.3.79.



www.lpo.fr



Pandionidés

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : premier individu observé le 16.3 à Montsoreau. Stationnement d'une femelle sur la plateforme de la Baumette du 23.3 au 5.4 mais aucune tentative de reproduction observée.

Falconidés

Faucon émerillon *Falco columbarius* : encore 1 ind. le 13.3 à Douvy et 1 mâle immature le 17.3 en forêt de Milly.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : l'individu présent depuis le 19.11 sur la cathédrale d'Angers a continué son hivernage, à la fin du premier trimestre il était toujours présent sur le site (cf. chronique précédente).

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : premier contact le 13.3 à Méron avec 1 femelle.

Rallidés

Râle des genêts *Crex crex* : premier chanteur contacté le 31.3* sur la rive droite de la Maine en face les prairies de la Baumette (CHD?).

Récurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 8 le 29.3 passant au-dessus de la Baumette.

Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* : 4 entre Cheffes et Écuillé le 9.1 malgré la vague de froid puis réapparition le 28.2 avec 1 à Montreuil-sur-Loir, 13 au Verdon le 7.3, 6 à Méron le 11.3.

Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : premiers le 11.3 (6 à La Bohalle).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : 2 le 12.3 aux Monteaux, 5 le 13.3 entre Les Rosiers-sur-Loire et La Bohalle.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : malgré la vague de froid, peu de troupes rapportées pour la période : descente quand même signalée à Saint-Michel-et-Chanveaux durant la vague de froid, 120 le 6.2 à Saint-Georges-sur-Loire, 120 le 16.2 à Saint-Germain-des-Prés, une centaine en Tau le 20.2, 350 le 22.2 à Beaupréau. Aucune troupe à la remontée sur les BVA. Encore 1 le 29.3 entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Georges-sur-Loire.

Scolopacidés

Bécasseau variable *Calidris alpina* : 1 le 7.2 à Soulaire-et-Bourg, 1 le 8.2, 16 le 13.2, 11 le 15.2 à Saint-Germain-des-Prés, 2 le 19.2, 1 le 20.2 au lac de Maine.



www.lpo.fr



Combattant varié *Philomachus pugnax* : très faible passage avec 1 le 13.2 à Saint-Germain-des-Prés, 2 le 4.3, 1 le 9.3, 2 le 18.3, 4 le 22.3 et 7 le 24.3 sur la Baumette, 8 sur l'île Saint-Aubin le 18.3, 1 à Chevigné le 29.3.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : seulement 1 le 11.2 à Bré.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : maximum de 95 le 20.2 à l'embouchure du Layon/Chalonnnes-sur-Loire.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : à la faveur de la vague de froid, 1 à Tiercé le 6.1, 1 à Angers, 3 à Saint-Rémy-la-Varenne le 9.1, 1 à Écouflant le 10.1, 1 près de Bouchemaine le 11.1, 2 aux Loges le 29.1, 1 le 10.2 à Grioul/Grez-Neuville, 7 le 13.2 à Saint-Rémy-la-Varenne.

Barge à queue noire *Limosa limosa* : premières signalées le 7.2 (12 en vallée de la Tau) et le 11.2 pour les BVA (80 sur la Baumette). Malgré des conditions de pose correctes, passage moyen cette année (pic entre 22.2 et 4.3) : maxima de 4 290 le 25.2 et 4 612 (dont troupe de 4 500) le 1.3, avec un total cumulé voisin de 9 400 oiseaux jusqu'au 19.3. Une seule donnée complète de baguage : 1 oiseau marqué [LAM(1430368),B,Y;RAYF,Y,L] le 5.3 à Cantenay-Épinard avait été bagué poussin le 18.6.07 à Workum (NL).

Courlis cendré *Numenius arquata* : le passage prénuptial commence à la fin de janvier avec 18 le 19.1 à Soulaire-et-Bourg. Belles troupes en février à Soulaire-et-Bourg avec 146 le 7, 161 le 8, 124 le 15 puis une centaine entre le 16 et le 22. L'espèce passe aussi par la vallée de la Tau (maximum de 80 le 19.2), les lacs du Verdon (maximum de 32 le 19.2) et de Ribou, la plaine de Montreuil-Bellay. Le passage s'amenuise en mars pour laisser les nicheurs potentiels à Soulaire-et-Bourg et Méron.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 1 le 15.1* au Gué de Linorge (CHD+).

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : les premiers oiseaux nuptiaux sont notés le 15.2 au lac du Verdon avec 3 adultes. Les observations sont régulières ensuite tant au Verdon qu'au lac de Maine. Sur la Loire, 9 ind. sont notés le 12.3 en aval de Saint-Mathurin-sur-Loire ; 19 sont présentes le 24.3 au lac de Maine. 21 contrôles effectués sur la colonie de la Bretonnière concernant 6 individus différents en provenance de Belgique (2), d'Allemagne (1), de France (1), des Pays-Bas (1) et de Pologne (1).

Mouette pygmée *Larus minutus* : observations à des dates classiques. Le 19.2, 1 ad. au dortoir du lac de Maine, 2 le 10.3 à l'étang de Chevigné et 2 ad. le 24.3 au lac de Maine.

Goéland cendré *Larus canus* : observations régulières sur différents sites de début janvier à début mars, le plus souvent à l'unité et principalement lors de la vague de froid. A retenir, 4 H1 et 1 ad. le 16.1 en Loire amont entre Le Thoureil et Gennes et 5 le 21.2 au lac de Maine.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : en fin de période des cantonnements sont notés en divers points de la Loire : île de Montsoreau qui assiste à un report des couples habituellement cantonnés sur l'îlot de Parnay presque totalement



www.lpo.fr



emporté par les crues hivernales, île du Buisson, la Pointe à Bouchemaine. Un couple également cantonné à Chevigné sur la tonne de chasse fin mars...

Goéland brun *Larus fuscus graellsii/intermedius* : encore 900 le 5.3 au lac de Maine. Les contrôles d'oiseaux par lecture de bagues permettent de noter des déplacements entre le CET de La Séguinière et le dortoir du lac de Maine. Données obtenues par lecture des bagues : 156 contrôles effectués sur la période concernant 116 individus différents. La majorité des oiseaux proviennent comme pour la période précédente des Pays-Bas (55), puis de Belgique (27), de Grande-Bretagne (18), d'Allemagne (12), de France (2), du Danemark (1) et de Norvège (1).

Goéland argenté *Larus argentatus* :

- **Ssp. *argenteus*** : l'espèce est signalée sur la plupart des centres d'enfouissement et les dortoirs en janvier et février. Un nouveau record départemental est atteint le 6.2 avec au moins 265 ind. au CET de La Séguinière. Données obtenues par lecture des bagues : 3 contrôles en provenance des Pays-Bas, de Grande-Bretagne (Guernesey) et de France.
- **Ssp. *argentatus*** : au moins 1 le 6.2 au CET de la Séguinière.

Goéland pontique *Larus cachinnans** : au moins 3 oiseaux différents vus sur la période aux CET de La Séguinière et de Champteussé-sur-Baconne (CHD+). 1 H2 le 26.1, de même que le 6.2 à La Séguinière et 1 ad. le 29.1 et 3.2 sur le deuxième site. Ce dernier ind. est porteur d'une bague, il provient de Pologne.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus** : 1 H2 est découvert le 15.2 au lac du Verdon, il y est présent jusqu'au 19.2 (CHD+). Dans la journée du 17.2, 1 H2 (certainement le même ind.) est noté au CET de La Séguinière (CHD+). Il s'agit là des 6^e et 7^e données départementales récentes. La dernière observation dans le département remonte au 1.2.2000 avec 1 au lac de Maine (FOSSÉ et CHD49, 2003) ; auparavant il s'agissait des 2.1.94, 9.12.78, 30.1 et 6.3.74 (BEAUDOIN *et al.*, 1997 ; BEAUDOIN *et al.*, 1980 ; BEAUDOIN *et al.*, 1975).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*** : alors que l'espèce est observée pour la première fois dans le département en 1996 seulement (1 H1 le 13.1.96 au CET de la Courtrie/Le Louroux-Béconnais, BEAUDOIN *et al.*, 1999) et que l'espèce restait rare à l'intérieur des terres, elle est observée plusieurs fois au cours des années 2000 : 1 H1 du 20.2 au 4.3.05 au lac du Verdon et au CET de la Séguinière (CHN+, FRÉMONT *et al.*, 2007), 1 H1 (le même ?) le 3.3.05 au Louroux-Béconnais et enfin 1 H1 le 25.2.08 au CET de la Séguinière (CHN+). Cette année, ce sont au moins deux oiseaux qui nous arrivent lors de la vague de froid. Ils sont découverts tous les deux le 19.2 (CHN±) : 1 H2 au lac du Verdon (unique observation) et 1 H1 au CET de Champteussé-sur-Baconne. Celui de la région d'Angers est revu au dortoir du lac de Maine du 26 au 28.2. Le 27, il fréquente le CET du Louroux-Béconnais. Le 3.3, il est de nouveau observé au CET de Champteussé-sur-Baconne. Il est observé pour la dernière fois le 6.3 sur l'île St-Aubin dans un reposoir de près de 320 goélands.



www.lpo.fr

Goéland Bourgmestre



Goéland à ailes blanches





Mouette tridactyle *Rissa tridactyla** : 1 ad. le 26.1 est posé sur la Loire aux Rosiers-sur-Loire (CHD+). Le 27.3, 1 ad. est posé quelques instants près du quai à la Pointe (CHD+).

Sternidés

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : première le 12.3 à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Cuculidés

Coucou gris *Cuculus canorus* : le premier individu est entendu le 15.3 à Méron. Huit jours plus tard un individu est mentionné à Brain-sur-Allonnes le 23.3 puis un autre le lendemain sur cette même commune.

Strigidés

Hibou moyen-duc *Asio otus* : dortoir de 19 ind. le 28.2 en forêt de Brossay.

Upupidés

Huppe fasciée *Upupa epops* : première contactée au lac de Maine le 14.3. Les deux suivantes sont respectivement notés le 16.3 à Tiercé et le 18.3 à Mûrs-Érigné.

Alaudidés

Alouette lulu *Lullula arborea* : un effectif important de 32 ind. est observé le 29.1 à l'étang des Hayes.

Hirundinidés

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : 2 ind. sont mentionnés le 26.2* au lac de Maine (CHD+). Cette date est précoce, le record datant du 18.2.01. Les suivantes sont plus proches de la moyenne des dates d'arrivée : 3 aux Youis le 13.3, puis 2 le lendemain à l'étang du Fourneau.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : 2 ind. sont mentionnés le 1.3* aux Monteaux (CHD+). Le lendemain, un autre ind. est observé à Saint-Michel-et-Chanveaux. Ces dates ne constituent pas de record mais sont relativement précoces au regard de la moyenne des arrivées. Les autres observations concernant l'arrivée de l'espèce sont faites le 6.3 avec 1 aux Monteaux, puis le 9.3 avec 1 à Saint-Jean-de-Linières et 1 autre à l'étang de Chevigné.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* : les premières sont observées à la Pointe le 23.3 avec d'abord 10 individus, puis 4 plus tard dans la journée.

Motacillidés

Pipit des arbres *Anthus trivialis* : les premiers sont notés le 31.3 et les données concernent à chaque fois un individu : 1 à Baracé, 1 à Tiercé et 1 en forêt de Milly.



www.lpo.fr



Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* : groupe important d'env. 50 ind. noté le 21.3 au niveau du Bec du Loir.

Pipit maritime *Anthus petrosus** : 1 le 30.3 à la Pointe (CHD+), certainement de la sous-espèce *littoralis*, cette dernière se reproduisant sur les côtes scandinaves. Cet individu est probablement un migrateur provenant d'une zone d'hivernage du littoral atlantique et rejoignant ses quartiers de nidification en Scandinavie. Les observations de l'espèce dans le département sont peu fréquentes : les dernières mentions datent du 1.10.02 à La Daguenière avec 1 ind. (CHD+), 1 autre le 8.3.1996 à Noyant dans les BVA et 2 individus le 7.3.1996 (BEAUDOIN *et al.*, 1999 ; FOSSÉ & CHD 49, 1999).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* : les premières sont observées aux Monteaux : 2 le 26.3 et 1 le 27.03. À cette même date, 1 mâle est noté sur les prairies d'Écouflant, ainsi qu'un ind. sur celles de la Baumette.

Bergeronnette flavéole *Motacilla f. flavissima* : 1 le 30.3 à la Pointe.

Bombycillidés

Jaseur boréal *Bombicilla garrulus** : en marge de l'afflux notable qui a touché l'est de la France cet hiver, observation d'un possible ind. le 13.2 à Blaison-Gohier (CHD?) ; non retrouvé par la suite, malgré une certaine « motivation » des observateurs...

La dernière observation répertoriée remonte aux 16-17.2.1996 avec 1 ind. à Segré, observation constituant la 4^e mention départementale récente (BEAUDOIN *et al.*, 1999 ; FOSSÉ & CHD 49, 1999).

Turdidés

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* : reprise le 15.1 d'1 ind. norvégien bagué 111 jours plus tôt.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : premier chanteur signalé le 31.3* à Tiercé (CHD?).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : semble lui aussi avoir souffert des rigueurs de l'hiver, peu d'ind. notés en hivernage (1 à Montreuil-Bellay le 11.1, 1 fem./imm. à la Pointe le 2.2).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica** : donnée précoce d'une femelle signalée le 19.3 au Bec du Loir à Briollay (CHD?).

Tarier pâtre *Saxicola torquata* : sensible à la vague de froid, l'espèce n'est signalée que très ponctuellement dans le département avant la mi-février, seulement 4 données enregistrées. Retour de l'espèce à Écuillé le 2.2, à Chemellier le 26.2, et retour de 2 locaux le 10.3 à Tiercé dont 1 mâle bagué en 2007 au même endroit.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : les migrateurs les plus précoces sont notés le 2.3* à Saint-Michel-et-Chanveaux (3^e date record ; CHD?).

Grive litorne *Turdus pilaris* : 35 le 12.2 à Saint-Germain-des-Prés, env. 30-50 en dortoir aux Trinottières/Seiches-sur-le-Loir le 28.2, 150 aux Monteaux le 30.1.



www.lpo.fr



Grive mauvis *Turdus iliacus* : peu de groupes importants signalés cet hiver, de nombreux oiseaux ayant certainement fuit le département durant la vague de froid de début janvier (100 sur la plaine des Douces à Doué le 10.1).

Sylviidés

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : l'espèce semble avoir fortement souffert de la vague de froid de l'hiver, deux mentions avec 1 le 20.2 à la Pointe et 1 chanteur observé le 15.3 à la Baumette.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : quelques observations ponctuelles avant la mi-février, 1 se nourrissant dans une boule de gui le 8.1 à Saint-Clément-des-Levées, 1 à la mangeoire le 10.1 à Montreuil-Bellay, 4 ind. ensemble à Gennes le 16.1, et 1 femelle le 4.2 aux Rosiers-sur-Loire.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : 6 données courant janvier.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : 1 dès le 13.3 à la Baumette.

Paridés

Mésange noire *Parus ater* : encore de nombreuses données cet hiver, suite à l'afflux de l'automne dernier. Fréquente assidûment les mangeoires (Mazé, Tiercé, Chalennes, Mûrs-Érigné, la Pointe/Bouchemaine, Les Rosiers-sur-Loire...). Quelques chanteurs cantonnés notés courant mars pourraient laisser présager localement une nidification...

Fringillidés

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : fréquent aux mangeoires, notamment durant le mois de février. À signaler également une troupe de près de 2 000 ind. le 9.1 à Longué-Jumelles. Encore 2 le 24.3 au lac de Maine.

Serin cini *Serinus serinus* : premier chanteur précoce le 7.1 au Jardin des Plantes de Saumur.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* : parmi une bande mixte de fringilles, 1 ind. leucique le 8.2 à Mazé.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* x Verdier d'Europe *C. chloris* : 1 ind. présentant les caractères d'un tel hybride, noté à la mangeoire du 24 au 30.3 à Écuillé.

Sizerin flammé *Carduelis flammea** : assez peu de données malgré la vague de froid. D'abord une troupe de 15 ind. signalée au parc de Chaudron-en-Mauges le 11.1 (CHD±) et 1 dans une grande troupe de fringilles le 16.1 à Cornillé-les-Caves (CHD?), puis 1 mâle le 20.2 à Bré (CHD±) et 1 ind. observé en vol à la Baumette le 21.2 (CHD?).

L'individu observé le 20.2 à Bré (cf. photo page suivant) serait à rattacher à la sous-espèce nominale *Carduelis f. flammea*. Si la donnée est validée par le CHD49 il s'agira de la première mention de cette sous-espèce pour le département.



www.lpo.fr



© F. Rayer

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : la vague de froid de début janvier semble avoir dispersé les oiseaux. Quelques individus erratiques sont notés çà et là à proximité de grands secteurs boisés : le 29.1 à l'étang des Hayes, le 30.1 aux Loges et à Milly (dont 1 mâle chanteur), le 14.2 au Thoureil, le 5.2 et le 23.3 à Mouliherne. L'espèce est régulièrement contactée dans les pinèdes de Boudré au cours des mois de janvier et février, avec un effectif maximal de 30 ind. le 14.1.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : le suivi d'une troupe d'hivernants à Beaucouzé permet de dénombrer simultanément jusqu'à 104 ind. se nourrissant au pied d'un if le 6.1. À la suite de la vague de froid, l'espèce devient encore plus fréquente aux mangeoires sur l'ensemble du département (Angers, Tiercé, Cholet, Chalonnes, La Jumellière, Mûrs-Érigné, Corzé, Montreuil-Bellay, Yzernay, La Chapelle-Rousselin, Bouchemaine...), puis les données diminuent courant mars. Encore quelques groupes notables signalés : env. 10 aux Rosiers-sur-Loire le 2.3, et 39 à Beaucouzé le 13.3.





LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

S. Angebault, A. Bajan, J.-Cl. Beaudoin, H. Berjon, S. Bertru, É. Beslot, P. Bienvenu, D. & P. Bizien, J.-P. Boisdron, S. Boissel, J.M. Bottereau, G. Bouget, M. Bouvet, F. Breau, A. Bremberg, C. Bretaudeau, A. Bruggeman, F. Cauet, P. Charrier, S. Courant, M.-T. Courné, S. Desgranges, J. El Asri, C. Ettel, D. Ferrand, A. Fossé, B. Gaudemer, P. Grisvard, Groupe de Chalennes, C. & Y. Guenescheau, E. Guillou, M.-P. & M. Gys, F. Halligon, L. Hauchecorne, S. Havet, S. Hénaff, B. Hubert, J.-L. Jacquemin, T.-M. Jammes, M. Jumeau, G. Landebrit-Hardy, R. Lebihan, V. Leray, J.-M. Logeais, O. Loir, S. Lutz, B. Marchadour, Mme Marchaison, F. Masson, B. MÊme-Lafond, J. Molné, F. Moreau, G. Mourgau, P. Nourry, T. O'Hara, ONCFS, P. Pailley, P. Poupard, M. Prézélin, R. Provost, G. Réthore, P. Raboin, F. Rayet, J.-P. Richou, J.-P. Rousseau, A. Ruchaud, L. Saulnier, E. Séchet, P. Siriot, C. & Ch. Suaudeau, H. Touzé, F. Vaidie, C. Van Dinh N'Guyen, M. Vitré, J.-D. Vrignault, B. Wälchli.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
 Beurepaire (étang de)/Cléré-sur-Layon ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
 Bec du Loir/Briollay
 Boudré (domaine de)/ Seiches-sur-le-Loir
 Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
 Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
 Brossay (forêt de)/Cizay-la-Madeleine
 Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
 Douces (plaine des)/Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine



Gué de Linorge (le)/Soulaire-et-Bourg
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Joreau (étang de) = Cunault (étang de)/Chênehutte-Trêves-Cunault
Loges (étang/tourbière des)/Brain-sur-Allonnes
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Milly (forêt de)/Milly-le-Meugon
Monteaux (carrière des)/Vivy
Parnay (îlot de)/Parnay
Pointe (la)/ Bouchemaine
Ponneau (île)/Saumur
Pré de l'Abbesse (le)/Cantenay-Épinard
Ribou (lac du)/Cholet, La Tessoualle, Maulévrier
Saint-Aubin (île)/Angers
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-Vieil
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubroignes (79)
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

BIBLIOGRAPHIE

- BEAUDOIN J.-C., CORMIER J.-P., DANIEL M.-H., FARGES D., GYS M., LE MAO J.-P., LE MAO P., 1975. Saison postnuptiale 1973, hivernage 1973-1974 en Maine-et-Loire. *G.A.E.O.*, 5 (14) : 61-109.
- BEAUDOIN J.-C., CORMIER J.-P., FOSSÉ A., LE MAO P., 1980. Rapport concernant la saison postnuptiale 1978 et l'hivernage 1978-1979 en Maine-et-Loire. *G.A.E.O.*, 10 (29) : 72-137.
- BEAUDOIN J.-C., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1996. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1991 à la nidification 1992 en Maine-et-Loire. *Crex*, 1 : 7-15.
- BEAUDOIN J.-C., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1997. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 5-22.
- BEAUDOIN J.-C., FOSSÉ A., MOURGAUD G., 1998. Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1995 à la nidification 1996 en Maine-et-Loire (avec corrections et compléments pour 1994-1995). *Crex*, 4 : 3-17.
- FOSSÉ A., CHD 49, 1999. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1996. *Crex*, 4 : 19-28.
- FOSSÉ A., CHD 49, 2003. Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire en 1999 et 2000. *Crex*, 7 : 33-40.
- FRÉMONT J.-Y., REEBER S., CHN, 2007. Les oiseaux rares en France en 2005. 24^e rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 14 (5) : 265-307.



www.lpo.fr