



Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 2^e trimestre 2009

- Avril-Mai-Juin -

É. BESLOT, S. COURANT, A. FOSSÉ,
B. MARCHADOUR, G. MOURGAUD, R. PROVOST

avec la collaboration de J.-Cl. BEAUDOIN, E. GUILLOU & T. PRINTEMPS.

PRÉAMBULE

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas... peu de raretés à signaler pour ce second trimestre. Le Cygne chanteur, le Faucon pèlerin et les Macreuses brunes ont toutefois prolongé leur séjour jusque dans le courant du mois d'avril. On notera par contre la tentative de reproduction du Crabier chevelu au lac de Maine, la nidification réussie pour la Spatule blanche et le Guêpier d'Europe, et la présence d'un couple cantonné de Blongios nain, espèce de moins en moins fréquente dans le département. À noter également la remarquable résistance aux froids de janvier de la part de la Cisticole des joncs alors qu'au contraire la population locale de Martins-pêcheurs d'Europe semble avoir subi des pertes. Pour finir, soulignons la remarquable concentration de Laridés nicheurs sur les radeaux du plan d'eau du Sol de Loire (177 couples de 3 espèces !).

Les dates d'arrivée 2009 des migrateurs en Maine-et-Loire sont répertoriées dans le tableau pages 8 et 9.

ABRÉVIATIONS & SIGLES

Ad. : adulte.

BVA : Basses Vallées Angevines.

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce*/Date* : soumis à homologation départementale.

(CHD49, <http://www.lpo-anjou.org/obs/chd49/chd49.htm>)

Espèce** : espèce soumise à homologation nationale (CHN).

(CHN, <http://www.lpo.fr/homologation/>)

Étg : étang.

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

ZPS : Zone de Protection Spéciale



www.lpo.fr



N.B. : une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Avril : doux (températures légèrement supérieures aux normales de saison) et globalement bien arrosé, surtout en fin de mois. La première décade s'avère douce et ensoleillée ; une dépression survient à partir du 9 et un vent d'ouest jusqu'à 54 km/h à Marcé apporte des précipitations peu importantes. Un temps instable s'installe ensuite en Anjou jusqu'au 20 et s'accompagne même de quelques épisodes pluvieux ; le soleil est de retour du 21 au 26. Plusieurs séries d'intempéries sont à signaler durant le mois : du brouillard les 3 et 6, des orages les 14, 15, 16 et 28 localement accompagnés de chutes de grêle et de vent (60 km/h à Martigné-Briand). Aucune gelée n'est à mentionner, ce qui demeure peu fréquent pour un mois d'avril en Anjou.

Mai : s'avère relativement instable mais en moyenne chaud et bien ensoleillé, malgré des pluies irrégulières. Début mai, une zone de haute pression se maintient sur l'Ouest de la France, c'est donc un temps plutôt calme et ensoleillé qui prédomine en Anjou, avec parfois quelques brumes matinales. L'arrivée d'une perturbation par l'ouest amène des pluies le 9. Un temps variable et assez agité s'installe ensuite durant la deuxième décade, avec des épisodes orageux du 10 au 14 et pluvieux sur tout le département du 15 au 18. Le temps redevient sec et chaud le 20, mais provoque à nouveau des orages les 24 et 25 avec des rafales de vent à 58 km/h enregistrées à Fontaine-Guérin. La grisaille de fin de mois précède l'arrivée d'un anticyclone généreux et le retour en force du soleil les 29 et 30.

Juin : globalement sec et chaud, surtout en fin de mois où des températures estivales dépassant les 30 °C sont relevées dans le département. Peu d'épisodes pluvieux et venteux sont à signaler au cours du mois, hormis le passage d'une dépression du 6 au 10, et un épisode orageux le 30.

Sources : Météo France, Banque Hydro

FAITS MARQUANTS ORNITHOLOGIQUES DE LA PÉRIODE

Anatidés

Cygne chanteur *Cygnus cygnus** : découvert le 5.3 sur les prairies de la Baumette, l'individu sera revu jusqu'au 7.4 (CHD+). Il s'agit du plus long stationnement de l'espèce dans le département (1 mois et 2 jours) et de la donnée la plus tardive.

Oie cendrée *Anser anser* : encore 1 ind. le 3.4 à la Baumette. Un individu est noté le 21.6 au lac du Verdon (origine ?).

www.lpo.fr



Bernache du Canada *Branta canadensis* : 1 du 3.4 au 6.4 à la Baumette ; 2 en vol le 3.5 à la Pointe.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : espèce donnant lieu à de nombreuses observations sur la Loire et en vallée de la Tau au cours des mois d'avril et mai. L'espèce est également notée aux Bretonnières le 11.4 avec 3 ind. et aux Youis le 15.4 avec 1 mâle. Concernant la reproduction il est noté 1 couple avec 8 poussins de 20 jours le 7.6 sur la station d'épuration du Mesnil-en-Vallée (site connu depuis des années), 1 couple avec 9 poussins de 3-4 jours le 9.5 sur la station d'épuration de La Chapelle Saint-Florent (nouveau site).

Canard siffleur *Anas penelope* : dernier signalé le 3.4 avec 1 individu sur la Baumette.

Canard chipeau *Anas strepera* : 4 mâles le 7.5 aux Bretonnières ; 1 mâle le 3.5 au Verdon ; 1 mâle le 10.5 à La Bohalle ; 1 couple les 16 et 18.5 aux Monteaux ainsi qu'un couple le 22.6 aux Bretonnières. Aucune donnée de reproduction pour ce printemps malgré quelques observations tardives... à creuser la saison prochaine dans le cadre de l'enquête nationale sur les Anatidés et limicoles nicheurs.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* : 2 le 5.4 à Chevigné et encore 1 mâle le 28.5 à La Bohalle, seules données pour la période considérée ce qui ne laisse pas envisager la nidification de l'espèce...

Canard pilet *Anas acuta* : env. 60 le 3.4 sur les prairies de la Baumette, derniers notés le 5.4 avec 2 individus à Chevigné.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : peu d'oiseaux notés ce printemps, 1 le 3.4 sur la Baumette, 1 le 5.4 aux Youis, 1 le 5.4 à Chevigné, 1 couple le 11.4 et 1 le 15.4 aux Bretonnières, 1 couple le 18.4 à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1 couple au Gué de Linorges le 18.4 et revu à plusieurs reprises, 1 mâle le 3.5 à Champtocé-sur-Loire, 1 couple le 16.6 au CET de la Séguinière, 1 mâle et 1 femelle le 22.6 aux Bretonnières. Pas de preuve certaine de reproduction, espèce discrète à rechercher en mai/juin dans les boires, bras-morts, grands fossés et zones inondées tranquilles et riches en végétation notamment dans les BVA...



*Couple de Sarcelles d'été
- Gué de Linorge, 18.4.09 -*

Canard souchet *Anas clypeata* : 18 le 1.4 aux Youis, 117 le 3.4 et 23 le 15.4 sur la Baumette, 4 le 26.4 au Mesnil-en-Vallée et 7 au Verdon, 1 mâle le 4.5 et



www.lpo.fr



1 femelle avec **11 poussins** le 8.5 aux Bretonnières, 1 couple le 3.5 et 1 femelle avec **7 jeunes** le 21.6 au Verdon, 4 le 22.6 aux Bretonnières et 3 le 25.6 à Chevigné. À souligner l'absence de données sur les principaux sites de reproduction (BVA et lac de Maine).

Fuligule milouin *Aythya ferina* : entre autres, 39 le 11.4 aux Hayes, 25 le 30.5 et 31 le 31.5 à Chevigné. Côté nidification, 1 femelle avec **7 poussins** et 1 avec **1 poussin** le 29.5 à l'étang de la Thibaudière/La Plaine, 1 avec **4 poussins** à l'étang du Daillon/Somloire le 29.5, **1 nichée** observée le 18.6 à l'étang du Fourneau/La Prévrière et 1 femelle avec 7 poussins de 20 jours et au moins 5 juvéniles sur l'étang de La Brelaudière le 26.6. Des prospections régulières de mai à juillet dans les principaux secteurs de reproduction de l'espèce (étgs des Mauges, du Segréen et étg des Hayes) et partout où des oiseaux stationnent régulièrement (plans d'eau aux alentours de Chevigné, marais de Montreuil-Juigné) permettraient de mieux cerner les effectifs nicheurs du département. Une visite de toutes les pièces d'eau, même celles de très petite taille, en périphérie des sites de rassemblement habituels pourrait s'avérer très fructueuse...

Deux contrôles de 2 oiseaux, l'un bagué dans la Marne et l'autre en Loire-Atlantique.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : 1 le 1.4 aux Youis, 8 le 5.4 à Chevigné, 8 le 15.4 aux Bretonnières, 1 couple le 26.4 au Verdon, 1 couple le 8.5 aux Bretonnières, 1 mâle le 3.5 au Verdon, 1 mâle le 30.5 à Chevigné, 1 couple le 31.5 aux Hayes, **1 nichée** observée le 18.6 à l'étang du Fourneau/La Prévrière.

Fuligule milouin x F. nyroca *Aythya ferina* x *A. nyroca* : 1 mâle présentant les caractéristiques de cet hybride le 4.4 à Chevigné.

Fuligule milouin x Nette demi-deuil *Aythya ferina* x *Netta peposaca* : 1 mâle présentant les caractéristiques de cet hybride sur l'étang de La Brelaudière le 26.6 (identification d' A. Fossé qui l'a revu sur Chevigné).

Macreuse brune *Melanitta fusca** : le mâle immature de Chevigné est en place jusqu'au 4.4 (49 jours de présence ; CHD+) tandis que la femelle des Youis prolonge son remarquable stationnement jusqu'au 22.4 (**96 jours de présence** ; CHD+) ce qui constitue la date la plus tardive de présence en Maine-et-Loire (cf. chronique précédente).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* : 1 mâle paraissant cantonné le 18.6 à l'étang du Fourneau.

Podicipédidés

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 1 les 1^{er} et 11.4 aux Youis, 6 le 12 puis 2 le 14.4 au lac de Maine, et 3 le 3.5 au Verdon. Concernant la nidification, nouveaux cas aux Bretonnières avec 3 couples : un produisant **3 jeunes**, les deux autres **2 jeunes**. Sur Chevigné où l'espèce s'est déjà reproduite, 3 ad. sont observés les 2 et 12.4, 2 les 18 et 25.5 puis de nouveau 3 le 31.5, 1 juvénile isolé est noté



www.lpo.fr



sur le site les 22 et 25.6 (ce dernier n'est probablement pas né sur place). À l'étang des Hayes où l'espèce est susceptible de se reproduire, 2 ind. sont notés le 31.5 puis 1 le 19.6.

Phalacrocoracidés

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* : au moins **23 nids** occupés notés au lac de Maine (installation en 2008 sur le site avec 13 nids), également **6 nids** au Fourneau (11 en 2008), ainsi que **2 nids** sur un étang privé du NO du département (nouveau site de reproduction).

Données de baguage : 45 contrôles de 9 oiseaux (8 Français et 1 Anglais)

Ardéidés

Blongios nain *Ixobrychus minutus** : observation d'un couple à partir du 25.6 sur un petit étang du Sud-Saumurois (CHD±), les oiseaux paraissent cantonnés... Il se pourrait que l'espèce se soit déjà reproduite sur le site l'année dernière : observation fin août 2008 d'un Ardéidé ressemblant à un juvénile de l'espèce. Espèce fréquemment observée dans les années 1960-1980 (avec preuves de reproduction), les données se sont ensuite raréfiées au cours des années 1990. Depuis 2000 l'espèce ne fait plus l'objet de mentions annuelles. Ces dernières années il y a un possible retour de l'espèce : 2 chanteurs en 2008 aux Monteaux.



Blongios nain, 25.6.09 - dessin, Mickaël JUMEAU.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : il est possible d'envisager **4-5 couples** au lac de Maine (8-9 nichées en 2008). Quasiment aucune observation en dehors de ce site, excepté : 1 ind. le 1.6 en train de s'alimenter à l'étang Saint-



www.lpo.fr



Nicolas, 1 en vol le 16.6 au dessus du lycée du Fresne/Sainte-Gemmes-sur-Loire et 2 ind. en vol le 23.6 au dessus de la place de la Rochefoucault/Angers.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* : 1 le 20.5 s'alimentant dans un fossé sur les prairies de la Baumette. Le même jour 2 ind. en plumage nuptial sont observés dans la saulaie du lac de Maine, ces derniers sont vus sur le site à plusieurs reprises jusqu'au 2.6. Durant la période ces derniers ont paradé, des transports de matériaux ont également été observés... mais aucun signe certain de reproduction. Il s'agit du premier cas documenté de tentative de reproduction de l'espèce dans le département, les oiseaux ayant stationné en 2008 sur le même site ne présentaient pas le comportement d'individus nicheurs.

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* : toujours deux sites de reproduction pour l'espèce dans le département. Le nombre de couples nicheurs en Maine-et-Loire est estimé à **65-80** : une quinzaine sur un étang privé du NO et 50-65 au lac de Maine. L'espèce semble avoir souffert de la vague de froid de cet hiver. En effet, depuis son installation au lac de Maine en 2004, l'effectif nicheur n'avait cessé d'augmenter pour atteindre 85-90 couples nicheurs en 2008.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : découverte d'un troisième site de reproduction dans le département. **Deux nids avec poussins** sont notés le 16.6 au sein d'une héronnière mixte (Héron cendré et H. pourpré) sur un étang privé du NE. Au lac de Maine, principal site de reproduction il est possible d'envisager **25-30 couples** (31-35 en 2008) et sur le second site de reproduction une **dizaine de couples**.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* : observations de quelques ind. en plumage nuptial à proximité de héronnières mais pour l'instant aucun cas de reproduction noté. Un individu bagué, contrôlé à deux reprises à Cheigné, en provenance du lac de Grand-Lieu (44).

Héron cendré *Ardea cinerea* : au moins 4 nouvelles petites colonies découvertes, 2 nids occupés le 30.4 au Bois d'Anjou, 3 nids à l'étang de l'Égoût, 2 nids avec chacun 2 jeunes en forêt de Leppo et également 3 nids occupés à la déchetterie de Mûrs-Erigné et 10 nids au lieu-dit Le Plessis Bevereau sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Au lac de Maine, il est possible d'envisager **65-70 couples** (82 en 2008).

Héron pourpré *Ardea purpurea* : **5 nids** occupés sur le site principal de reproduction de l'espèce en Maine-et-Loire (étang privé du NE). Comme chaque année l'espèce est observée à plusieurs reprises aux Hayes : 1 le 21.4 et 1 ind. entrant dans la roselière le 2.6. Les observations réalisées aux Monteaux laissent envisager un cas de reproduction sans pour autant qu'il y ait d'indices certains : 1 ad. les 14 et 29.5 et 2 ind. le 12.6. À noter également 1 possible cas de reproduction dans la roselière d'un étang privé du quart NO : 1 ind. observé les 26.4 et 21.6. Concernant les observations ponctuelles hors site de reproduction notons 1 ind. le 19.6 à l'étang de la Couaille ainsi qu'un individu le



www.lpo.fr



25.6 s'alimentant dans le Couesnon, en limite nord de la commune de Beaufort-en-Vallée.

Ciconiidés

Cigogne noire *Ciconia nigra* : 1 à la Croix Tiran/Vernoil le 20.4 ; 1 le 24.4 s'alimentant dans un fossé à l'hippodrome de Verrie ; 1 en vol le 15.6 au-dessus de l'île de Chalennes ; 1 sur la Loire du côté de Saumur le 18.6. Reproduction certaine, au moins un nid avec **3 jeunes**, dans le massif forestier du NE du département.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : dans la continuité des observations du début d'année (cf. chronique précédente), l'espèce est notée à de nombreuses reprises. Le 16.4 à Chemillé 1 ind. en vol ; 1 en alimentation le 17.4 au Pré de l'Abbesse ; 5 en vol le 14.4 à Vihiers ; 4 dans la matinée du 23.4 puis 2 dans l'après-midi sur le communal de Soulaire-et-Bourg, l'une de ces dernières est baguée (originaire de Charente-Maritime) ; 1 ind. en Loire amont entre La Bohalle et Saint-Mathurin le 30.5 ; 4 le 7.6 à Vivy ; plusieurs sont signalées en vol, le 12.6 à Saint-Hilaire Saint-Florent et le 19.6 à hauteur de la boire des Trois Œufs ; 1 ind. les 21 et 22.6 à Saint-Germain-des-Prés. À noter également, le stationnement de 2 oiseaux du 2.5 au 9.6 à Martigneau/Juigné-sur-Loire, ces individus étaient porteurs de bagues au niveau des tarses (une en métal et une bleue en forme de ressort) traduisant probablement une origine captive.



www.lpo.fr



[LAWN(←ASTX) ; RAM(CK1443)]

- bagué poussin le 4.6.07 à Saint-Laurent-de-la-Prée (17) -



Dates d'arrivée 2009 des migrateurs en Maine-et-Loire

| Espèces | Arrivée 2009 | Record | Moyenne (1961-2009) | n | Écart-type |
|---------------------------|--------------|-----------|---------------------|----|------------|
| Blongios nain | | 20.3.1980 | 14.5 | 27 | 19 |
| Bihoreau gris | | 11.3.1994 | 15.4 | 17 | 24 |
| Héron pourpré | 10.4 | 23.3.1979 | 10.4 | 39 | 7 |
| Cigogne noire | 27.3 | 3.3.1990 | 24.3 | 25 | 20 |
| Cigogne blanche | 15.1 | 11.1.2003 | 15.3 | 31 | 39 |
| Spatule blanche | 27.2 | 22.1.1993 | 22.3 | 22 | 27 |
| Sarcelle d'été | 9.3 | 2.2.1985 | 2.3 | 48 | 10 |
| Bondrée apivore | 26.4 | 21.3.1992 | 25.4 | 40 | 14 |
| Milan noir | 17.3 | 21.2.1985 | 15.3 | 42 | 17 |
| Circaète Jean-le-Blanc | 15.3* | 15.3.2009 | 6.4 | 38 | 17 |
| Busard cendré | 10.4 | 11.3.1990 | 10.4 | 41 | 8 |
| Aigle botté | | 12.4.1982 | 9.5 | 8 | 20 |
| Balbuzard pêcheur | 16.3 | 10.3.2002 | 2.4 | 31 | 17 |
| Faucon hobereau | 9.4 | 22.3.1991 | 14.4 | 41 | 9 |
| Caille des blés | 2.3 | 2.3.2009 | 27.4 | 41 | 14 |
| Râle des genêts | 31.3 | 14.3.1999 | 11.4 | 45 | 9 |
| Marouette ponctuée | | 27.2.1989 | 24.4 | 18 | 32 |
| Outarde canepetière | 11.3 | 3.3.1985 | 30.3 | 32 | 18 |
| Petit Gravelot | 11.3 | 1.3.1997 | 22.3 | 48 | 12 |
| Barge à queue noire | 7.2 | 22.1.1989 | 8.2 | 49 | 9 |
| Sterne pierregarin | 11.3 | 4.3.1998 | 22.3 | 48 | 9 |
| Sterne naine | 19.4 | 30.3.1997 | 27.4 | 45 | 10 |
| Guifette moustac | 11.4 | 19.3.2005 | 26.4 | 39 | 16 |
| Guifette noire | 14.4 | 3.4.2004 | 21.4 | 46 | 9 |
| Tourterelle des bois | 15.4 | 25.3.1973 | 18.4 | 47 | 10 |
| Coucou gris | 15.3 | 25.2.1994 | 23.3 | 47 | 10 |
| Petit-duc scops | | 8.4.1991 | 26.4 | 10 | 15 |
| Engoulevent d'Europe | 6.5 | 1.4.1986 | 1.5 | 30 | 13 |
| Martinet noir | 5.4 | 1.4.2006 | 11.4 | 49 | 6 |
| Huppe fasciée | 14.3 | 5.3.1992 | 26.3 | 45 | 11 |
| Torcol fourmilier | | 3.3.1997 | 18.4 | 33 | 19 |
| Hirondelle de rivage | 26.2 | 18.2.2001 | 19.3 | 48 | 16 |
| Hirondelle rustique | 1.3 | 15.2.1998 | 12.3 | 48 | 8 |
| Hirondelle de fenêtre | 23.3 | 3.3.2000 | 27.3 | 42 | 12 |
| Pipit rousseline | | 5.4.1993 | 3.5 | 22 | 18 |
| Pipit des arbres | 31.3 | 16.3.1987 | 31.3 | 43 | 7 |
| Bergeronnette printanière | 26.3 | 10.2.2001 | 27.3 | 48 | 12 |
| Bergeronnette flavéole | 30.3 | 22.3.1987 | 7.4 | 39 | 8 |
| Bergeronnette nordique | | 9.4.1983 | 24.4 | 13 | 11 |
| Rosignol philomèle | 31.3 | 22.3.1997 | 5.4 | 47 | 6 |
| Gorgebleue à miroir | | 21.3.1968 | 10.4 | 3 | 27 |
| Rougequeue à front blanc | 4.4 | 7.3.1994 | 4.4 | 45 | 13 |
| Tarier des prés | 2.4 | 8.3.1992 | 11.4 | 45 | 12 |
| Traquet motteux | 2.3 | 23.2.1998 | 19.3 | 46 | 12 |
| Merle à plastron | | 10.3.1995 | 10.4 | 23 | 12 |
| Locustelle tachetée | 8.4 | 9.3.1986 | 10.4 | 38 | 9 |
| Locustelle lusciniöide | | 13.4.1963 | 30.4 | 17 | 14 |



www.lpo.fr



| Espèces | Arrivée 2009 | Record | Moyenne (1961-2009) | n | Écart-type |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------|----|------------|
| Phragmite des joncs | | 25.3.2000 | 11.4 | 40 | 10 |
| Rousserolle verderolle | | 7.5.2004 | 30.5 | 7 | 17 |
| Rousserolle effarvatte | | 13.4.1996 | 24.4 | 33 | 7 |
| Rousserolle turdoïde | | 19.4.1973 | 11.5 | 12 | 14 |
| Hypolaïs polyglotte | 20.4 | 18.4.2008 | 27.4 | 39 | 6 |
| Fauvette grisette | 5.4 | 28.3.1976 | 5.4 | 47 | 6 |
| Fauvette des jardins | 20.4 | 28.3.1981 | 15.4 | 39 | 10 |
| Pouillot de Bonelli | 5.4 | 21.3.1993 | 9.4 | 38 | 10 |
| Pouillot siffleur | 24.4 | 2.4.1994 | 21.4 | 35 | 9 |
| Pouillot fitis | 13.3 | 3.3.1985 | 25.3 | 46 | 7 |
| Gobemouche gris | 8.5 | 8.4.1973 | 2.5 | 38 | 12 |
| Gobemouche noir | 12.4* | 7.4.2001 | 21.4 | 24 | 10 |
| Loriot d'Europe | 6.4* | 2.4.2006 | 24.4 | 44 | 9 |
| Pie-grièche écorcheur | 29.4 | 15.4.1990 | 8.5 | 31 | 9 |
| P-gr. à tête rousse | 5.5 | 21.4.1995 | 12.5 | 13 | 11 |
| Bruant ortolan | | 13.4.1990 | 10.5 | 8 | 15 |

Threskiornithidés

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : 1 le 5.4 puis 2 le 25.5 à la Baumette.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* : seulement deux données pouvant se rapporter au passage pré-nuptial, 7 ind. sont notés le 4.4, volant plein nord au-dessus de la Baumette, et 1 le 5.4 au Sol de Loire. Le reste des observations concerne des ind. seuls : 1 le 23.5 sur l'île de Montsoreau, 1 les 29 et 31.5 à Cheigné et 1 en vol le 16.6 notée au lac de Maine. Après la première nidification en 2006 au lac de Maine (HALLIGON *et al.*, 2006), l'espèce se reproduit pour la deuxième année consécutive sur un étang privé du nord-ouest du département : 1 couple produisant 2 jeunes.

Accipitridés

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : première signalée le 24.4.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : 2 le 23.4 à Louerre, 1 le 17.5 au coteau de Pont-Barré, 1 le 25.5 en chasse à Mozé-sur-Louet au lieu-dit Les Baunâts et 1 à Épièds au lieu-dit La Fouquelinère. Sur les **4 couples** connus et suivis, un seul a mené un jeune à l'envol.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 1 femelle ad. et mâle sur deux sites différents à Montreuil-Bellay le 15.4, 1 le 21.5 au lieu-dit Charotin à Doué-la-Fontaine ; 1 couple sur le camp militaire de Fontevraud échouant dans sa reproduction, nouveau cas atypique quant au milieu occupé (lande) après celui de 2008 en plaine céréalière.

Busard cendré *Circus pygargus* : premier signalé (1 mâle) le 10.4 à Montreuil-Bellay. 35 nids précisément localisés en Maine-et-Loire ainsi que 6 en limite de département (2 en Deux-Sèvres et 4 en Vienne), essentiellement installés dans



www.lpo.fr



des parcelles de blé (un est découvert dans une luzerne et un en ray-grass). Le programme de baguage et marquage mené par Thierry PRINTEMPS concerne cette année : 18 ad. nicheurs nouveaux (11 femelles, 7 mâles) ainsi que 62 jeunes bagués (25 femelles, 37 mâles) dont 58 sont équipés de marques alaires. De plus, 12 mâles et 19 femelles supplémentaires sont contrôlés par lecture des marques. À noter qu'à partir de 2010, il n'y aura plus de marquage alaire sur les poussins, ils seront uniquement bagués.

Pandionidés

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : passage prénuptial marqué jusqu'au 19 mai avec 1 ind. porteur d'une bague verte, à Varennes-sur-Loire. Dans la continuité du stationnement observé sur la plateforme de la Baumette, 1 ind. est observé le 13.4 (cf. chronique précédente). De même, plusieurs observations ont lieu dans le secteur des prairies de la Gaulerie/Saint-Georges-sur-Loire, ne permettant pas toutefois d'envisager une reproduction.

Falconidés

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : premier signalé le 9.4 en lisière de la forêt de Linières.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : l'individu qui stationnait sur la cathédrale Saint-Maurice d'Angers depuis le 19.11 (cf. chronique du 4^e trimestre 2008), est vu pour la dernière fois le 13.4. Au cours de la semaine qui a précédé son départ, l'oiseau a semble-t-il nettement augmenté sa fréquence de chasse... recharge des « batteries » avant le retour vers le site de nidification ?

Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : 23 mâles chanteurs minimum recensés au printemps sur les sites habituels de nidification ; 9 plumages femelles ont pu être identifiés au maximum lors du comptage concerté du 26.4. Trois mâles sont à nouveau localisés sur les secteurs de la butte de Coulon et d'Antoigné, en dehors du périmètre de la ZPS et ce pour la troisième année consécutive. Le suivi de la reproduction a permis d'observer 5 jeunes volants et 3 nids ont été découverts dont un encore occupé le 8.7 (comportant 1 œuf).

À noter que deux cas de collision de mâles avec la ligne THT sont notés les 26.4 et 8.7 au lieu-dit La Frondellée/Montreuil-Bellay.

Rallidés

Râle des genêts *Crex crex* : les prospections printanières dans le cadre de l'enquête nationale 2009 ont permis d'estimer à 230-246 le nombre de mâles chanteurs (détails ci-après).



www.lpo.fr



© F. CAUET

Mâle de Râle des genêts, Baillie de Noyant, 17.5.09

Enquête nationale Râle des genêts 2009

| Secteur | Site | Effectif |
|------------------------------|---|----------------|
| Loire aval | Vallée de la Tau | 3 |
| | Prairie Bruneau | 2-3 |
| | Prairies de Saint-Germain-des-Prés | 3 |
| | Embouchure du Layon-l' Onglée-Chaudefonds | 2 |
| | la Grand Prée et abords | 3 |
| | Pont de l' Alleud | 3 |
| | Île de Béhuard/Savennières | 1 |
| | Prairie de Saint-Jean-de-la-Croix | 2-3 |
| Total Loire aval | | 19-21 |
| BVA | Prairies de la Baumette | 12 |
| | Île Saint-Aubin et abords | 35 |
| | Prairies de Cantenay-Épinard | 11-13 |
| | Prairies de Noyant | 22 |
| | Communal de Soulaire/Briollay | 13-15 |
| | Prairies de Vallèvres | 20-21 |
| | Prairies rive gauche de la Sarthe, Briollay/Vérigné | 1 |
| | Prairies d'Écouflant | 24-26 |
| | Bec du Loir | 12-14 |
| | Communal de Tiercé + Porte-Bise | 18 |
| | Prairies de Cheffes | 11-13 |
| | Moulin d'Ivray | 10-11 |
| | Prairies du Davier | 7-8 |
| | Prairies entre le marais de la Cave et Souvigné | 2 |
| | Commun du Touchet | 5 |
| Commun de Soucelles + abords | 6-7 | |
| Prairies de la Varenne | 2 | |
| Total BVA | | 211-225 |
| Total Maine-et-Loire | | 230-246 |





Haematopodidés

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 le 5.5 à La Bohalle.

Récurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : 2 à La Bohalle le 4.4.

Charadriidés

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : habituel passage de mai sur la Loire entre le 10.5 et le 5.6 (max. de 18 le 20.5).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 1 le 10.5 entre La Bohalle et Saint-Mathurin-sur-Loire.

Scolopacidés

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 2 le 5.5 à La Bohalle, 6 le 22.5 à La Daguenière.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : passage entre le 29.4 et le 29.5 (max. de 3 le 29.4 sur la Loire et le 5.5 aux Bretonnières).

Bécasseau minute *Calidris minuta* : 1 le 5.4 aux Youis et 1 le 19.5 entre Saumur et Montsoreau.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii** : 2 le 24.4 à Saint-Rémy-la-Varenne (CHD?).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 1 le 21.5 entre La Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire.

Bécasseau variable *Calidris alpina* : passage entre le 24.4 et le 5.6 (max. de 4 le 29.4).

Combattant varié *Philomachus pugnax* : dernière observation du printemps à Saint-Mathurin-sur-Loire avec 1 le 6.4.

Barge rousse *Limosa lapponica* : 1 le 29.4 à Chemillé.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : 1 le 11.4 aux Youis, 1 aux Ponts-de-Cé le 18.4, 1 le 24.4 à Chalennes et 5 à Chemillé le 29.4.

Courlis cendré *Numenius arquata* : probablement 9-10 couples reproducteurs cette année avec 3 à Méron/Douvy, 2 en Loire aval (vallée de la Tau et prairies de Saint-Germain-des-Prés) et 4-5 dans les BVA (1 sur la Baillie de Noyant, 1 sur le communal de Soulaire, 1 sur Tiercé et 1 ou 2 sur les prairies de Soucelles/Villevêque). Seul le couple du communal de Soulaire-et-Bourg a donné lieu à l'observation d'un jeune.



www.lpo.fr



Juvénile de Courlis cendré
- Communal de Soulaire-et-Bourg, 26.6.09 -

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* : 1 le 7.5 aux Bretonnières, 2 les 20-22.5 à La Bohalle.

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : 76 le 10.4 aux Bretonnières, après installation **70 couples nicheurs** sont estimés. La reproduction concerne également **2 couples** sur Montsoreau et **1** aux Monteaux. Aux Bretonnières 43 contrôles de 12 oiseaux sont effectués : 5 Belges, 2 Français, 1 Danois, 1 Hollandais, 1 Hongrois, 1 Polonais et 1 Serbe. On notera également la présence de 6 ad. le 2.5 à La Pointe.

Mouette pygmée *Larus minutus* : quelques observations d'adultes en avril, 2 le 13.4 et 1 le 16.4 aux Bretonnières, 1 le 28.4 au Verdon et 1 le 4.5 à La Pointe.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : **430 couples** nicheurs aux Bretonnières, **65** en Loire amont, **80** sur les radeaux du plan d'eau au Sol de Loire et **48** aux Monteaux.

Goéland cendré *Larus canus* : 1 le 6.4 sur les prairies de La Baumette et 1 couple ce même jour sur la Loire à l'entrée de Saint-Mathurin-sur-Loire.

Goéland leucophée *Larus michahellis* : **23 couples** nicheurs sur Loire entre l'île de Montsoreau et Les Ponts-de-Cé. Également **2 autres couples**, l'un aux Bretonnières l'autre au Sol de Loire.





Goéland marin *Larus marinus* : 1 immature le 17.6 en face de La Pointe.

Goéland argenté *Larus argentatus* : au moins **1 couple** nicheur sur l'île de Montsoreau.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla** : 1 ad. en plumage hivernal le 16.4 aux Bretonnières (CHD?), au sein du dortoir de Mouettes rieuses.

Sternidés

Sterne naine *Sternula albifrons* : première le 28.4 à la Pointe et 6 le 2.5 au même endroit. Concernant la nidification, on note **54 couples** en Loire aval et **120** en Loire amont, ainsi que **6 couples** aux Monteaux.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia** : 1 le 12.4 sur l'île de Montsoreau (CHD?) et 2 le 1.6 de passage au Thoureil (CHD+).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* : première le 11.4 avec 1 ad. aux Bretonnières. Observations régulières ensuite de la mi-avril à la fin de la période avec un effectif maximal de 7 le 26.4 au Verdon.

Guifette noire *Chlidonias niger* : premières le 14.4 avec 2 ind. à La Daguenière. Observations régulières ensuite tout au long de la période le plus souvent à l'unité. Maximum de 6 le 29.5 à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : 4 le 6.4 à Saint-Mathurin-sur-Loire et 3 le 6.5 descendent la Loire à la Pointe.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : **270 couples** nicheurs notés en Loire amont, 1 seul en Loire aval. Également **96 couples** au Sol de Loire et **1** aux Monteaux.

Columbidés

Tourterelle des bois *Sterptopelia turtur* : les deux premiers individus sont observés autour de la mi-avril sur la commune de Montreuil-Bellay, le 16.4, soit 2 jours avant la date moyenne.

Strigidés

Hibou des marais *Asio flammeus* : 1 ind. observé les 12 et 14.5 sur la plaine de Méron, pas revu par la suite.

Caprimulgidés

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : 5 individus sont observés en parade le 6.5 au domaine de Boudré sur la commune de Seiches-sur-le-Loir. Cette observation, la première rapportée, est conforme aux dates habituelles d'arrivée même s'il est fort probable que l'Engoulevent soit présent plus tôt. À noter, le 16.6, un couple et un mâle contactés dans les landes de l'étang Saint-Nicolas ; l'espèce est notée sur le site pour la deuxième année consécutive.



www.lpo.fr



L'abbé VINCELOT (1872) mentionnait déjà la présence d'engoulevants autour de l'étang Saint-Nicolas au cours du XIX^e siècle.

Apopidés

Martinet noir *Apus apus* : classiquement, les premiers font leur apparition au début du mois d'avril, 1 individu aux Bretonnières ainsi que 2 autres à la Pointe le 5.4 puis 1 individus à Parnay le 9.4. Cette arrivée est précoce par rapport à la moyenne (11.4) mais est identique à l'année précédente.

Alcédinidés

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* : c'est certainement l'espèce qui a le plus souffert de la vague de froid de l'hiver (températures en janvier inférieures à -4/-7 °C entre le 4 et le 11 au matin, avec jusqu'à -13,9 à Montreuil-sur-Loir le 7 janvier)... Peu d'observations ont été rapportées, 15 données sur 13 sites, et bon nombre d'observateurs ont constaté une diminution des observations. L'espèce est connue pour être particulièrement sensible aux vagues de froid (LIBOIS & HALLET-LIBOIS, 1989 ; YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1991).

Méropidés

Guêpier d'Europe *Merops apiaster** : c'est au cours de ce printemps que sont constatés les 3^e et 4^e cas de reproduction de l'espèce en Maine-et-Loire. Cinq individus sont tout d'abord observés posés et en chasse autour de l'île du Buisson en aval du pont de Saint-Mathurin-sur-Loire le 20.5. **Un terrier occupé** est découvert le 17.6, en amont du même pont. D'autres observations auront lieu notamment le 24.6 où le couple est observé entrant dans le nid. Un **second couple** sera découvert le 8.7 plus en amont sur la rive opposée avec **deux jeunes** nourris à tour de rôle par les adultes (CHD?).

La première reproduction date de 2005 où un couple installé dans une carrière de la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux (RAITIÈRE & NOURRY, 2008) parviendra à élever 3 jeunes. En 2008, un autre cas de reproduction a eu lieu en Loire amont où un couple nourrissait un ou plusieurs jeunes mais ce comportement s'est arrêté brusquement du jour au lendemain (dérangement probable).

Picidés

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : un seul chanteur mentionné le 28.6 à La Breille-les-Pins.

Pic cendré *Picus canus** : 1 individu répond à la repasse le 1.5 en forêt de Leppo dans les Mauges (CHD±), bien loin de ses bastions historiques. Un autre passage le 14 mai confirme la présence de l'espèce, un mâle, qui répond à nouveau à la repasse et est brièvement aperçu. Un autre mâle est observé dans le massif de la Breille les pins le 19.06 (CHD+). La dernière observation date de 1995 dans le



www.lpo.fr



Segréen. Dans les années 1990, le nombre de couples estimés était inférieur à 10 (BEAUDOIN, 2008).

Motacillidés

Pipit rousseline *Anthus campestris* : 1 ind. en vol sur la commune de Saint-Cyr-en-Bourg le 24.4 et 2 ind. le 28.4 posés et loquaces sur la commune de Parnay...

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima* : 2 en stationnement à la Pointe le 2.3 et également 1 ind. observé aux Youis le 15.4.

Turdidés

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica** : 1 mâle le 14.4 à Méron (CHD+).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : 1 mâle le 4.4 et 3 femelles capturées le 17.4 à Tiercé, et 1 femelle le 23.4 dans les landes de Louerre. Retour remarqué de l'espèce sur quelques sites du Saumurois, avec 1 chanteur le 29.5 à Verrie, 2 à Dampierre-sur-Loire et 2 à Saumur le 28.5. À noter, aucun contact le 19.6 dans parcelles favorables du massif de Chandelais.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* : observation d'un mâle bagué, les 18.4 et 11.5 Baillie de Noyant. Individu âgé d'au moins 3 ans.



[LBG,M(5939108);RBN,N]

- bagué le 24.4.07 sur la Baillie de Noyant -



www.lpo.fr

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* :
1 ind. observé le 16.4 à Angers sur
l'esplanade du quai Tabarly et
migrateur le 1.5 à Yzernay.



Grive litorne *Turdus pilaris* : dernière signalée le 8.4 à Chandelais.

Sylviidés

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* : l'espèce semble avoir bien surmonté la vague de froid de l'hiver. Plus de 25 données enregistrées sur au moins 20 sites durant la période considérée, dont probablement 6 chanteurs à la Baumette.

Locustelle tachetée *Locustella naevia* : retour de l'espèce le 8.4 à Louerre. Des chanteurs sont ensuite signalés en mai et juin sur plusieurs sites des BVA et sur Fontevraud.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : un possible nicheur local capturé le 23.5 à Fontevrault, rare mention récente de l'espèce dans le département en période de nidification.

Oriolidés

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : observation précoce d'un mâle le 6.4* à Brion (CHD+)

Laniidés

Pie-grièche à tête rousse* *Lanius senator* : 1 mâle dans les buissons au lac de Maine (CHD?) et 1 ind. à Daumeray le 6.5 (CHD?).

Fringillidés

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* : encore une femelle au lac de Maine le 5.4.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : un groupe criant en vol le 2.6 en forêt de Milly.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* : quelques rares données en période de nidification autour d'Angers, avec 2 ind. près du parc de la Boissière à Avrillé le 4.6, 1 le 7.6 à Bauné et toujours 1 à 2 oiseaux jusqu'au 19.6 au moins à Beaucouzé (cf. chronique précédente).





Embérizidés

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : 1 mâle porteur de bagues colorées le 12.5 sur la Baillie de Noyant, ind. âgé d'au moins 3 ans (bague [LBG,M(?); RBN,G] le 24.4.07 au même endroit).

LISTE DES OBSERVATEURS AYANT CONTRIBUÉ À CETTE SYNTHÈSE

J.-L. Allard, S. Angebault, A. Bajan, J.-Cl. Beaudoin, L. Bellion, A. Bertaudeau, É. Beslot, A. Besnard, D. & P. Bizien, J.-P. Boisdrion, J.-M. Bottereau, Cl. & Cl. Bretaudeau, F. Cauet, C. Charles, M. & N. Chassereau, M. & J.-F. Cogné, V. Combaud, S. Courant, S. Desgranges, D. Drouet, E. Dupoux, J. El Asri, C. Ettel, D. Farges, D. Ferrand, A. Fossé, « Fred », B. Gaudemer, A. Girard, P. Goupil, Fr. Groleau, Groupes de Chalonnes & de Saumur, Y. Guenescheau, E. Guillou, F. Halligon, L. Hauchecorne, S. Havet, S. Hénaff, B. Humeau, J.-L. Jacquemin, T.-M. Jammes, M. Jumeau, J. Laîné, L. Lavarec, R. Le Bihan, B. Legendre, H. Le Morvan, V. Leray, J.-M. Logeais, O. Loir, W. Maillard, B. Marchadour, C. Mazé, B. Mème-Lafond, M. Mérot, F. Moreau, J.-P. Moron, G. Mourgaud, F. Noël, P. Nourry, T. O'Hara, L. Papin, B. Poincet, T. Printemps, R. Provost, P. Raboin, F. Rayer, J.-P. Richou, A. Ruchaud, E. Séchet, V. Sottejeau, K. Suaudeau, M. Thomann, A. Tricaud, F. Trottin, F. Vaidie, M. Vernier, J.-D. Vrignault.

LISTE DES SITES ET DES COMMUNES ASSOCIÉES

Baumette (prairies de la)/Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire
Bois d'Anjou/Somloire ; Saint-Maurice-la-Fougereuse (79)
Boudré (domaine de)/ Seiches-sur-le-Loir
Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir
Brelaudière (étang de la)/Saint-Georges-sur-Loire
Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir
Chandelais (forêt de)/ Baugé, Bocé, Le Guédéniau, Lasse
Chevigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire
La Couaille (étang de)/Longué-Jumelles
Égoût (étang de l')/Chaumont-d'Anjou, Jarzé
Daillon (étang du)/Somloire
Fourneau (étang du)/La Prévière
Gué de Linorge (le)/Soulaire-et-Bourg
Hayes (étang des)/Brion, Longué-Jumelles
Leppo (forêt de)/Le Fief-Sauvin, Saint-Rémy-en-Mauges, le Puiset-Doré
Linières (forêt de)/Saint-Jean-de-Linières
Loges (étang/tourbière des)/La Breille-les-Pins
Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine
Méron (plaine de)/Montreuil-Bellay
Milly (forêt de)/Milly-le-Meugon



www.lpo.fr



Monteaux (carrière des)/Vivy
Montsoreau (île de)/Montsoreau
Noyant (Baillie de)/Soulaire-et-Bourg
Pointe (la)/ Bouchemaine
Pont-Barré (coteau du)/Beaulieu-sur-Layon
Saint-Aubin (île)/Angers
Saint-Nicolas (étang)/Angers, Avrillé, Beaucouzé
Sol de Loire/Montjean-sur-Loire
Tau (vallée de la)/Montjean-sur-Loire, Saint-Laurent-du-Mottay, Le Mesnil-en-Thibaudière (étang de la)/La Plaine
Trois Œufs (boire des)/La Possonnière
Vallée, Saint-Florent-le-Vieil
Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)
Verrie (hippodrome de)/Verrie, Rou-Marson
Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

BIBLIOGRAPHIE

BEAUDOIN J.-C., 2008. Oiseaux nicheurs et menacés des milieux boisés et landes de Maine-et-Loire. Résultats de l'enquête 1996-2001 et actualisation jusqu'à 2007. *Crex*, 10 : 27-60.

HALLIGON Fr., J-Cl. BEAUDOIN, FOSSÉ A., 2008. Nidification de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* au lac de Maine, Angers-Bouchemaine, Maine-et-Loire. *Crex*, 10 : 67-71.

LIBOIS & HALLET-LIBOIS, 1989. Expansion et regression : deux mots-clés de la dynamique des populations du Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*). *Aves*, 26 (numéro spécial) : 93-101.

RAITIÈRE W. & NOURRY P., 2008. Première nidification du Guêpier d'Europe *Merops apiaster* en Maine-et-Loire. Statut de l'espèce en Pays de la Loire. *Crex*, 10 : 61-66.

VINCELOT L'abbé, 1872. *Les noms des oiseaux expliqués par leurs mœurs. Essais étymologiques sur l'ornithologie*. Pottier de Lalaine, Paris. Tome I.

YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1991. *Atlas des oiseaux de France en hiver*. Société Ornithologique de France, Paris, 575 p.



www.lpo.fr