

Fiche de recherche

L'Aeschne velue-printanière – *Brachytron pratense*

Si cette espèce n'est pas la plus difficile de nos libellules à identifier, elle est en revanche très précoce, ce qui la fait le plus souvent passer inaperçue alors que les naturalistes ne sortent pas encore à la recherche des odonates. Cette fiche a ainsi pour but de vous inviter à mettre le nez dehors dès ce début de saison, à la recherche de l'Aeschne velue-printanière...

Comme toutes les aeschnidés, son comportement l'amène à prospecter longuement les rives des mares et des plans d'eau qu'elle fréquente, se posant peu. Mais son allure robuste et ses couleurs vives permettent en général de la distinguer des cordulidés. En tout début de saison, ses cousines l'Aeschne mixte ou l'Aeschne affine ne volent pas encore.

Que rechercher ?

Les imagos sont à rechercher en priorité. Cette espèce fréquente les eaux stagnantes permanentes riches en végétation d'hélophytes (carex, roseaux, massettes). Elle prospecte au milieu de cette végétation à faible hauteur et s'éloignant peu de l'eau

Mais on pourra aisément doubler cette recherche par la collecte d'exuvies dont la détermination est assez facile.

Brachytron pratense



Samir M., 2012

Où ?

Tous les plans d'eau et bras morts bien végétalisés, notamment en roseaux, sont à prospecter en priorité.

L'espèce est surtout connue de la Gironde, avec quelques localités connues dans les Landes et plus ponctuellement en Dordogne.

Elle est donc surtout à rechercher dans les landes de Gascogne, autour des secteurs connus du Médoc, le centre de la Gironde et activement dans les Landes, notamment le nord du département.

Des prospections précoces dans tous les départements permettraient sans doute d'améliorer la connaissance sur la distribution de cette espèce.

Femelle en train de pondre (Louchats – 33)




Samir M., 2012

Quand ?

C'est une des espèces les plus précoces, qui vole sur une courte période. Elle est à rechercher dès le mois d'Avril et surtout début Mai.

Le recherche d'exuvie doit se faire de préférence en tout début de saison, soit autour du 15-20 avril, lors des matinées de beau temps sans vent.

Nombre de
données,
par décade,
sur l'ensemble
des années
(2015-2019)



Source www.faune-aquitaine.org

Comment ?

Comme toutes les aeschnes, elle est bariolée de couleurs vertes et bleues, et patrouille son territoire en se posant peu.
Son thorax vert et velu présente des sutures noires épaisses et une tache centrale sur le dessus du premier segment abdominal.
Elle est surtout l'une des premières aeschnes à voler au printemps.




Sannier M., 2012

Sannier M., 2013

Risques de confusion ?

Les autres espèces du genre *Aeshna* de même couleur volent plus tard. En fin de printemps toutefois, il faut être vigilant.
L'*Anax* empereur est bien plus gros et le mâle présente un abdomen beaucoup plus bleu que l'*Aeshne* velue-printanière.
Un examen attentif des motifs, de la nervation des ailes et des yeux peut être nécessaire, surtout hors Gironde où l'espèce est plus rare. Une photographie est recommandée pour valider l'observation en dehors de la Gironde et des Landes.
La *Cordulie* bronzée qui peut fréquenter les mêmes milieux à cette saison est nettement plus sombre, de couleur homogène et métallique.

Carte de répartition connue de l'*Aeshne* velue-printanière *Brachytron pratense*



Bibliographie consultée :

BAILLEUX G., COUANON V., GOURVIL P.-Y., SOULET D., 2017. Pré-atlas des odonates d'Aquitaine – Synthèse des connaissances 1972 – 2014. CEN Aquitaine, LPO Aquitaine. Avril 2017. 117 p.

GRAND D. & BOUDOT J.-P., 2006. *Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg*. Mèze, Biotope, 480 pp.

GRAND D., BOUDOT J.-P., DOUCET G., 2014. *Cahier d'identification des Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse*. Biotope, Mèze (collection Cahier d'identification), 136p.