

Fiche de recherche

Différencier les *Polyommatus* : *P. icarus* / *P. escheri* / *P. thersites*

L'Azuré de la Bugrane (*Polyommatus icarus*), l'Azuré d'Escher (*P. escheri*) et l'Azuré de l'Esparcette (*P. thersites*) sont trois espèces très proches et difficiles à déterminer. Certains critères existent et peuvent vous aider à les distinguer.

Que rechercher ?

Les imagos sont à rechercher en priorité.

Petits azurés possédant une bande orange en bordure des ailes. Le mâle a le dessus des ailes bleu.

Où ?

Les 3 espèces sont à rechercher partout en Aquitaine.

P. icarus est la plus répandue des 3. On la retrouvera sur la plupart des milieux ouverts où poussent des légumineuses (trèfles, lotiers, etc.)

P. escheri et *P. thersites* sont à rechercher sur les secteurs thermophiles de montagne ou les coteaux de Dordogne et du Lot-et-Garonne.


Quand ?

P. icarus = mars à octobre / *P. escheri* = mai à septembre / *P. thersites* = avril à août.

Comment ?

Toujours vérifier un ensemble de critères pour déterminer l'espèce car les critères présentés ici sont variables.

En cas de doutes il peut être nécessaire de vérifier les pièces génitales.




Risques de confusion ?


Attention au Bel-Argus (*Lysandra bellargus*). L'analyse de la frange des ailes, entrecoupée de blanc et de noir, permet de faire rapidement la différence.

Carte de répartition connue de *Polyommatus icarus*, *P. thersites* et *P. escheri* en Aquitaine

Polyommatus icarus



Polyommatus thersites



Polyommatus escheri

