

DENOMBREMENTS D'ANATIDES SUR LES COTES ET LES

PLANS D'EAU AQUITAINS EN HIVER 1974/75

Comme chaque année la S.O.S a participé cet hiver à l'enquête internationale menée sous la direction du Bureau International de Recherches sur la Sauvagine (BIRS) en vue de déterminer l'importance numérique et la distribution géographique des populations d'anatidés en période d'hivernage.

Ces dénombrements ont été effectués soit par avion, soit en bateau soit à partir de la rive, par les ornithologues de la S.O.S. en particulier: M.AIME, J.Y.BOUTET, P.CAMPREDON, P.DAVANT, C.FEIGNE, A.FLEURY, P.GASCAUAT, Y.LETELLIER, G.NAIGRE, H.MARLIANGEAS, J.Y.MERLE, F.NEUVILLE, P.PETIT, G.RODRIGUEZ.

L'avion n'a pas été utilisé en novembre faute de crédit, mais en décembre et janvier les différents moyens ont été utilisés souvent simultanément afin d'obtenir des résultats le plus précis possible.

les observations portent également sur les Foulques (*Fulica atra*) et pour l'Aquitaine sur les Grèbes, Cormorans, Hérons, Laridés et l'ensemble des Limicoles.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES:

dans son ensemble l'hiver a été particulièrement doux, encore plus doux que l'hiver 73/74. En Novembre le temps a été beau et doux au cours de la première quinzaine, avec des vents dominants de S.J. Puis le reste du mois est doux et pluvieux avec seulement 4 journées où la température descend au dessous de zéro (-1 à -3). Décembre est généralement couvert et pluvieux avec vent de W à S.W dominants, températures au dessus de zéro même au levé du soleil. En Janvier commence la première petite vague de froid avec des températures de -2 à -5 depuis le 30-12 jusqu'au 5-1-75 et des vents de N. à N.E. Puis peu de gelé et ciel variable à couvert avec pluie jusqu'à la fin du mois, vent fort à très fort du 14 au 18 de secteur S.J. Février est généralement doux et variable avec pluie et de rares gelées matinales ne dépassant pas -3°C. Vent de W. à S.W; dominants.

RESULTATS:

LAC DE CAZAUX: Observation en avion et depuis la rive.

Espèces présentes.	NOV.	DEC.	JANV.
Colvert	80 ?	500	500
Pilet		450	0
Siffleur		120	500
Total anatidés	<u>80</u>	<u>1070</u>	<u>1400</u>
Cormoran (G.)	30 ?	300	300

REMARQUES:

En novembre, depuis la rive, les mauvaises conditions météorologiques ne nous ont pas permises d'avoir des chiffres précis. Les chiffres réels sont sûrement supérieurs.

BASSIN D'ARCACHON: Observation en avion en bateau et de la rive.

Espèces présentes	NOV.	DEC.	JANV.
Colvert	0	0	20
Pilet	0	0	550
Siffleur	150	350	100
Souchet	0	0	30
Bernache cravant	0	750	1530
Total anatidés	<u>150</u>	<u>1100</u>	<u>2230</u>
Foulque	2500	4000	7500
Cormoran (G.)	70	60	80
Plongion catmarin	0	0	1
Barge à queue noire	0	1	0
Chevalier arlequin	6	10	2
Chevalier aboyeur	4	2	2
Chevalier gambette	0?	250	250
Héron cendré	70	70	70

REMARQUES:

EN janvier le chiffre des Bernache cravants correspond au nombre réel. Elles ont été comptées une par une au télescope et nous avons relevés seulement 3% de jeune de l'année.

Les Pilet sont les même que ceux de Cazaux. Tantôt ils sont à Cazaux (DEC.), tantôt ils sont sur le Bassin d'Arcachon (JANV.) et pour les canards Siffleurs c'est pareil. Les limicoles recensés à Arguin viennent bien entendu se nourrir sur le B.A. mais sur ce dernier il est impossible de les dénombrer.

RESERVE DU TEICH: Observation au sol.

Espèces présentes	NOV.	DEC.	JANV.
Colvert	1600	1600	1600
Pilet	5	10	7
Chipeau	7	7	11
Siffleur	10	18	15
Souchet	30	60	75
Sarcelle d'hiver	100	350	1000
Milouin	120	210	95
Morillon	12	35	50
Milouinan	0	1	0
Tadorne	2	2	1
OIE cendrée	2	3	1
Cygne sauvage	5	2	0
Total anatidés	<u>1893</u>	<u>1998</u>	<u>2855</u>
Foulque	2700	950	850
Poule d'eau	50	50	50
Cormoran (G.)	0	2	7
Grèbe castagneux	5	5	7
Chevalier arlequin	1	2	1
Chevalier aboyeur	1	1	0
Becasseau variable	15	0	0
Héron cendré	1	2	0

REMARQUES:

Les Sarcelles d'hiver sont abondantes et leur effectif n'a pas diminué, contrairement aux autres espèces d'anatidés sur les lieux d'hivernage, à cause de la température très douce de l'hiver.

La diminution de l'effectif de Foulque est dû essentiellement à l'épuisement de la nourriture de ces dernières (Ruppia).

RESERVE DU BANC D'ARGUIN: Observation au sol et en avion.

Espèces présentes	NOV.	DEC.	JANV.
Siffleur	13	0	5
Macreuse noire	90	2	0
Macreuse brune	0	1	0
Eider à duvet	0	0	5
Harle huppé	10	0	38
Total anatidés	113	3	48
	63	5	65
Plongeon imbrin	5	8	15
Cormoran			12
Courlis cendré	800 ⁵	800	800
Pluvier argenté	500	500	500
Huitrier pie	120	120	120
Barge rousse	0	15	0
Bécasseau variable	180 000	190 000	190 000

REMARQUES:

Présence moins élevée de Bécasseau variable et des différents canards marins. Peu d'hivernage également d'Alcidés.

RESERVE MARITIME DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE: Obs. au sol.

Espèces présentes.	JANV.	Cette réserve n'est pas appliquée ni balisée et il régné une forte pression de chasse. Malheureusement nous avons lus dans "Presse et environnement" que la réserve été déplacée vers l'amont, laissant ainsi aux chasseurs la pointe aux oiseaux; la seule partie qui méritait d'être mise en réserve.
Siffleur	5	
Cormoran	3	
Pluvier argenté	100	
Chevalier gambette	1	
Bécasseau variable	300	

RESERVE MARITIME DU COURANT D'HUCHET: Obs. au sol.

Cette réserve située sur la côte Landaise est respectée et balisée. Nous avons dénombrés trois stationnements de Goéland brun, en majorité, et surtout des Ad. Respectivement 1000, 600 et 1000.

LAC DE LACANAU ET LAC DE CARCAN: Observation au sol.

En NOV. nous avons dénombrés: 3 Colverts, 4 Morillons et 5 cormorans. Vue le peu d'intérêt que ces lacs offrent aux oiseaux d'eau hivernants, nous n'avons pas fait le décompte en DEC. et JANV.

REMARQUES SUR L'HIVERNAGE
DES FOULQUES ET MILOUINS.

Les premières Foulques sont arrivées au Teich fin juillet et ont culminées début octobre avec 3300 ind. puis leur effectif a baissé régulièrement en fonction de la diminution de leur nourriture

Sur le bassin d'Arcachon les premières sont arrivées début octobre avec 70 ind. le 3-10-74 puis 1500 le 15-10, 2500 le 7-11 et maximum 7500 en janvier. Sur le lac de Bordeaux il y a eu deux maximums avec 525 le 8-11 et 415 le 15-12.

Cette année, au Teich, il n'y a eu qu'un arrivage de Milouin avec environ 300 ind. Il sont restés jusqu'en février, mais leur effectif a subi de lourdes pertes lors de leur sortie bis-journalière vers le bassin d'Arcachon. Il restait 40 ind. fin janvier.

RESERVE D'HOSTENS: Observation au sol.

espèce, présentes.	NOV;	DEC.	JANV.
Colvert	600	650	550
Sarcelle d'hiver		17	5
siffleur		3	0
Milouin		2	0
Total anatidés	<u>600</u>	<u>672</u>	<u>550</u>
FOULQUE	50	110	120
Cormoran			1
Grèbe huppé			2

REMARQUES:

Aucun stationnement notable n'a été observé au cours de l'hiver en dehors des anatidés locaux.

RESERVE DU LAC D'ARTIX: Observation au sol.

Espèces présentes.	JANV.
Colvert	35
pilet	15
Chipeau	4
Souchet	5
Sarcelle d'hiver	400
Milouin	26
Canard indéterminé	5
Total anatidés	<u>490</u>
Foulque	100
Poule d'eau	20
Grèbe castagneux	12
Chevalier gambette	4
Bécasseau maubèche	1

REMARQUES:

Ne connaissant pas assez tôt les dates des recensements, les ornithologues locaux n'ont participé qu'à celui de janvier. Cette réserve occupe la deuxième place pour l'hivernage des Sarcelle d'hiver en Aquitaine, après la réserve du Teich.

LAC DE BORDEAUX NORD: Observation au sol.

Espèces présentes	DEC.	JANV.
Siffleur	3	8
Milouin	9	0
Morillon	8	0
Foulque	415	345
Cormoran	3	0
Grèbe huppé	1	1

REMARQUES:

Ce secteur est surtout colonisé par les Foulques, peu de canard y stationne, sauf au cours de leur migration, mais ils ne séjournent pas longtemps.

LE LAC DE BOURANT A MERIGNAC:

Il a abrité 200 Foulques et 200 Poules d'eau durant tout l'hiver.

BILAN GLOBAL DES ANATIDES HIVERNANTS

EN AQUITAINE. HIVER 74/75.

ESPECES PRESENTES.	17-11-74	15-12-74	12-1-75
Colvert	2283	2751	2685
Pilet	5	460	572
Siffleur	173	494	1036
Souchet	30	60	110
Chipeau	7	7	15
Sarcelle d'hiver	100	367	1405
Milouinan	0	1	0
Milouin	120	220	150
Morillon	16	44	50
Macreuse brune	0	1	0
Macreuse noire	90	2	0
Harle huppé	10	0	38
Tadorne	2	7	1
Oie cendrée	2	3	1
Bernache cravant	0	750	1530
Eider à duvet	0	0	5
Cygné sauvage	5	2	0
TOTAL:	2843	5169	7569
Foulque	5250	5480	8917

REMARQUES GENERALES:

L'hiver relativement doux a limité l'importance des populations d'anatidés hivernants en Aquitaine. Seule la Sarcelle d'hiver a maintenu ces effectifs et elle a même hiverné en plus grand nombre dans les réserves. Cette augmentation est peut être le résultat des restrictions que se sont imposés les pays du nord de l'Europe depuis quelques années en ce qui concerne les dates de fermeture de la chasse aux gibiers d'eau.

Les 5 Cygnes sauvages ont tous été victimes de la chasse, en un mois et demi de présence sur la réserve du teich.

PROCHAINS RECENSEMENTS:

Le BIRS n'ayant pas encore communiqué les dates exactes; les prochains recensements auront lieu aux dates suivantes et concerneront les ANATIDES et LIMICOLES pour le BIRS. Pour la S.O.S. les recensements devront porter sur tous les OISEAUX D'EAU: entre autre (GRIBES, HERONS, LARIDES.) le 19-10-75 Recen. SOS - Le 16-11-75 Recen. BIRS le 14-12-75 BIRS, le 18-1-76 BIRS, le 15-2-76 SOS, le 14-3 -76 BIRS, le 18-4-76 SOS.

LES personnes qui pensent pouvoir participer à ces recensements sont priées de se faire connaître, afin que nous les informions rapidement d'un changement éventuel des dates prévues ci-joint et afin de leur communiquer les lieux à prospecter pour mieux répartir le travail sur le terrain. Les secteurs à recenser sont les mêmes que l'année précédente, avec en plus le petit lac de Biscarosse qui est totalement en réserve: bravo Messieurs les chasseurs LANDAIS.

Alain FLEURY.