

L'AVIFAUNE DU NORD MÉDOC

Le Nord-Médoc, c'est-à-dire pour ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est le triangle formé par Queyrac à l'Est, Montalivet à l'Ouest et la Pointe de Grave au Nord.

Cette presqu'île bordée par l'estuaire de la Gironde et l'Océan Atlantique est une zone très riche du point de vue ornithologique du fait des différents biotopes rencontrés. Nous allons voir au fil des saisons les oiseaux observés dans les différents milieux.

I — Tout d'abord, nous avons l'estuaire de la Gironde, qui, au rythme des marées découvre de grandes vasières, lieux de reposoir et de nourriture d'un grand nombre d'oiseaux.

A) — En hiver nous avons :

1^e) — **Les anatidés hivernants** : Macreuses Noires, Pilets siffleurs, Sarcelles d'hiver, Milouins, Colverts, Tadornes de Belon, se reposant le jour sur les eaux et qui la nuit venue se dispersent soit dans les marais ou le long de l'estuaire.

2^e) — **Les limicoles hivernants** : Pluviers argentés surtout concentrés de la baie du Verdon jusqu'à la Pointe aux Oiseaux, et les Bécasseaux variables disséminés tout le long de la Gironde avec néanmoins des regroupements de populations surtout entre Valéyrac et le Verdon. Quelques Huitriers Pie, Grands, Gravelots et Avocettes peuvent y être observés. Par mauvais temps avec fort vent de Nord ou Nord-Est et à la pleine mer, on peut les voir derrière les digues de la baie du Verdon, dans les près humides en compagnie des Goélands cendrés, argentés, bruns, Mouettes rieuses, Vanneaux, et Pluviers dorés. On peut y voir d'autres

limicoles comme les Courlis cendrés et Corlieu en très petit nombre.

Par temps de fortes gelées, les Pluviers dorés et les Vanneaux ne dédaignent pas les vasières, les Hérons cendrés vont également s'y nourrir, rentrant dans les terres à la pleine mer. Le Pipit maritime fréquente les blocs de roches des digues, ainsi que les près salés où il y trouve sa nourriture, en compagnie des Alouettes et des Bruants des roseaux.

B) — Au printemps, on peut y voir de façon courante, au moins 7 espèces de Chevaliers, et 4 de Bécasseaux, les Barges rousses et à queues noires, les Courlis cendrés et Corlieu, les Grands et petits Gravelots, les Avocettes et les Pluviers argentés : les Tadornes de Belon et les Hérons cendrés y sont plus rares. Les prairies à salicornes de la baie du Verdon servent également de reposoir et de lieu de nourriture à grand nombre de passereaux.

C) — L'été on y trouve quelques Chevaliers Gambettes et à partir de la fin juillet, tous les migrateurs vus au Printemps.

D) — L'Automne voit passer pour s'y reposer et s'y nourrir, les Anatidés et les limicoles vus au printemps avec le contingent des oiseaux hivernants.

II — En hiver, on peut y voir : Alouettes, Etourneaux, Grives : musiciennes, Mauvis, Litornes, Bécassines en compagnie des Pluviers dorés et des Vanneaux. C'est également le terrain de chasse des rapaces diurnes tels que les Faucons Crécerelle et les Buses, ainsi que les rapaces nocturnes, Effraies, Hulottes.

On y trouve également des Pies par groupes de 10 à 15 individus, des Poules d'eau,

des Martins pêcheurs, des Hérons cendrés au bord des mares ainsi que de nombreux passe-reaux.

B) — Au printemps, dès la mi-mars, toute la foule des migrants y passe, les plus précoces, Grives, Pigeons ramiers jusqu'aux plus tardifs, Cailles, Tourterelles. Cette année (1976) j'ai pu observer un Coucou Geai au mois de mai, espèce peu courante chez nous.

Nichent également dans ces «mattes», Poules d'eau, Foulques, Grèbes Castagneux, Vanneaux, Grives musiciennes, Coucous, Huppes, Cailles, Tourterelles, Busards, Milans noirs et divers passereaux, (cf. liste)

C) — Vers la fin de l'été, après les passages des Martinets, début août, suivent les Bondrées apivores, Traquets Motteux en prélude au grand passage automnal.

D) — A l'automne, la chasse intensive pratiquée ne permet pas une halte de longue durée des migrants, qui sont les mêmes qu'au printemps.

III — La forêt de Pins Maritimes et de Chênes verts, en partie dunaire située entre les «mattes» et l'océan, est un lieu de passage des oiseaux migrants, identiques à ceux des «mattes». Les rapaces nocturnes y séjournent le jour puis chassent la nuit venue, dans les marais. La Bécasse y est également fréquente... Cette forêt abrite lors de la nidification, le Circaète Jean le Blanc spécialisé dans ces lieux.

IV — Enfin, les dunes et la plage océane permettent d'observer tout au long de l'année, les différents laridés, ainsi que les Grands Cormorans et les Fous de Bassan, l'hiver venu.

V — Les menaces

Toute cette région extrêmement riche du point de vue ornithologique du fait de sa position géographique et des biotopes qui la composent, est menacée d'un anéantissement quasi total par les projets d'un nouveau «Fos». En effet, une zone industrielle de 10.000 ha est prévue par remblaiement des marais et des vasières. La première étape a déjà supprimé un peu plus d'une centaine d'hectares, et une route du port auto-

nome coupe en deux la partie nord des «mattes» favorisant ainsi l'accès, en particulier des chasseurs, ce qui ne fait qu'accentuer la pression de chasse déjà trop excessive et quasiment sans contrôle sur le domaine maritime. La réserve maritime promulguée au Journal Officiel du 25 juillet 1973 dans le cadre des réserves de chasse qui englobait la Pointe aux Oiseaux, lieu d'hivernage des limicoles a été déplacée plus au Sud sous le prétexte qu'elle se trouvait

dans le périmètre de la future zone industrielle.

Le résultat est que son utilité est quasiment nulle, et en septembre 1976, elle n'était même pas balisée...c'est dire l'intérêt que porte nos aménageurs à la protection des zones humides et de l'avifaune migratrice quand il faut passer aux choses concrètes.

GUY MAIGRE

LISTE DES OBSERVATIONS FAITES DANS LA RÉGION DU VERDON-SUR-MER (Gironde)

| | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|---|---|---|
| Grèbe Castagneux | N | Tournepie | | Chouette chevêche | |
| Fou de bassan | | Becassine des Marais | | Chouette hulotte | |
| Grand cormoran | | Bécasse | | Martinet noir | N |
| Héron cendré | | Courlis cendré | | Martin pêcheur | |
| Héron pourpre | | Courlis corlieu | | Huppe | |
| Cigogne blanche | + | Barge à queue noire | | Pic épeiche | |
| Spatule | + | Barge rousse | | Pic vert | |
| Oie cendrée | | Chevalier cul blanc | | Torcol | |
| Tadorne de belon | | Chevalier silvain | | Alouette des champs | N |
| Colvert | | Chevalier Guignette | | Hirondelle de cheminée | N |
| Sarcelle d'hiver | | Chevalier Gambette | | Hirondelle des fenêtres | N |
| Sarcelle d'été | | Chevalier Arlequin | | Hirondelle de rivage | |
| Fuligule Milouin | | Chevalier Aboyeur | | Loriot | |
| Macreuse noire | | Chevalier combattant | | Corneille noire | |
| Harle huppé | + | Bécasseau minute | + | Pie bavarde | |
| Buse variable | N | Bécasseau maubeche | | Geai | |
| Milan royal | | Bécasseau violet | | Mésange charbonnière | N |
| Milan noir | | Bécasseau variable | | Mésange bleue | N |
| Bondrée apivore | | Bécasseau Sanderling | + | Mésange huppée | N |
| Busard des roseaux | N | Bécasseau de Temminck | | Mésange longue queue | N |
| Busard st-martin | N | Avocette | | Sitelle | N |
| Busard cendrée | N | Echasse blanche | | Grimpereau des jardins | N |
| Circaète Jean-Le-Blanc | N | Oedicnème criard | | Troglodyte | N |
| Faucon crecerelle | N | Goeland marin | | Grive litorne | |
| Caille | N | Goeland brun | | Grive draine | |
| Grue cendrée | | Goeland argenté | | Grive musicienne | N |
| Poule d'eau | N | Goéland cendré | | Grive mauvis | |
| Foulque | N | Mouette rieuse | | Grive dorée (tuée par un chasseur Queyrac février 1969) | |
| Huîtrier pie | | Mouette tridactyle | | Merle noir | N |
| Vanneau huppé | N ? | Guifette leucoptere | | Merle à plastron | |
| Grand gravelot | | Sterne caugek | | Traquet motteux | |
| Petit gravelot | | Sterne naine | | Traquet patre | N |
| Gravelot à collier | | Pigeon ramier | | Rouge queue à front blanc | N |
| Interrompu | + | Tourterelle des bois | N | Rouge queue noir | N |
| Pluvier argenté | | Coucou gris | N | Rossignol philomèle | N |
| Pluvier doré | | Coucou geai | | Rouge gorge | N |
| | | Chouette effraie | N | | |

Rousserole turdoïde
Rousserole effarvate
Hypolais polyglotte
Fauvette à tête noire
Cisticole des joncs
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Gobe-mouche noir
Pipit maritime

N
N

Bergeronnette grise
bergeronnette printanière
Pie grièche écorcheur
Etourneau
Verdier
Chardonneret
Linotte mélodieuse
Serin cini
Bouvreuil

N
N
N

Pinson des arbres
Bruant des roseaux
Moineau domestique
Moineau friquet

N
N
N
N

+ observations faites par
M.P. Petit
N Nicheurs



CANARD PILET mâle
LE TEICH - avril 1974