

---

bercipla hrota dont la livrée caractéristique la distinguait aisément de ses voisines.

Rappelons que la population de cette race nichant au Gröenland n'hivernent régulièrement en

Europe que sur les côtes de l'Irlande. Des oiseaux s'égareront de temps en temps sur les côtes du nord-ouest de la France, mêlés aux hivernants de la race nominale *B. b. bernicia*. A notre

connaissance, il s'agit de la première observation certaine d'un individu de la race hrota sur le Bassin d'Arcachon.

Pierre PETIT

---

## Nidification du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) dans les prairies du Nord-Blayais (1979)

Une prospection printanière sur les marais de Braud-et-St-Louis, nous a permis de découvrir la présence de 4 couples de Vanneaux nicheurs dans des prairies marécageuses pâturées.

Trois d'entre eux, groupés tout à fait au Nord du marais (site 1), à moins d'un kilomètre de la Gironde ; l'autre (site 2) dans la zone centrale du marais, dans un endroit découvert et boueux, au milieu d'une jonçaie.

Chacun des couples occupe environ 1 ha de prairie.

### Site 1 : Premier couple

Les adultes (site le plus au Nord) forment un groupe solidaire défendant leurs poussins contre les Milans noirs et les Busards cendrés. (Il est à noter alors, que seul le couple possédant des poussins persiste à poursuivre l'intrus.)

Un des jeunes vanneaux a pu être observé à la fin avril, et âgé d'environ 3 semaines, ce qui suppose une ponte à la mi-mars ; il était tapis à proximité d'une touffe d'herbe avec son plumage mimétique verdâtre à liserés bruns. Les parents se

placent sur des mottes de terre assez hautes et surveillent les alentours. Dès qu'un intrus tente de s'approcher, les parents s'envolent et tournoient en poussant des cris monosyllabiques et brefs. A ceci s'ajoute un comportement de déviation bien connu chez les Limicoles : simulacre de l'aile cassée : à terre ou bien au cours du vol, il laisse pendre ses pattes tout en faisant du « sur place ». C'est surtout le mâle qui a la charge de cette défense, alors que la femelle se contente de survoler le territoire. Les jeunes volent le 20 mai.

### Site 1 : Deuxième couple

A la fin avril il n'est pas encore installé (ou bien la première ponte a été détruite par un labour). Le mâle parade : pirouettes, ascensions verticales, piqués terminés par un vol rasant en zig-zag. Il fait aussi des ébauches de nid en grattant le sol. La femelle attend et semble insensible aux évolutions du mâle. Quelques semaines après, leur ponte sera involontairement détruite (19 mai) par l'agriculteur labourant son pré.

aussitôt, le mâle recommencera ses parades.

### Site 1 : Troisième couple

A cette même période, la ponte du troisième couple est éclosée et quatre poussins ont pu être observés.

### Remarque

Une visite le 28 mai nous a permis de constater quelques changements : un mâle parade avec sa femelle (il s'agit du 2<sup>e</sup> couple dont la ponte a été détruite), de plus nous recensons 14 Vanneaux dans ces prairies (le nombre important d'oiseaux est certainement dû à l'apport d'individus ayant niché plus tôt en Charente-Maritime). Ces vanneaux n'ont plus de comportement reproducteur et sont craintifs.

### Site 2

Ce quatrième couple, solitaire, fréquente un biotope particulier : étendue boueuse et inondée avec des îlots moins humides recouverts de végétation rase. A la fin mai le mâle parade mais nous n'avons pas encore observé un comportement de défense des jeunes.

### Discussion

— la nidification des vanneaux sur le site 1 nous a été confirmée par les agriculteurs comme étant régulière depuis au moins deux ans.

— le marais de Braud représente la limite méridionale de l'aire de répartition de ce Limicole sur la façade atlantique et se trouve en continuité avec les

populations de Charente-Maritime.

— malgré cela certains indices de nidification ont été notés plus au Sud : parades dans les prairies marécageuses de la presqu'île d'Ambès, ou ponte occasionnelle sur l'île de Malprat (Bassin d'Arcachon).

— les Vanneaux du Blayais sont actuellement dérangés par

les labours et le prélèvement, soupçonné, de jeunes non volants pour devenir « appelants pour la chasse à la hutte ».

Franck IBANEZ  
8, Rue J.B. CARPEAUX  
33160 St-Médard-en-Jalles

### BIBLIOGRAPHIE

LECONTE Michel : Documents de bibliographie ornithologique Aquitaine et Pyrénées occidentales - GABAS - Mars 1979, 33 pages.

Les « Documents de Bibliographie ornithologique - Aquitaine et Pyrénées occidentales » réalisés par notre collègue Michel LECONTE et publiés par l'Association pour le développement des recherches et des activités culturelles auprès du Laboratoire d'Ecologie Montagnarde de Gabas, consti-

tuent un ouvrage fondamental pour le naturaliste ou le chercheur soucieux d'approfondir ses connaissances en ornithologie.

Ce travail d'assemblage bibliographique a le mérite d'être bien présenté :

— Tout d'abord par la mise en garde qui est faite au lecteur sur l'inégale qualité scientifique des articles publiés jusqu'à aujourd'hui.

— Ensuite par le fait que les domaines concernés sont précisément localisés grâce à une carte d'ensemble.

— Enfin et surtout, deux index, l'un par noms d'oiseaux, l'autre par thèmes, précèdent la liste des publications classées par nom d'auteur.

Ainsi Michel LECONTE a réalisé une brochure - que l'on peut se procurer au Centre d'Ecologie Montagnarde de l'Université de Bordeaux I à Gabas (64440) pour la somme de 22 F - qui s'avèrera, à l'usage, être un outil de travail d'une utilité extrême, il convient de l'en féliciter.

François NEUVILLE

### ERRATA DU N° 5

Dans le numéro précédent du Courbageot il fallait lire :

— page de couverture (Sommaire) : J.-J. BOUBERT et non pas J.-J. JOUBERT

— page n° 1 (Titre) : Nidification de la BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) et non pas BUTE BUTEO