Présence d'un couple d'Elanions blancs *Elanus caeruleus* en Aquitaine

*A. PAPACOTSIA - **P. PETIT

Le 21 juin 1983, lors d'une prospection ornithologique sur un petit plateau du sud de l'Aquitaine, l'un de nous (A.PAPACOTSIA), a eu la surprise d'observer un petit rapace en action de chasse, de la taille d'un Faucon hobereau mais plus massif, aux ailes larges et la queue courte. La coloration générale, très contrastée, était particulièrement caractéristique et semblait, de loin, être uniquement composée de blanc et de noir.

La disposition en forme d'épaulettes des taches noires couvrant le bord antérieur des ailes, la taille et la silhouette de l'oiseau l'identifiaient, sans erreur possible, comme étant un adulte d'Elanion Blanc, Elanus caeruleus. Ce premier contact d'environ dix minutes fut suivi, tout au long de la saison, de nombreuses observations effectuées par plusieurs collègues.

Description du milieu

Il s'agit d'un plateau sablo—argileux peu élevé, d'une dizaine de kilomètres carrés de surface, avec quelques ondulations dues à des têtes de vallons dont les flancs sont couverts d'un boisement essentiellement composé de chênes. Cette région a été récemment défrichée à des fins agricoles et consacrée à la culture intensive du maïs. Il y a environ 20 ans, ce plateau était encore couvert de landes de type atlantique dont il subsiste encore quelques lambeaux, parfois boisés de pins maritimes.

Ce site correspond donc à un milieu ouvert, parsemé de bosquets et d'arbres isolés (chênes pédonculés et pins maritimes). Si l'on se réfère à la bibliographie, ce type d'espace correspond assez bien au milieu généralement occupé par l'Elanion dans ses pays d'origine : grandes plaines ouvertes, à pelouses ou savanes parsemées de petits bosquets et d'arbres isolés, surtout des chênes verts en Espagne.

^{*} Andy PAPACOTSIA Donissan LISTRAC-MEDOC

Déroulement des observations

Pendant un mois, soit du 21 juin au 5 août 1963, l'oiseau a été observé sur le même site, se déplaçant peu et souvent perché très en évidence sur des arbres morts, des poteaux, etc...


Hormis lors du premier contact, il n'a été que très rarement observé en vol de chasse. Il ne s'envolait que si nos recherches d'un nid hypothétique nous amenaient à proximité de ses perchoirs favoris. Le 5 juillet, nous avons noté une mue symétrique sur les rémiges secondaires. La présence sur le même perchoir, d'une Pie grièche à tête rousse Lanius senator ou de Corneilles noires Corvus corone n'a engendré aucune réaction particulière de la part de l'Elanion, par contre, une attaque à l'encontre d'un Busard Saint-Martin Circus cyaneus femelle ou immature a été remarquée le 5 juillet.

Pendant cette première période, malgré un très net cantonnement et une agressivité marquée de cet oiseau, aucun autre comportement ni indice précis n'ont permis d'établir une éventuelle nidification avec présence, non décelée, d'un deuxième individu. Nous avions envisagé cette possibilité en nous référant aux divers auteurs qui indiquent que cette espèce est particulièrement discrète en période de reproduction.

Du 30 juillet au 13 septembre, aucune visite du site n'a pu être effectuée et les observations ne sont reprises que le 14 septembre. A cette date, deux Elanions sont observés simultanément et leur comportement est très différent de celui manifesté auparavant par l'individu isolé. Les oiseaux changent constamment de perchoirs, restant toujours très visibles et poussant des séries de cris sifflés assez doux, se terminant en chuintements au plus fort des excitations.

Une semaine plus tard, le même comportement est associé à des accouplements fréquents (huit en sept heures d'observation). Par ailleurs, des départs en chasse ont été notés (trois départs avec deux captures dont une suivie par un échange de proie entre les deux oiseaux perchés). Il s'agissait donc, à ce moment-là, d'un comportement très caractéristique de couple bien cantonné et aux attaches fortes.

Le 2 octobre 1983, nous observons encore les deux oiseaux mais manifestant un comportement très perturbé : instabilité, fuite à grande



- Couple d'Elanions blancs, offrande de nourriture (Pyrénées Atlantiques) 25 septembre 1983 - P.PETIT

distance, disparition du site pendant plusieurs heures. Tout cela était visiblement provoqué par une pression de chasse devenue très importante dans ce secteur.

En octobre et novembre, les Elanions furent donc très difficiles à observer pour cette raison et, même, à plusieurs reprises, un seul individu fut noté, laissant craindre la disparition du coinjoint. Toutefois, lors de notre dernière visite du site, le 3 décembre 1983, les deux oiseaux étaient encore présents.

Protection

Devant l'importance des dérangements et les risques encourus par ce couple de rapaces, des contacts furent pris avec la Délégation Régionale à l'Architecture et àl'Environnement (D.R.A.E.) et les Fédérations départementales de chasse concernées afin que soit entreprise une action de sensibilisation des chasseurs locaux. Ces démarches aboutirent, entre autres, à la création et à la diffusion d'un dépliant descriptif et explicatif destiné à éliminer, autant que possible, les risques de confusion.

Conclusions

Cette apparition de l'Elanion blanc en France serait à mettre en relation avec son expansion remarquée en Espagne et au Portugal. Toutefois, d'après la littérature, les populations observées en Inde seraient sujettes à des fluctuations "éruptives" provoquant l'apparition de l'espèce sur des territoires jusqu'alors non fréquentés puis sa disparition au bout d'un an ou deux.

En définitive, lors de notre première série d'observations, existait—il déjà un deuxième individu qui aurait échappé à nos recherches? Pour rions—nous alors supposer, en considérant la chronologie de nos observations ultérieures, qu'une tentative de nidification a eu lieu dans cette région d'Aquitaine ? Aucune preuve formelle n'a été relevée mais nous pouvons, d'ores et déjà, envisager la possibilité de reproduction de l'espèce en 1984, sauf accident, au vu du comportement de ce couple bien cantonné.

(Pyrénées Atlantiques)

- Accouplement d'Elanions blancs

25 septembre 1983 -

P. PETIT

Rappelons que l'Elanion blanc n'a été noté que 6 fois en France depuis le 19e siècle:

- à Nîmes et en Côte d'or, au cours du 19e siècle,
- dans le Gard, en mai 1830,
- à Cassel (Nord), en mai 1830,
- à Dieppe, en septembre 1841,
- en Crau (Bouches-du-Rhône), le 17 avril 1973,
- dans les Dombes, le 18 avril 1979.

Notre observation est donc la septième effectuée en France mais c'est également la première mention d'un cantonnement d'un couple d'Elanions blancs sur le territoire français.

Ont contribué aux observations : MM. J.C.BONNET, J.Y.BOUTET, P.GRISSER, F.IBANEZ, Mlle I.LOZE, M. G.MAYS.