

## Observation d'un Vanneau sociable *Chettusia gregaria* en Dordogne

\* Pascal GRISSE

Le 19 mars 1982, lors d'un dénombrement de l'avifaune présente dans un secteur de la VALLEE DE L'ISLE proche de SAINT-LAURENT-des-HOMMES, à l'ouest du département de la Dordogne, un oiseau clair parmi un groupe de vanneaux huppés (*Vanellus vanellus* L.) attira mon attention.


Les caractères de terrain les plus remarquables furent alors notés et l'oiseau put être comparé aux Vanneaux huppés qu'il accompagnait.

Montrant les caractéristiques communes aux Pluviers (*Charadriidae*), ses traits spécifiques étaient un plumage gris beige, une calotte noire entourée d'un large sourcil blanchâtre faisant le tour de la tête, souligné d'un trait noir allant du bec à l'oeil et des pattes noires nettement plus grandes que celles du Vanneau huppé.

Le gris beige de la poitrine se fondait progressivement dans une tache ventrale brun foncé, presque noir dessous, présentant des marques rousses à la naissance des pattes. Les sous-caudales étaient blanches.

A l'envol, les rémiges primaires noires, une large bande alaire blanche (rémiges secondaires), la queue blanche marquée d'une barre subterminale noire - excepté sur les deux rectrices externes - et les pattes dépassant la queue caractérisaient ce Vanneau et lui conféraient un aspect très clair, contrastant avec les ailes sombres des Vanneaux huppés.

En vol, ses ailes étaient plus étroites que celles du Vanneau huppé et l'allure, quoique semblable, était plus directe; les battements d'ailes étaient plus rapides, l'attaque du coup d'aile plus franche, moins enveloppée, moins "papillonnante".



Aucun cri n'a été noté.

L'identification ne posait aucun problème étant donnée la distance d'observation : l'oiseau était donc un Vanneau sociable, *Chettusia gregaria* (Pall ) en plumage nuptial.\*

Le lendemain 20-03-1982, cet oiseau était toujours présent parmi les Vanneaux huppés et put être observé par F.CHARMOY, J.C. BONNET et moi-même.

Le 21-03, nous revenions avec F. et M-C CHARMOY, C.GRISSER et J-F HELLIO et nous pouvions à nouveau observer l'oiseau.

Le 22-03, nouvelles observations de F.CHARMOY et moi-même, le Vanneau sociable étant toujours en compagnie des Vanneaux huppés.

Il fut ensuite noté chaque jour jusqu'au 26-03, jour où la plupart des Vanneaux huppés et le Vanneau sociable avaient disparu, les conditions météorologiques - vent de N-E assez fort, beau temps doux - étant très favorables à la migration.

Ces multiples observations nous ont permis de noter quelques traits de comportement du Vanneau sociable.

Cet oiseau a toujours été observé en compagnie des Vanneaux huppés dont il suivait les moindres déplacements, bien que se nourrissant dans les parties les plus sèches de leurs zones de gagnage - champs de maïs partiellement inondés, prairies humides, terres labourées gorgées d'eau - et semblant éviter les flaques d'eau qu'il traversait rapidement. Par contre, il a été observé se reposant quelques instants les deux pattes dans l'eau.

Son comportement alimentaire, bien que très proche de celui du Vanneau huppé, diffère sur quelques points : ses déplacements sont semblables aux courses rapides ponctuées d'arrêts brusques des Pluviers, mais généralement plus brefs. Quelquefois, peut-être à cause de ses longues pattes, il se tenait penché, le bec à environ 5 cm du sol et pratiquant ainsi une sorte d'affût de quelques secondes, comportement que je n'ai jamais observé chez le Vanneau huppé.

---

\* En plumage internuptial, la tache ventrale est absente et les marques de la tête sont moins contrastées.

Son caractère sociable a été remarqué lorsqu'à la suite d'un envol de Vanneaux huppés il se retrouve seul. Il paraissait inquiet, se tenait dressé et rejoignit les Vanneaux quelques instants après. Mais si la présence d'autres oiseaux semble lui être indispensable, quelques mouvements d'agressivité (poursuite sur quelques mètres d'individus trop proches) envers les Vanneaux huppés ont été notés. Mais ceci est aussi un comportement intraspécifique du Vanneau huppé sur les lieux de gagnage.

Le Vanneau sociable est une espèce de l'avifaune asiatique nichant dans les steppes de la Sibérie occidentale jusqu'à l'Ob vers l'Est et le Lac Balkhash et la Mer d'Aral au sud. Il hiverne dans le sud de l'URSS, l'Inde, le Nord-Est de l'Afrique et moins fréquemment en Arabie (BANNERMAN 1961, DEMENTIEV et GLADKOV 1951, ETCHECOPAR et HUE 1964, GEROUDET 1982, GLUTZ et al. 1975, HARRISSON 1977, HARRISSON 1982, HEINZEL et al. 1972, HOLLOM 1960).

Le retour sur les sites de nidification (steppes à Artemesia, pelouses sèches avec végétation éparse) s'effectue entre Avril et mai. En Juillet, les oiseaux se regroupent et l'aire de nidification est désertée dès fin Juillet/début Août pour rejoindre les quartiers d'hiver où ils arrivent en octobre; ils fréquentent alors les prairies ouvertes proches de l'eau, les chaumes, les landes sèches et les zones de végétation éparse (BANNERMAN 1961, DEMENTIEV et GLADKOV 1951, ETCHECOPAR et HUE 1964, GEROUDET 1982, HARRISSON 1977, HARRISSON 1982);

Cette observation est la neuvième mention du Vanneau sociable en France. L'espèce a fait l'objet de plusieurs observations en Europe Occidentale, celles de France, Pays-Bas, Belgique, Suisse et Grande-Bretagne étant détaillées ci-après; cet oiseau a été noté aussi en Finlande, au Danemark, en Espagne, au Maroc, en Allemagne Occidentale et au moins trente fois en Italie (GEROUDET 1982). Ces observations sont réparties sur tous les mois de l'année sauf février, avec un maximum de fréquence de mars à juin et en octobre/novembre (GEROUDET 1982).

#### BELGIQUE : 4 observations

- 8 au 13.04.1962, Langerkugge/GAND, 1 ind.
- 7 et 8.06.1962, Zeevergen/OST-FLANDERN, 1 ind.
- 05.04.1966, Zolder/LIMBURG, 1 ind.
- 25.05.1970, Turnhout/ANTWERPEN, 1 ind.

PAYS-BAS : 12 observations , dont

- 1968 AMSTELVEEN 1 ind;
- 1975 NEDERWEERT 1 ind.

SUISSE : 1 observation

- 18.11.1957, Ermatinger Becken/THURGAU, 1 ind.

ILES BRITANNIQUES : 21 observations jusqu'en 1980 dont

- Automne vers 1860, St-michael-on-Wye/LANCASHIRE, 1 ind.
- 1.08.1899, Navan/Co. MEATH IRLANDE, 1 femelle
- 3.°5.1907, romney Marsh/KENT, 6 ind. dont 1 femelle capturée;
- Noël 1909, Tramore Bay/WATERFORD/IRLANDE, 1 ind.
- 25 au 27.05.1910, Winchelsea/SUSSEX, 4 ind. tués;
- 9, 11 et 18.05.1914, Winchelsea/SUSSEX, 3 ind. tués;
- 3.11.1926, North Ronaldsay/DORCADES, 1 ind.
- 20.10.1951, Northampton Sewage Farm, 1 ind;
- 6 AU 24.04.1961, DORSET 1
- 29.10.1961, HERTFORDSHIRE, 1 ind.
- 6 au 12.07.1971, NORTHUMBERLAND, 1 ind.
- 17.10. au 2.11.1976 fen Ditton/CAMBRIDGESHIRE, 1 imm.
- 24 au 27.10.1976, Hanning Field Reservoir/ESSEX, 1 ad;

FRANCE : 8 observations

- printemps 1835 Echirolles/ISERE, 1 capture;
- 20.03.1858, Marais de Pleurs/MARNE, 1 tué
- 20.04.1861, Marais de Pleurs/MARNE, 1 tué (ibidem)
- 14.11.1955, ST-Hilaire-du-Riez/VNEDEE, 1 capturée
- 31.10.1966, Vimeuil/INDRE, 1 ind;
- 29.10 au 7.12.1970, CAMARGUE, 1 ind.
- 8.03.1975, RESERVOIR de MARNE, 1 ad;
- 2.04.1978, Marais de l'Erdre/PETIT MARS/LOIRE ATLANTIQUE, 1 ad; en plumage nuptial.

BIBLIOGRAPHIE :

BANNERMAN (D.A.) 1961

The Birds of the British Isles. vol.10  
Oliver & Boyd, Edinburgh, London

BLONDEL (J), ISENMANN (F.) 1981

Guide des oiseaux de Camargue.  
Delachaux & Niestlé, Neuchâtel (CH)

CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNES (COCA) 1976

Hivernage 1974-75 et Migration pré-nuptiale 1975.  
L'Orfraye N° 10 : 6643

CHEPEAU (Y.)

In: "Fichier National des Espèces Inusuelles en France - UNAD"

DE HAAN (J.H.H.) 1975

Waarmingen van een Steppenkievit (*Chettusia gregaria* (Pallas))  
mannetje bij het Natuureservaat "De Groote Peel", Nederweert.  
Natuurhistorisch maandbl. 64 (4-5) : 56-58.

DEMENTIEV (G.P.), GLADKOV (N.A.) 1951

Birds of the Soviet Union ,Vol.3.  
(traduction anglaise Jérusalem 1969)

ETCHECOPAR (R.D. HUE (F.) 1964

Les Oiseaux du Nord de l'Afrique.  
Gentilly, Seine, France.

GEROUDET (P.) 1982

Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe. Tome I  
Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, Paris.

GIRAUD-AUDINE (M.), PINEAU (J.) 1973

*Emberiza striolata* et *Vanellus gregarius* dans le Tangerois.  
Alauda XLI (3).

GLUTZ VON BLOTZHEIM (U.), BAUER (K.M.), BEZZEL (E.) 1975

Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 6.  
Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.



- GUILLOT - 1869-70  
Mem. Soc. Sc. Art- Vitry-le-François 4 : 187  
in : "Fichier National des Espèces Inusuelles en France - UNAD"
- HARRISON (C.) 1977  
Les Nids, les Oeufs et les Poussins d'Europe.  
Elsevier, Paris, Bruxelles.
- HARRISON (C.) 1982  
An Atlas of the Birds of the Western Palearctic.  
Collins, London.
- HEINZEL (H.), FITTER (R.), PARSLow (J.) 1972  
Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.  
Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.
- HOLLOM (P.A.D.) 1960  
The popular Handbook of Rarer British Birds.  
H.F. & G. Withaby
- HOVETTE (C.) 1972  
Nouvelles acquisitions faunistiques de la Camargue.  
Alauda 40 : 343-352
- KURSCHNER (W.) 1976  
Beobachtung eines Steppenkiebitz- *Chettusia gregaria* - in Hessen  
Luscinia 43 (1-2) : 33-34
- MAC KENZIE-GRIEVE (C.J.) 1976  
Essex birds Rep. 1976 : 106-109
- MAYAUD (N.), HEIM DE BALZAC (H.), & JOUARD (H.) 1936  
Inventaire des oiseaux de France  
S.E.O. Paris
- MILLER (J.) 1976  
Sociable Plover at Hanning field Reservoir  
Essex birds rep. 1976 : 62
- RILEY (J.W.), ROOKE (K.B.) 1962  
Sociable Plover in Dorset  
Brit. Birds 55 : 233-235

RIOLS (C.) 1967

Vanneau sociable - *Vanellus gregarius* - (Pallas) - dans l'Indre.

Alauda 35 : 154

SELECTION DU READER'S DIGEST (Rd.) 1975

Guide des Oiseaux

Paris, Bruxelles, Munich.

SHARROCK (J.T.R.) & al. 1976

Rare Birds in Britain and Ireland.

T. & A.D. Poyser.

TEKKE (M.J.) 1970

Ornithologie van Nederland, 1968.

Limosa 43 : 39-58

Van DEURSEN (M.H.) 1975

Waarneming van Steppenkievit - *Chettusia gregaria* - Pall.

Bij het natuurreservaat De Groote Peel Ospel (L.)

Limosa 48 (3-4) : 207-209

---