

Observation d'une Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala en Dordogne

• Ph-J DUBOIS

Le 18 avril 1984 dans l'après-midi, lors d'un arrêt en bordure de route près du lieu-dit Taboury, qui surplombe la D 710 qui va de Périgueux à Le Bugue, Dordogne, mon attention est attirée par une alarme de tonalité rapeuse en provenance d'un Genévrier *Juniperus communis*. Ce "trètrètrètrè" me rappelle celui de la Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* que je connais bien du bassin méditerranéen, mais cette localité me semble particulièrement septentrionale.

Bientôt, je repère l'oiseau qui s'avère être effectivement un mâle adulte de Fauvette mélanocéphale avec sa calotte noire descendant sous les yeux et tranchant sur le dos ardoisé et le ventre crème, ainsi que les rectrices externes blanches et, surtout, le cercle orbital rouge vif.

L'oiseau reste la plupart du temps dans les genévriers, se montrant peu. C'est à partir de ces arbustes que, par deux fois, j'entends son chant court, saccadé et rauque, composé de notes musicales entremêlées de crécelles.

Après l'avoir observé pendant plus de dix minutes, je quitte les lieux, en entendant pour la dernière fois son alarme caractéristique.

Le milieu, un coteau calcaire xérophile, orienté SW/W, présente un tapis de Brôme *Bromus sp.* sur lequel croît le Genévrier commun, tandis que la ligne de crête est bordée de Chênes pubescents *Quercus lanuginosa* qui ne sont pas encore en feuilles.

Ce milieu sec et bien ensoleillé, présente une certaine ressemblance avec le milieu originel de cette Fauvette.

Les autres espèces d'oiseaux fréquentant ce coteau sont : la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (un mâle chanteur indifférent aux strophes de la Mélanocéphale), le Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus*, la Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*, le Verdier *Carduelis chloris*, le Serin cini *Serinus serinus*, et le Bruant zizi *Emberiza circlus*.

Je n'ai pu, malheureusement, vérifier la présence de ce mâle dans les jours qui ont suivi, mais les ornithologues locaux n'ont rien trouvé par la suite. M.CLEMENT, P.GRISSER, comm.pers. .

Rappelons qu'en France, cette espèce est purement circum-méditerranéenne et qu'elle ne dépasse pas la latitude de Valréas et de Bourg-Saint-Andéol. (YEATMAN, 1976).

Il existe dans la littérature française - et étrangère - un certain nombre de données similaires de Fauvettes mélanocéphales observées au nord de leur limite classique de répartition. Ainsi, en Grande-Bretagne, sur 12 observations faites jusqu'en 1982, 50 % étaient des mois d'avril et mai (ROGERS, 1983).

Cette prépondérance de données printanières laisse à penser qu'il s'agit d'oiseaux en migration pré-nuptiale qui ont "raté" leur retour sur leur site de reproduction ("overshooting" des Anglais), désorientés par une météorologie diurne et/ou nocturne adverse (tempête, brouillard, forts vents de secteur sud, etc...) Il faut ajouter que ce cas figure existe pour d'autres Fauvettes méditerranéennes (Fauvette passerinette *S.cantillans* en particulier) comme pour d'autres espèces méridionales.

En France, il existe quelques rares mentions de Fauvettes mélanocéphales en dehors de leur aire normale de répartition :

- 1 mâle capturé le 30 juin 1969 à Chaillevette, Charente-Maritime (DOUMERET in CRUON & VIEILLARD, 1975).
- 1 mâle observé les 1^{er} et 13 janvier 1974 à Bron, Rhône (CZAJKOWSKI in CRUON & VIEILLARD, op. cit.).
- 1 mâle observé le 27 mars 1977 sur Quessant, Finistère (Ch.PORCQ comm. pers.).
- enfin un mâle du 28 avril au 10 mai 1981, tenant un territoire à Mourenx, Pyrénées Atlantiques (BLAKE, 1983).

Remarquons là encore que sur ces 4 données, trois sont printanières...

OUVRAGES CONSULTÉS

- BLAKE G. (1983) - Observation d'une Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) dans les Pyrénées Atlantiques. *Le Courbageot* 10 : 37-39
- CRUON R. et VIEILLARD J. (1975) - Notes d'Ornithologie Française XI (suite et fin) - *Alauda* 43 : 167-184.
- ROGERS M.J. (1983) - Report on rare birds in Britain in 1982. *British birds* 75 : 470-529.
- YEATMAN L. (1976) - Atlas des Oiseaux Nicheurs de France - S.O.F. Paris.

Observation d'un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* sur la côte basque

* Laurence GORY

Le samedi 21 janvier 1984, à 12h., lors d'un comptage d'oiseaux de mer échoués sur la plage entre BIDART et GUETHARY, E. d'ELBEE et moi même avons vu, à une distance de 30 mètres, dans l'eau, un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*. IL s'agissait d'un immature de 2ème année en plumage hivernal : base du bec couleur "chair", pointe noire, plumage uniformément blanc cassé, pattes couleur "chair".

Sa taille était légèrement supérieure à celle d'un Goéland argenté *Larus argentatus*. Il se trouvait en compagnie de quelques Mouettes rieuses *Larus ridibundus* et tridactyles *Rissa tridactyla*.

Le vent était ce jour-là de force 3 à 4 NO/SE, mer forte, ciel couvert. Température extérieure de 9°.

Le 22 mars 1984, à 17h.30, au Rocher de la Vierge de BIARRITZ, j'observai un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* au milieu d'un groupe d'une vingtaine de Mouettes rieuses *Larus ridibundus*.

Il était nettement plus massif que celles-ci et ressemblait en tous points à l'individu observé le 21 janvier.

OUVRAGES CONSULTÉS :

- P.GEROUDET - *Les Palmipèdes* - Ed. Delachaux et Niestlé.
- S.CRAMP - *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa* - Ed. Oxford University Press.