

Nidification du Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* à Anglet (64)

• Laurence GORY

A l'hippodrome de Chiberta d'ANGLET, le 29 avril 1984, à 8h., sur une branche élevée d'un pin sylvestre, un mâle de l'espèce Bec croisé des sapins *Loxia curvirostra*, nourrissait trois jeunes battant des ailes, mais ne pouvant pas voler.

N'apercevant tout d'abord qu'un seul jeune, accompagné du mâle, j'ai pensé à un accouplement. Mais les nombreux nourrissages qui suivirent, le plumage vert olive rayé du ventre d'un des deux oiseaux, et la manifestation des deux autres jeunes ne laissa place à plus aucune ambiguïté. Ces oiseaux étaient peu farouches. Malgré ma présence au pied de l'arbre, les nourrissages ne se sont pas interrompus.

Il m'a ainsi été possible de distinguer nettement, la particularité du bec, le plumage brique du mâle et les rayures présentes sur le ventre des trois jeunes.

Par contre, en vingt minutes d'observation, il ne m'a pas été permis de voir la femelle, ni de l'entendre. Par contre, le mâle, tout au long des vingt minutes émettait, à un rythme lent, le cri caractéristique de l'espèce.

Le 29 avril 1984, à BIARRITZ, les conditions climatiques étaient les suivantes :

- Vent de force 2 à 3 NO/SE
- Température de 29°
- Temps ensoleillé
- Mer calme

REMARQUE

Durant l'hiver 1983-1984, le nord de la France a connu une invasion de Becs croisés des sapins *Loxia curvirostra*, comme cela est parfois le cas. Cette invasion a pu se poursuivre le long de la côte. Il ne serait ainsi pas étonnant qu'un couple ait trouvé en l'hippodrome de Chiberta, un lieu favorable pour nicher.

Observation d'un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* sur la côte Landaise

• Gérard BLAKE

Le 30 janvier 1984, par temps couvert et vent de force 4 à 6, au port de MIMIZAN-PLAGE (Landes), j'ai observé, au milieu d'un groupe de Goélands argentés *Larus argentatus* et bruns *Larus fuscus*, un Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*.

De taille sensiblement plus réduite que les autres Goélands, il présentait un dos beige clair moucheté de brun, le front, la face et la poitrine grisâtre, le bec moins robuste que celui des autres Goélands de couleur beige sale à pointe noire marquée et les pattes roses pâles.

L'oiseau était peu farouche et s'est laissé approcher à une quinzaine de mètres avant de s'envoler pour se reposer trente mètres plus loin en dehors du groupe de Goélands. Il semblait s'agir d'un immature de deuxième hiver.

Le 25 mars suivant, un autre Goéland à ailes blanches a été observé pendant une heure par temps très clair, sur le lac d'HOSSEGOR.