



Localisation des décharges du Bourghailh et de Martignas, ainsi que l'aéroport de Bordeaux Mérignac par rapport aux dortoirs présumés des Laridés dans l'estuaire de la Gironde et sur le Bassin d'Arcachon

 Zones presumées des dortoirs



MOUETTE RIEUSE
Dessin : C. MERY

TRIPLE OBSERVATION DE LA STERNE FULIGINEUSE *Sterna fuscata* SUR LE BANC D'ARGUIN (BASSIN D'ARCACHON - GIRONDE).

Situé à l'entrée du Bassin d'Arcachon, le Banc d'Arguin, îlot sableux classé Réserve Naturelle depuis 1972 (gestion SEPANSO), accueille, d'Avril à Août, la plus importante colonie de Sternes caugeks *Sterna sandwicensis* de France (4150 couples en 1985). De par sa situation privilégiée, il voit chaque année les hasards de la migration égarer des espèces d'origine plus ou moins lointaine.

Le 4 juin 1985, un oiseau inconnu est observé alors qu'il parasite les Sternes caugeks. Ce n'est qu'après de longues minutes de recherches que l'oiseau est formellement identifié: dos, dessus des ailes et calotte noirs, dessous et face blancs sont les signes distinctifs de la Sterne fuligineuse *Sterna fuscata* qui ne peut être confondue qu'avec la Sterne bridée *Sterna anaethetus*, cette dernière étant toutefois plus claire avec un large collier blanchâtre;

Elle sera ensuite régulièrement observée aux abords ou au sein même la colonie de Sternes caugeks, jusqu'au 7 juin.

A noter, par ailleurs, que le 1er mai de cette année, alors qu'ils observent un groupe de limicoles, A. LAFFILAY et C. FEIGNE aperçoivent furtivement un oiseau en vol de couleur foncée qu'ils situent entre la Guifette noire *Chlidonias niger* et le Labbe parasite *Stercorarius parasitus*. Toutefois, le doute ne nous permet pas de dire avec certitude s'il s'agissait là d'une Sterne fuligineuse.

La deuxième observation concerne un individu noté les 8 et 10 juillet 1985 alors qu'il parasite également les caugeks. Il faut dire que l'effet attractif exercé par la masse de Sternes caugeks n'est sans doute pas étranger à ces apparitions.

Enfin, le troisième mention date du 15 août 1985. Un cri nasal attire l'attention d'un observateur qui reconnaît à nouveau une fuligineuse. Cette fois-ci, l'oiseau ne sera suivi qu'une heure environ, laissant quand même le temps aux observateurs d'admirer son agilité dans les airs (parasitage presque simultané d'une Sterne caugek puis d'un Courlis corlieu *Numenius phaeopus*).

Bien qu'il soit difficile de dire s'il s'agit du même individu observé en juillet puis en août 1985 (malgré la proximité des observations) nous pouvons néanmoins admettre que l'oiseau n'a pas stationné sur la réserve car, du fait du nombre important d'observateurs et du comportement même de l'oiseau le rendant bien peu discret, il aurait sans aucun doute été repéré.

A noter que les trois observations faites à Arguin concernent des adultes et ont été effectuées durant les mois d'été, ce qui correspond tout à fait au schéma classique des autres données françaises (exceptée celle d'OUESSANT en avril 1967, seule mention "hors-saison").

Rappelons, enfin, que cette espèce pélagique, qui est assez largement répandue dans les régions tropicales et sub-tropicales du globe, n'a été reconnue que 8 fois en France (dont 3 à Arguin !) depuis le début du siècle et ses apparitions en Europe occidentale demeurent également exceptionnelles.

Observateurs :

juin 1983: J.J. BOUBERT, D. CHEYROU, C. FEIGNE, M. GUEDON,
A. LAFFILAY .

juil.1985: J.J. BOUBERT, D. CHEYROU, C. FEIGNE, M. PELLE,
A. QUEYRAUD, O. RITZ.

août 1985: J.J. BOUBERT, O. BOUCHET, O. BOURRUT, E. PIECHAUT
H. ROQUES, A. QUEYRAUD, P. ZEDDAM.

Autres données françaises pour le XXe siècle

◊ un adulte observé le 24 juillet 1904 au large de PORNIC (Loire-Atlantique);

◊ Un cadavre découvert le 3 juin 1956 sur l'île DUMET (Loire-Atlantique);

◊ Un individu observé le 2 avril 1967 à QUESSANT (Finistère);

◊ Un individu le 24 juin 1967 à 10 miles au large du Pertuis de Maumusson (Charente Maritime).

◊ Un individu observé le 29 juillet 1984 à VAUVILLE (Manche).

ROQUES Hervé
7, clos de Versein
33140 VILLENAVE d'ORNON

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DUBOIS, P.J. & YESOU, P. (1986) - Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France. C.H.N., U.N.A.O., L.P.O., Secrétariat Faune-Flore, PARIS.



PREMIÈRE OBSERVATION DU BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* EN DORDOGNE.

Cette observation a été réalisée par temps perturbé et léger vent de Sud-Ouest le 18 Novembre 1984 au lieu-dit La Renardie, sur la commune de St Mayme de Pereyrol (Dordogne).

Il est midi et j'observe à la jumelle un vol d'une centaine d'Alouettes des champs *Alauda arvensis* tournant au-dessus d'une terre récemment labourée, lorsque je suis frappé par l'éclat blanc des ailes de l'un des oiseaux. Le vol se pose à une cinquantaine de mètres et je peux déterminer parmi les alouettes un mâle de Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* caractérisé par sa tête arrondie, de teinte pâle et roussâtre, sa poitrine blanchâtre traversée en son milieu par une bande rousse et les ailes blanches aux pointes noires. A plusieurs reprises, le groupe s'envole puis se repose après avoir longuement tourné autour du champ; chaque fois le bruant accompagne les alouettes et le contraste entre le triangle noir des rémiges primaires et la blancheur du reste de l'aile devient alors très net. Je suis en outre frappé par la ressemblance de l'allure en vol des deux espèces : tout comme les Alouettes des champs, le Bruant des neiges alterne séries de battements d'ailes suivies de glissades, brusques conversions, piqués vers le sol et battements mous lors d'épisodes de vol pratiquement sur place.

Cette observation a duré un bon quart d'heure mais à plusieurs reprises dans le courant de l'après-midi, j'aurai à nouveau l'occasion de revoir le Bruant des neiges, toujours en compagnie d'alouettes et mêlant parfois des séries de cris roulés aux trilles de ses compagnes occasionnelles. Dès le lendemain, l'oiseau avait disparu.

A notre connaissance, il s'agit de la première observation en Dordogne d'une espèce dont les apparitions à l'intérieur du pays, et surtout dans le Sud, sont rares et irrégulières. La présence momentanée de cet oiseau en Dordogne pourrait être liée à la tempête de Sud-Ouest qui a sévi sur les côtes du Golfe de Gascogne les jours précédant l'observation.

REFERENCES

- BLONDEL, J et ISENMAN, P. (1981). - *Les oiseaux de Camargue*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- GEROUDET, P. (1957). - *Les Passereaux d'Europe*. Tome III. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 293 pp
- PETERSON, R.I et al. (1976). - *Guide des oiseaux d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 451 pp

BONNET Jean-Claude
La Renardie
St Mayme de Pereyrol
24380 VERGT