

Rappelons, enfin, que cette espèce pélagique, qui est assez largement répandue dans les régions tropicales et sub-tropicales du globe, n'a été reconnue que 8 fois en France (dont 3 à Arguin !) depuis le début du siècle et ses apparitions en Europe occidentale demeurent également exceptionnelles.

Observateurs :

juin 1983: J.J. BOUBERT, D. CHEYROU, C. FEIGNE, M. GUEDON,
A. LAFFILAY .

juil.1985: J.J. BOUBERT, D. CHEYROU, C. FEIGNE, M. PELLE,
A. QUEYRAUD, O. RITZ.

août 1985: J.J. BOUBERT, O. BOUCHET, O. BOURRUT, E. PIECHAUT
H. ROQUES, A. QUEYRAUD, P. ZEDDAM.

Autres données françaises pour le XXe siècle

◊ un adulte observé le 24 juillet 1904 au large de PORNIC (Loire-Atlantique);

◊ Un cadavre découvert le 3 juin 1956 sur l'île DUMET (Loire-Atlantique);

◊ Un individu observé le 2 avril 1967 à QUESSANT (Finistère);


◊ Un individu le 24 juin 1967 à 10 miles au large du Pertuis de Maumusson (Charente Maritime).

◊ Un individu observé le 29 juillet 1984 à VAUVILLE (Manche).

ROQUES Hervé
7, clos de Versein
33140 VILLENAVE d'ORNON

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

DUBOIS, P.J. & YESOU, P. (1986) - Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France. C.H.N., U.N.A.O., L.P.O., Secrétariat Faune-Flore, PARIS.



PREMIÈRE OBSERVATION DU BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* EN DORDOGNE.

Cette observation a été réalisée par temps perturbé et léger vent de Sud-Ouest le 18 Novembre 1984 au lieu-dit La Renardie, sur la commune de St Mayme de Pereyrol (Dordogne).

Il est midi et j'observe à la jumelle un vol d'une centaine d'Alouettes des champs *Alauda arvensis* tournant au-dessus d'une terre récemment labourée, lorsque je suis frappé par l'éclat blanc des ailes de l'un des oiseaux. Le vol se pose à une cinquantaine de mètres et je peux déterminer parmi les alouettes un mâle de Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* caractérisé par sa tête arrondie, de teinte pâle et roussâtre, sa poitrine blanchâtre traversée en son milieu par une bande rousse et les ailes blanches aux pointes noires. A plusieurs reprises, le groupe s'envole puis se repose après avoir longuement tourné autour du champ; chaque fois le bruant accompagne les alouettes et le contraste entre le triangle noir des rémiges primaires et la blancheur du reste de l'aile devient alors très net. Je suis en outre frappé par la ressemblance de l'allure en vol des deux espèces : tout comme les Alouettes des champs, le Bruant des neiges alterne séries de battements d'ailes suivies de glissades, brusques conversions, piqués vers le sol et battements mous lors d'épisodes de vol pratiquement sur place.

Cette observation a duré un bon quart d'heure mais à plusieurs reprises dans le courant de l'après-midi, j'aurai à nouveau l'occasion de revoir le Bruant des neiges, toujours en compagnie d'alouettes et mêlant parfois des séries de cris roulés aux trilles de ses compagnes occasionnelles. Dès le lendemain, l'oiseau avait disparu.

A notre connaissance, il s'agit de la première observation en Dordogne d'une espèce dont les apparitions à l'intérieur du pays, et surtout dans le Sud, sont rares et irrégulières. La présence momentanée de cet oiseau en Dordogne pourrait être liée à la tempête de Sud-Ouest qui a sévi sur les côtes du Golfe de Gascogne les jours précédant l'observation.

REFERENCES

- BLONDEL, J et ISENMAN, P. (1981). - *Les oiseaux de Camargue*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- GEROUDET, P. (1957). - *Les Passereaux d'Europe*. Tome III. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 293 pp
- PETERSON, R.I et al. (1976). - *Guide des oiseaux d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 451 pp

BONNET Jean-Claude
La Renardie
St Mayme de Pereyrol
24380 VERGT