

Observation d'un Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* en Gironde

Pascal GRISSER

Le 10 mai 1987, dans un des réservoirs à poissons du Domaine de Certes (Bassin d'Arcachon / Gironde), un Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* se nourrissait en compagnie de Bécasseaux minutes *Calidris minuta*, de Temminck *C. temmincki* et variables *C. alpina* et de Grands Gravelots *Charadrius hiaticula*.

Il fut d'abord repéré par Ph. TYSSANDIER puis observé conjointement par P. GRISSER, A. GUYOT, A. PISU et P. ZEDDAM, avant qu'il ne disparaisse avec les autres limicoles, suite au survol d'un avion de tourisme.

L'observation ne dura que quelques minutes mais la présence de plusieurs espèces à ses côtés facilita la description et l'identification.

Le plumage du manteau apparaissait très contrasté, brun et blanc. Les plumes du dos étaient marquées de roux vif et les scapulaires étaient largement bordées de blanc, formant deux bandes dorsales longitudinales lui donnant un aspect de Bécassine. De même, les moyennes couvertures également largement bordées de blanc conféraient à l'oiseau un aspect très clair et écaillé.

La poitrine, densément tachetée de brun, était nettement délimitée du dessous blanc. Sur les flancs, les tâches de la poitrine se poursuivaient en devenant plus grosses.

Le bec était assez long (plus long que la tête) et tombant dans sa partie apicale.

La tête aussi était très contrastée, des rayures brun foncé alternant avec une bande centrale blanchâtre et un double sourcil blanc joint au niveau de l'oeil. Ces rayures étaient particulièrement caractéristiques lorsque l'oiseau était vu de face, se nourrissant.

Les pattes, noirâtres, ont paru longues, mais peut-être était-ce dû à la position aplatie du corps, ou à un tarse court, l'articulation tibio-tarsale étant nettement détachée du corps.

Sa taille était inférieure d'environ un cinquième à celle du Bécasseau variable et supérieure à celle des B. de Temminck et minute d'environ un tiers. Aucun cri ne fut noté à l'envol. L'oiseau ne fut pas revu par la suite.


Le Bécasseau falcinelle n'avait pas été noté dans le Sud-Ouest de la France depuis le 17 septembre 1975, date à laquelle un individu était observé sur le Banc d'Arguin (Bassin d'Arcachon / Gironde).

D'autres observations de Bécasseaux falcinelles ont été enregistrées au cours de ce mois de mai 1987 ailleurs en France, notamment en Vendée.

Cette espèce se reproduit dans le nord de la Scandinavie et l'ouest de la Sibérie (sous-espèce *falcinellus*) ; une autre sous-espèce niche en Sibérie centrale et orientale.

La population la plus occidentale hiverne autour du Golfe persique, de la Mer Rouge et sur les rives de l'Océan Indien; l'essentiel du couloir de migration est donc nettement oriental et les observations deviennent rares à l'ouest d'une ligne Baltique-Italie (GEROUDET, 1983).

En France, si le Bécasseau falcinelle est relativement régulier sur les côtes méditerranéennes et notamment en Camargue, le littoral atlantique n'était jusqu'à présent concerné que par 6 observations, toutes enregistrées lors de la migration postnuptiale (DUBOIS et YESOU, 1986).



B. Falcinelle Certes 10.05.87

P.G.

Les conditions météorologiques de ce printemps 1987 ont probablement dérouté cet oiseau, comme bon nombre de migrateurs qualifiés d'orientaux. Ainsi, une occurrence inhabituelle de Bécasseaux de Temminck a été notée sur plusieurs points de la façade atlantique, et d'autres espèces telles la Bargette de Terek *Xenus cinereus*, l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* et le Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* ont pu également être observés.

Dans le même ordre d'idée, notons aussi les 4 Faucons kobez *Falco vespertinus* observés durant le suivi de la migration pré-nuptiale à la Pointe de Grave (Gironde) (J.C. GIGALT, L.P.O, comm. pers.).

L'observation du Bécasseau falcinelle décrite dans cette note a été retenue par le Comité d'Homologation National.

REFERENCES

- DUBOIS, Ph.J et YESOU, P.(1986) - *Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France*. Paris: Secretariat de la Faune et de la Flore.
- GEROUDET, P. (1983) - *Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe*. Tome I. Neuchâtel-Paris: Delachaux et Niestlé.

Pascal GRISSER
Route de Périgueux
Gabillou
24400 MUSSIDAN

Observation d'un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* dans les Landes

Joël BRIED

Aussi fortuite que surprenante, l'observation du Pygargue s'est effectuée le 2 janvier 1986 vers 11 heures depuis une voiture circulant dans le sens Mont-de-Marsan/Dax sur la R.N. 124, aux environs de Pontonx (Landes). Le ciel était couvert, mais la visibilité était bonne.

Durant toute la durée de l'observation (une minute maximum) l'oiseau, se déplaçait en vol battu en direction du Nord-Ouest ; ce faisant, il a franchi la route pour se retrouver pratiquement à la verticale de notre véhicule à une hauteur estimée entre 15 et 20 mètres ; puis il s'est éloigné, toujours à la même altitude. Lorsqu'il fut à environ 200 mètres de la voiture, nous le perdîmes de vue.

Le bec très fort et le cou allongé de l'oiseau, l'aspect de ses ailes, sa queue courte, de couleur blanc sale et plutôt cunéiforme nous permirent d'éliminer l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* au profit du Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*. Le bec sombre et le reste du plumage d'un brun très foncé, presque noir, étaient ceux d'un immature.

Cette observation a été retenue par le Comité d'Homologation National.

Joël BRIED
Résidence "Impératrice"
22, Rue des jardins
64 200 BIARRITZ