

Les conditions météorologiques de ce printemps 1987 ont probablement dérouté cet oiseau, comme bon nombre de migrateurs qualifiés d'orientaux. Ainsi, une occurrence inhabituelle de Bécasseaux de Temminck a été notée sur plusieurs points de la façade atlantique, et d'autres espèces telles la Bargette de Terek *Xenus cinereus*, l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* et le Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* ont pu également être observés.

Dans le même ordre d'idée, notons aussi les 4 Faucons kobez *Falco vespertinus* observés durant le suivi de la migration pré-nuptiale à la Pointe de Grave (Gironde) (J.C. GIGALT, L.P.O, comm. pers.).

L'observation du Bécasseau falcinelle décrite dans cette note a été retenue par le Comité d'Homologation National.

#### REFERENCES

- DUBOIS, Ph.J et YESOU, P.(1986) - *Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France*. Paris: Secretariat de la Faune et de la Flore.
- GEROUDET, P. (1983) - *Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe*. Tome I. Neuchâtel-Paris: Delachaux et Niestlé.

Pascal GRISSER  
Route de Périgueux  
Gabillou  
24400 MUSSIDAN

## Observation d'un Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* dans les Landes

Joël BRIED

Aussi fortuite que surprenante, l'observation du Pygargue s'est effectuée le 2 janvier 1986 vers 11 heures depuis une voiture circulant dans le sens Mont-de-Marsan/Dax sur la R.N. 124, aux environs de Pontonx (Landes). Le ciel était couvert, mais la visibilité était bonne.

Durant toute la durée de l'observation (une minute maximum) l'oiseau, se déplaçait en vol battu en direction du Nord-Ouest ; ce faisant, il a franchi la route pour se retrouver pratiquement à la verticale de notre véhicule à une hauteur estimée entre 15 et 20 mètres ; puis il s'est éloigné, toujours à la même altitude. Lorsqu'il fut à environ 200 mètres de la voiture, nous le perdîmes de vue.

Le bec très fort et le cou allongé de l'oiseau, l'aspect de ses ailes, sa queue courte, de couleur blanc sale et plutôt cunéiforme nous permirent d'éliminer l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* au profit du Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*. Le bec sombre et le reste du plumage d'un brun très foncé, presque noir, étaient ceux d'un immature.

Cette observation a été retenue par le Comité d'Homologation National.

Joël BRIED  
Résidence "Impératrice"  
22, Rue des jardins  
64 200 BIARRITZ