

Observation automnale de Mésanges rémiz *Remiz pendulinus* en Béarn

Patrick HAFFNER

Le 18 octobre 1988, lors d'une visite au lac d'Uzein (Pyrénées-Atlantiques), j'ai eu l'occasion d'observer un groupe de Mésanges rémiz *Remiz pendulinus* se nourrissant sur la berge. Le groupe a été contacté pour la première fois sur la végétation colonisant les bords d'un fossé profond longeant la rive Nord-Est du lac. Les Mésanges rémiz cherchaient leur nourriture sur les Erigerons du Canada *Erigeron canadense* et les Achillées millefeuilles *Achillea millefolium*. Le petit groupe s'est ensuite dirigé vers la digue où il a été retrouvé sur les Joncs croissant au bord de l'eau. Les oiseaux étaient en perpétuel mouvement, se montrant peu, émettant sans discontinuité des petits cris ayant probablement pour effet d'assurer la cohésion du groupe. De temps à autres, des individus rejoignaient les Aulnes glutineux *Alnus glutinosa* situés à quelques mètres en aval de la digue. Dans ces conditions, il m'a été difficile de dénombrer les oiseaux. Il semble cependant qu'il y avait au moins 7 individus, dont au moins 2 jeunes. La petite troupe a ensuite été perdue de vue.

DISCUSSION

A ma connaissance, il n'existe pas de données publiées sur la présence automnale de la Mésange rémiz en Béarn. La seule observation concerne la découverte en 1965, par J.C. ALBERNY, d'un nid avec fientes au bord du lac d'Artix (Pyrénées-Atlantiques) (FORMON, 1987). L'origine des oiseaux observés à Uzein peut prêter à toutes les hypothèses possibles. Aussi, me contenterai-je de résumer les grands traits du statut de la Mésange rémiz dans le grand Sud-Ouest de la France et dans les régions adjacentes de l'Espagne.

L'espèce a niché sporadiquement en Charente-Maritime ces dernières années (FORMON, 1987). En 1987, la nidification a été constatée dans la région toulousaine (FALTA, 1988) et en Ariège (CHAULET *in* BOUSQUET et JOACHIM, 1988). En Aragon (Espagne), un adulte nourrissant 2 poussins a été observé dans la région de Huesca en 1974 (PEDROCCHI-RENAULT, 1987).

L'espèce devient plus commune au sud, dans la vallée de l'Ebre. Remontant cette vallée, l'espèce niche régulièrement depuis quelques années en Navarre et dans la province d'Alava.

En ce qui concerne les passages post-nuptiaux et l'hivernage, l'espèce est contactée régulièrement en Gironde et en Charente-Maritime depuis 1981 (FORMON, 1987). Les oiseaux bagués repris dans cette région proviennent du nord de l'Europe. En Guipúzcoa, l'hivernage a été noté pour la première fois par A. NOVAL entre novembre 1967 et février 1968, à la frontière franco-espagnole (Fuenterrabia). Le baguage a montré que des oiseaux d'origine nordique (Allemagne, Pologne) viennent hiverner en Aragon et en Navarre (NOVAL, 1975).

En conclusion, un certain nombre d'auteurs européens constatent une extension géographique vers l'ouest de la Mésange rémiz ces dernières années. L'observation du lac d'Uzein s'inscrit bien dans cette évolution. Annonce-t-elle un hivernage futur de l'espèce dans la région ?

Des passages automnaux discrets mais réguliers ont-ils lieu dans le Béarn depuis quelques années (banalisation d'une voie migratoire ouest pour les oiseaux nordiques hivernant en Espagne) ?

Voici une espèce qu'il convient de surveiller de près car son statut dans notre région est en pleine évolution.

REMERCIEMENTS : Je remercie Patrick BOUDAREL pour son aide bibliographique.

RESUME

Cet article relate une observation automnale de Mésanges rémiz *Remiz pendulinus* dans le Sud-Ouest de la France (Pyrénées-Atlantiques). Il s'agit de la seconde mention connue de l'espèce dans ce département. Après avoir rappelé le statut actuel de la Mésange rémiz dans les régions les plus proches, l'auteur remarque que son observation s'inscrit bien dans l'évolution actuelle de l'aire de répartition de cette espèce en Europe (extension vers l'ouest). Elle peut annoncer soit un hivernage futur de l'espèce dans le Béarn, soit la banalisation d'une voie migratrice ouest.

SUMMARY

This article recounts an autumnal observation of Penduline Tits *Remiz pendulinus* in the south-west of France (Pyrénées-Atlantiques). It is the second known sighting of

the species in this department. After having recalled the actual status of the Penduline Tit in the near by area, the author notices that his observation lies well within the actual evolution of the distribution zone of this species in Europe (extending towards the west). It may announce either a future wintering of the Penduline Tit in the Béarn or the fact that a migration along the western coast is becoming a common route.

RESUMEN

Este artículo relata una observación otoñal de Pájaro moscón *Remiz pendulinus* en el sudoeste de Francia (Pyrénées-Atlantiques). Se trata de la segunda mención de la especie en este departamento. Después de recordar el estatuto actual del Pájaro moscón en las regiones más próximas, el autor nota que su observación se inscribe bien en la evolución actual de la área de reparto de esta especie en Europa (extensión hacia el oeste). Puede anunciar sea una invernada futura del Pájaro moscón en el Bearn, sea el hecho que el paso por una vía migratoria sudoeste se hace común.

REFERENCES

- BOUSQUET, J.F. et JOACHIM, J. (1988) - Notes d'ornithologie régionale. *Le Pistrac* 11 : 74
- FALTA, E. (1988) - La Mésange rémiz *Remiz pendulinus* nicheuse en région toulousaine. *Le Pistrac* 11 : 41-42
- FORMON, A. (1987) - Statut de la Mésange rémiz *Remiz pendulinus* en France. Reproduction et hivernage. *La Trajhasse* 16 : 13-28
- NOVAL, A. (1975) - *El libro de la Fauna Iberica : Aves*. Volumen 4 : Aves de Marismas y riberas, Pájaros de las montañas, Aves de páramos y llanuras. Ediciones Naranco 240 pp
- PEDROCCHI-RENAULT, C. (1987) - Fauna ornítica del Alto Aragón Occidental. *Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología* n°1 C.S.I.C., Jaca 210 pp

Patrick HAFFNER
Château Lespiou
Bougarber
64230 LESCAR

