

Observation d'un Vanneau sociable dans les Landes

par S. Duchateau

Le 22 février 1997 en début d'après-midi, j'effectue une sortie d'observation au lac de Miramont-Sensacq (Landes), des collègues m'ayant signalé la présence sur ce site d'un Harle piette (*Mergus albellus*) les jours précédents. Le temps est beau et la migration de retour bat son plein : les Grues cendrées (*Grus grus*) passent par centaines dans le ciel.

Je remarque bientôt la présence d'un groupe de Vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*), posés sur une prairie rase bordant la rive droite du lac. Leur envol m'incite à les compter ; il y en a environ 200. D'emblée, je remarque la présence au sein des vanneaux d'un oiseau de coloration et d'allure différentes de ces derniers. Les conditions d'observation étant favorables et le plumage de cet oiseau caractéristique, je l'identifie sans peine comme étant un Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*) en livrée hivernale.

La troupe de Vanneaux tourne et prend de la hauteur, faisant mine de se poser à plusieurs reprises. Le Vanneau sociable reste en retrait du groupe, puis se joint à quelques retardataires et vient à passer à une vingtaine de mètres de moi seulement, se laissant détailler de près. Après plusieurs minutes d'hésitation, le groupe prend rapidement beaucoup de hauteur et s'éloigne vers le nord. J'ai le temps de photographier l'oiseau, de bien loin malheureusement. Les principaux critères permettant d'identifier cette espèce ont pu être notés :

- Ailes moins arrondies que chez le Vanneau huppé. Les rémiges primaires sont noires et contrastent avec le blanc éclatant des rémiges secondaires et des grandes couvertures. Les petites et moyennes couvertures sont de couleur brun-gris. Le dessous des ailes est entièrement blanc, à l'exception des rémiges noires.
- Pattes noires dépassant légèrement de la queue.
- Calotte sombre ; sourcil blanc se prolongeant en arrière de l'œil.
- Reste du corps blanc, à l'exception de la poitrine et du cou teintés de brun-gris.

La barre noire de l'extrémité de la queue n'a pas été notée mais était certainement présente. Je n'ai entendu aucun cri se rapportant à cet individu.

L'allure de cet oiseau est différente de celle des autres Vanneaux : vol plus régulier, moins " papillonnant " ; il semble mal comprendre les manœuvres de ses congénères et est souvent soit en avance, soit en retard sur le groupe. Lors d'une simulation de pose, familière aux Vanneaux huppés, le Vanneau sociable fut le seul à se poser réellement, avant de s'envoler bien vite pour rejoindre ses congénères.

Cette observation a été acceptée par le Comité d'Homologation National (CHN). Rappelons que le Vanneau sociable niche dans les steppes d'Asie centrale et méridionale et du sud-est de la Russie. Des individus sont vus en Europe chaque année, notamment en Italie. Lors de leurs pérégrinations, ces égarés se joignent le

plus souvent aux grandes troupes de Vanneaux huppés. En France, de une à quatre observations sont faites presque chaque année. La plupart concernent les mois de septembre à novembre, puis mars-avril (Dubois & Yesou, 1991). L'observation relatée ici est probablement la plus précoce en France à ce jour. Pour l'Aquitaine, il existe quatre données homologuées :

- 1 observé du 19 au 26 mars 1982 à St-Laurent-des-Hommes (Dordogne) par P. Grisser et al. (Grisser, 1984).
- 1 du 29 au 30 décembre 1984 à Uzein (Pyrénées-Atlantiques), observé par N. Pinczon du Sel (Grangé & Guyot, 1991).
- 1 le 13 octobre 1987 à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) par M. Fourquet (Grangé & Guyot, 1991).
- 1 le 22 novembre 1996 au marais d'Orx dans les Landes, observé par N. Ilbert (Dubois & CHN, 1997). Il pourrait s'agir du même individu que celui dont l'observation est décrite ci-dessus : cet oiseau aurait-il hiverné dans la région, ou même en Espagne ?

Références bibliographiques.

Dubois, P.J. et le Comité d'Homologation National (1997). Les oiseaux rares en France en 1996. *Ornithos* 4 (4) : 141-164.

Dubois, P.J. et Yesou, P. (1991). *Les oiseaux rares en France*. Chabaud, Bayonne.

Grangé, J.L. et Guyot, A. (1991). Inventaire des espèces rares ou occasionnelles observées dans le sud-ouest de l'Aquitaine ces dernières années (deuxième partie). *La Bergeronnette* 15 : 11-15.

Grisser, P. (1984). Observation d'un Vanneau sociable *Chettusia gregaria* en Dordogne. *Le Courbageot* 10 : 29-36.

Stéphane Duchateau
Chemin de Peyraube,
64420 Espoey

