

Première observation circonstanciée de la Panure à moustaches dans les Pyrénées-Atlantiques

par S. Duchateau

Le mercredi 13 novembre 1996, à l'occasion d'un dénombrement des oiseaux présents sur le lac collinaire de l'Ayguelongue (commune de Momas, Pyrénées-Atlantiques), j'ai eu la surprise d'observer deux Panures à moustaches (*Panurus biarmicus*), espèce appelée également Mésange à moustaches ou Mézette à moustaches, se nourrissant dans la végétation de la rive droite.

Le premier individu, assez furtif, fut repéré aux cris métalliques (" Ping !... ping ! ") caractéristiques de l'espèce. Il se déplaçait dans le réseau dense des graminées de faible hauteur croissant en bordure de l'eau. Sa détermination ne posa guère de problème : outre les cris qu'il émettait, cet oiseau arborait une longue queue, une large bande de couleur chamois sur l'aile et une teinte générale marron-beige. C'est le plumage d'une femelle.

Quelques dizaines de mètres plus loin, un second individu attira mon attention par ses cris. Au contraire du précédent, celui-ci se laissa admirer un long moment alors qu'il vaquait à ses occupations alimentaires sur le haut des touffes de graminées. Il se posa sur une haute tige, bien en vue, pour m'observer à son tour, à quelques mètres. Il s'agissait cette fois d'un jeune mâle aux " moustaches " noires non formées, mais présentant un petit masque noir et une coloration d'ensemble jaunâtre. Je pus en outre noter le petit bec jaune et l'œil jaune également, avec en son centre l'iris noir.

Après avoir détaillé cet oiseau, je continuai mon chemin. Au retour, j'entendis au même endroit les cris d'un individu sans l'apercevoir.

La femelle fut revue le 17 novembre par A. Guyot. Il s'agit, à ma connaissance, de la seule mention récente de cette espèce dans les Pyrénées-Atlantiques. La seule donnée, imprécise, émane de Darracq (1836) qui qualifie la Panure à moustaches de " rare dans les joncs de la Bidassoa " à Hendaye.

D'autres observations pourraient cependant être effectuées, notamment sur la côte basque où il existe quelques véritables roselières (ce qui n'est pas le cas en Béarn), car cette espèce n'est pas rare tant en Espagne que dans le Nord de la France. En Gironde, elle nichait régulièrement depuis 1975 au moins (Letellier, 1975 ; Boutet & Petit, 1987), mais semblerait avoir disparu à l'heure actuelle (LPO Aquitaine, in litt.).

Références bibliographiques.

Boutet, J.Y. et Petit, P. (1987). **Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine (1974-1984)**. CROAP, Bordeaux.

Darracq, P.V. (1836). Catalogue des oiseaux du département des Landes et des Pyrénées occidentales. **Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux** 8 : 3-51.

Letellier, Y. (1975). Observations et découvertes du premier cas de nidification de la Mésange à moustaches *Panurus biarmicus* sur le delta de l'Eyre (Bassin d'Arcachon). **Le Courbageot** 2 : 11-12.



Stéphane Duchateau
Chemin de Peyraube,
64420 Espoey