



Cigogne blanche au nid (*Ciconia ciconia*), le Teich, mai 1995.  
Photo : L. Couzi



et qu'elles restent pour le moment sans lendemain, les sites n'étant plus occupés les années suivantes. Cependant, on peut espérer voir à terme s'installer une petite population plus stable en Aquitaine, pour peu que quelques sites favorables fassent ou continuent de faire l'objet de mesures de gestion appropriées (peu de dérangement et surtout niveaux d'eau adaptés), assurant le succès de reproduction des couples pionniers.

#### Bibliographie:

- Blake G. (1999). Nidification de l'Echasse blanche (*Himantopus himantopus*). LPO infos -Aquitaine 18, 4.
- Deceuninck B. & Mahéo R. (1998). Limicoles nicheurs de France. Synthèse de l'enquête nationale 1995-1996 et évolution des populations sur 12 ans. Ornithos 5(3), 97-117.
- Delaporte P., Dubois P.J. & Robreau H. (1994). Echasse blanche, in Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989. Société Ornithologique de France, Paris, pp. 268-271.
- Fleury A. (1998). La Spatule blanche sur le Bassin d'Arcachon : statut de l'espèce et mesures de conservation menées de 1972 à 1995. Le Courbageot 15, 23-28.
- Hentz J.L. (1997). Enquête Limicoles 1995-1996. LPO infos -Aquitaine 8, 7.
- Yeatman-Berthelot D. & Jarry G. (1994). Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989. Société ornithologique de France, Paris, p. 271.

Stéphane Duchateau

### Bilan de la nidification 2000 de la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) en Aquitaine

En 2000, les 108 couples de Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) nicheuses recensés en Aquitaine ont produit 276 jeunes à l'envol dont près de 64 % proviennent du département de la Gironde.

L'effort important de marquage des jeunes (63%) s'effectue dans le cadre d'un programme national de suivi de l'espèce dirigé par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux du Museum d'Histoire Naturel de Paris; en Aquitaine, il permet de mieux suivre la dynamique de population de cette espèce (Fleury en préparation).

La tempête de décembre 1999 a entraîné la destruction de plusieurs nids.

Tableau 1 : la reproduction de la Cigogne blanche en Aquitaine en 2000.

Commune	Couples Nicheurs	Jeunes Produits	Jeunes Bagués
Le Teich	33	85	85
Bruges	3	10	8
Blanquefort	1	2	2
Ludon	1	4	0
Ordonnac	1	4	4
Soulac	1	4	0
Vendays	1	2	2
Vensac	1	3	3
St-Louis-de-Montferrand	1	4	0
St Loubés	1	5	5
Moulon	1	4	4
Prignac-et-Marcamps	1	4	0
Anglade	5	22	11
Etauliers	2	5	2
Braud-et-St-Louis	2	6	6
St-Ciers-sur-Gironde	3	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>176</b>	<b>144</b>

Tableau 2 :

Résultat de la reproduction de la Cigogne blanche en Gironde en 2000.

En 2000, des nouveaux couples se sont installés sur des arbres étêtés compensant la disparition des sites de reproduction traditionnels.

Le premier nid découvert en 2000 sur la commune d'Etauliers serait fonctionnel depuis trois ans.

Alain Fleury

	33	40	64	TOTAL
Couples Nicheurs	58	43	7	108
% Couples nicheurs	53,7	39,8	6,5	100
Jeunes Produits	176	80	20	276
% Jeunes produits	63,8	29	7,2	100
Jeunes Bagués	144	19	11	174