

Figure : nombre de couples nicheurs et de jeunes à l'envol d'Eider à duvet sur la Réserve Naturelle du Banc d'Arguin.

Jusqu'à cette date, malgré un problème de survie des poussins liée en partie à un dérangement touristique important et aux forts courants marins environnant (Boutet & Petit, 1987), le Banc d'Arguin était devenu le site phare de reproduction de l'Eider à duvet en France. Depuis le mois de février 2000, consécutivement au naufrage du pétrolier Erika, aucun individu n'a été observé sur le site. Bien que rien ne puisse prouver la responsabilité de la marée noire dans la disparition des Eiders du Banc d'Arguin, la coïncidence est troublante. A l'heure actuelle, même si la bonne santé démographique de l'espèce à l'échelon européen permet d'envisager un jour de nouvelles observations d'Eiders à duvet au Banc d'Arguin en période estivale, la réduction de la superficie des bancs de sable rend incertain le retour d'individus nicheurs.

Remerciements

L'ensemble du personnel et des bénévoles de la SEPANSO, qui ont participé aux observations et à la mise en place de mesures de protection de l'Eider à duvet sur la Réserve naturelle du Banc d'Arguin, sont sincèrement remerciés.

Bibliographie

Berthelot, D., & Sériot, J. (1999). Eider à duvet (*Somateria mollissima*). In : Rocamora, G. & Yeatman-Berthelot, D. *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation*, pp 128-129. Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris. 560 pp.
 Yésou, P. & Leray, G. (1994). Eider à duvet *Somateria mollissima*. In : Yeatman-Berthelot, D. & Jarry, G. *Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*, pp. 152-153. Société Ornithologique de France. Paris. 776 pp.
 Boutet, J.Y., & Petit, P. (1987). *Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine. 1974-1984*. Centre Régional Ornithologique Aquitaine-Pyrénées. Bordeaux. 241 pp.

Christophe Le Noc & Julien Guernigon
 SEPANSO, 3, rue de Tausia,
 33 000 Bordeaux

En direct du CHN

Le Comité d'Homologation National nous a fait part de l'homologation récente des données suivantes, concernant l'Aquitaine (et pour l'une d'entre elles les Hautes-Pyrénées) :

Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) : Tardets-Sorholus (64), 6 septembre 2000 (S. Hommeau).

Aigle criard (*Aquila clanga*) : 1er hiver, St Martin-de-Seignanx (40), 15 février 2000 (M. Zucca).

Faucon d'Éléonore (*Falco eleonora*) : Ahusquy (64), 9 mai 1998 (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).

Faucon d'Éléonore (*Falco eleonora*) : adulte, Montory (64), 7 mai 2000 (D. & S. Vincent).


Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*) : adulte, Hossegor (40), 2 février 2000 (B. Lamothe). 1 adulte, Arcachon (33), 24 décembre 2000 (B. Lamothe).

Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) : 1er hiver, Lège-Cap Ferret (33), 8 octobre 2000 (O. Le Gall, B. Delprat, J.-Y. Kernel, J.-P. Gans, D. Baudry).

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*) : 1er hiver, Hossegor (40), 22 janvier au 2 février 2000 (A. Guyot, G. Blake, B. Lamothe).

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucooides*) : 1er hiver, Moliets-Plage (40), 6-20 février 2000 (A. Guyot, G. Blake).

Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*) : juvénile, Puydarieux (65), 15 septembre 2000 (C. Bergès).



Coucou gris
 (*Cuculus canorus*)
 Dessin : J.L. Verrier

Liste des espèces soumises à homologation en France au 1^{er} janvier 2000

Liste n°1: espèces occasionnelles au niveau national (catégories A, B et C)

Légende : (1) : sauf Méditerranée, (2) : sauf Corse, (3) : sauf Corse, Aude, Pyrénées-Orientales, (4) : sauf Cévennes

Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii*
 Albatros à sourcils noirs *Diomedea melanophrys*
 Albatros hurleur *Diomedea exulans*
 Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii*
 Puffin semblable *Puffinus assimilis*
 Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus*
 Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmaeus*
 Aigrette des récifs *Egretta gularis*
 Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala*
 Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*
 Oie naine *Anser erythropus*
 Bernache à cou roux *Branta ruficollis*
 Sarcelle élégante *Anas formosa*
 Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris*
 Eider à tête grise *Somateria spectabilis*
 Éristature rousse *Oxyura jamaicensis*
 Éristature à tête blanche *Oxyura leucocephala*
 Élanion blanc *Elanus caeruleus*
 Vautour moine *Aegypius monachus* (4)
 Busard pâle *Circus macrourus*
 Buse féroce *Buteo rufinus*
 Buse pattue *Buteo lagopus*
 Aigle pomarin *Aquila pomarina*
 Aigle criard *Aquila clanga*
 Aigle des steppes *Aquila rapax*
 Aigle impérial *Aquila heliaca*
 Aigle ibérique *Aquila (heliaca) adalberti*
 Faucon crécerellette *Falco naumanni*
 Faucon d'Éléonore *Falco eleonora* (1)
 Faucon lanier *Falco biarmicus*
 Faucon sacre *Falco cherrug*
 Faucon gerfaut *Falco rusticolus*
 Marouette poussin *Porzana parva*
 Marouette de Baillon *Porzana pusilla*
 Talève d'Allen *Porphyrio alleni*
 Talève sultane *Porphyrio porphyrio*
 Foulque caronculée *Fulica cristata*
 Outarde houbara *Chlamydotis undulata*
 Grande Outarde *Otis tarda*
 Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni*
 Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii*
 Pluvier asiatique *Charadrius asiaticus*
 Pluvier fauve *Pluvialis fulva*
 Vanneau sociable *Chettusia gregaria*
 Vanneau à queue blanche *Chettusia leucura*
 Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis*
 Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*
 Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*
 Bécassine double *Gallinago media*
 Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*
 Chevalier barge *Tringa cinerea*
 Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*