

Inventaire de l'avifaune observée en Dordogne au cours du XX^e siècle

Seconde partie, les hivernants

Jean-Claude Bonnet

Cet article fait suite à celui publié dans le n° 18 du Courbageot (Bonnet, 20001) et qui faisait le point sur l'avifaune nicheuse de Dordogne. Il se propose donc de compléter l'analyse en étudiant le statut des espèces hivernantes et de passage. Là encore, il faut souligner que le présent inventaire doit beaucoup à celui publié en 1993 à l'initiative de la SEPANSO Dordogne.

Pour l'essentiel, ce chapitre traitera de l'hivernage d'espèces non nicheuses dans notre département. Quelques espèces, pour lesquelles l'effectif des hivernants est très nettement supérieur à celui des couples nicheurs en Dordogne, seront également évoquées.

1) Oiseaux fréquentant les zones humides

La Dordogne est un département pauvre en zones humides. En dehors des grands cours d'eau, il subsiste cependant quelques portions de vallées marécageuses mais la plupart sont menacées de disparition, soit au profit de l'agriculture (drainages afin de développer la maïsiculture, plantations de peupleraies), soit en raison du développement de la pisciculture (vallées des Beunes), soit enfin par la création de plans d'eau à vocation touristique (vallées du Coly et de la Germaine). Compensant partiellement ces disparitions, la création de quelques grands plans d'eau à vocation agricole (Etangs de Miallet, de Lescourrou...) ou dérivés de l'exploitation de gravières (Etangs de Saint Antoine de Breuilh) offre de nouvelles potentialités en ce qui concerne l'hivernage des espèces inféodées aux zones humides.

Nous distinguerons hivernants réguliers, irréguliers et occasionnels.

1.a) Les hivernants réguliers

Le Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

N'était observé qu'au passage jusqu'au milieu des années 80. Depuis 1987, l'hivernage est devenu régulier dans le département. D'abord limité au secteur de Mauzac sur la Dordogne, il a ensuite essaimé sur cette vallée, tant en aval (Bergerac, Le Fleix) qu'en amont

(Beynac, Veyrignac). Dans le même temps des repaires étaient découverts sur les vallées de l'Isle et de la Vézère puis, au nord du département, au bord de l'Etang Grothier.

Cette expansion des zones d'occupation s'est accompagnée d'une augmentation sensible des effectifs : de quelques dizaines d'oiseaux présents dans le cingle de Trémolat durant l'hiver 87, on est passé à plus de 300 fréquentant les 4 repaires connus pendant l'hiver 91 - 92 et à 500 en 97 - 98. Depuis cette date, les effectifs sont stables - voire en légère baisse. Il est vrai que la préfecture autorise désormais le tir de 50 oiseaux par an...

Les premiers oiseaux ont tendance à être observés de plus en plus tôt (courant juillet) mais le gros des troupes ne s'installe que fin octobre et en novembre, les effectifs augmentant jusqu'en décembre. Le départ débute en février pour se généraliser en mars. Les derniers individus sont observés en avril .

Les analyses des contenus stomacaux effectuées à l'initiative de la garderie de pêche de la Dordogne prouvent que le grand cormoran consomme surtout des poissons de faible valeur marchande. Cependant, ici comme ailleurs, il faut bien reconnaître que si son impact sur les grands cours d'eau est parfaitement supportable, par contre il peut être beaucoup plus gênant sur certains plans d'eau et piscicultures.

Le Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Uniquement connu comme hivernant jusqu'en 1988, il s'est ensuite installé comme nicheur sur plusieurs sites mais tout indique que la population hivernante est nettement supérieure à la population nicheuse.

Les principaux sites d'hivernage sont suivis et ne témoignent pas d'une évolution spectaculaire des effectifs. Par contre, il faut noter une augmentation significative du nombre de petits étangs ou bords de cours d'eau recevant un ou deux individus en hiver.

Au total, la prédation du Héron cendré sur le poisson semble beaucoup mieux acceptée par les pêcheurs que celle du Grand cormoran. Il est vrai que nombre d'entre eux ont observé que le héron se nourrissait aussi en plein champ, donc de façon beaucoup plus diversifiée.



Où voir des oiseaux d'eau en Dordogne

Parmi les canards de surface, l'espèce la mieux représentée est bien entendu le colvert (*Anas platyrhynchos*) mais parmi les quelques milliers d'oiseaux hivernant chaque année, quelle est la part d'individus véritablement sauvages ? Autres espèces régulières mais avec de faibles effectifs : la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*), le Canard chipeau (*Anas strepera*), le siffleur (*Anas penelope*) et le souchet (*Anas clypeata*).

Les seuls canards plongeurs que l'on puisse considérer comme hivernants réguliers sont le Fuligule milouin (*Aythya ferina*) et le Fuligule morillon (*Aythya fuligula*), là encore en faible nombre et avec un seul site fréquenté régulièrement (Étangs de Prignonrieux).

La Foulque macroule (*Fulica atra*)

Seuls quelques couples nichent en Dordogne depuis 1995. La population atteint au mieux, au cœur de l'hiver, quelques centaines d'oiseaux dispersés sur les grands cours d'eau ou se rassemblant sur quelques étangs.

La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

Fréquente régulièrement les berges de certains cours d'eau ou étangs, les zones inondées. Le record est de plus de 80 oiseaux notés par Pascal Grisser en février 82 à St Laurent des Hommes.

La Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

Bien qu'elle ne niche pas dans notre département, elle peut y être observée toute l'année. Ses effectifs augmentent en hiver, surtout lors des tempêtes et vagues de froid.

Le Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

Régulier en hivernage de la seconde quinzaine d'octobre à fin avril, il fréquente alors les bords de cours d'eau, gravières et étangs. Selon Pascal Grisser, le pic d'abondance se situerait en mars.

Le Canard pilet (*Anas acuta*)

N'effectue des séjours prolongés que très irrégulièrement et en faible nombre. Il en va de même pour l'Oie cendrée (*Anser anser*) : 3 individus à Mussidan du 3 au 8 mars 81 (Pascal Grisser), 1 oiseau présent à Mauzac en février 86.

Les vagues de froid prolongées se traduisent parfois par l'hivernage :

- du Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*) : 1 mâle et une femelle à Mauzac en janvier 87 (J.C. Bonnet), 1 femelle à Gout-Rossignol fin décembre 96 (F. Chiche)
- du Harle bièvre (*Mergus merganser*)
- du Harle piette (*Mergus albellus*) : plusieurs à St Capraise de Lalinde en janvier 63 (P. Arnouil), jusqu'à 34 en janvier 85 à Mauzac (J.C. Bonnet), 3 en janvier 97 à La Force (J.L. Verrier)
- du Goéland cendré (*Larus canus*) : plusieurs immatures à Mauzac en janvier 85 (J.C. Bonnet).

Plus exceptionnellement encore, l'hivernage d'un Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*) à Mauzac en janvier 85, d'un autre à Vergt en février - mars 86 (J.C. Bonnet), celui d'un mâle de Nette rousse (*Netta rufina*) à Prignonrieux en février 87 (J.C. Bonnet), et d'une femelle de Fuligule milouin (*Anthya marila*) à l'Étang de Gurçon en janvier 97 (B. Eliotout). Enfin la présence pendant 3 semaines (fin janvier et début février 85) d'une petite troupe de 13 Cygnes de Bewick (*Cygnus columbianus*) qui ont erré entre Mauzac et Bergerac (S. Fagette) ou celle de 15 Cygnes chanteurs (*Cygnus cygnus*) en février 1956 à Tuilières (P. Arnouil) et d'un autre au Fleix en mars 94 (B. Eliotout).

C'est à la suite de tempêtes d'ouest que l'on a pu observer l'hivernage de la Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) présente à Mauzac du 22 janvier au 7 mars 1984 (S. Fagette). Nombre de ces oiseaux sont morts de faim, certains se sont adaptés, pêchant des ablettes ou venant quémander des poissons auprès des pêcheurs locaux. L'une d'elles avait pris l'habitude de venir donner des coups de bec sur les bouchons, ce qui agaçait certains pêcheurs mais amusait beaucoup la plupart d'entre eux, qui lui distribuaient généreusement le fretin. J'ai également observé en cette occasion une Mouette tridactyle qui se nourrissait du cadavre de l'une de ses congénères.

A un hiver particulièrement sec (88-89) a coïncidé à Mauzac l'hivernage d'un Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) et d'un Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*). Depuis, l'hivernage de ces 2 espèces a été à nouveau constaté à plusieurs reprises.

Enfin, il faut noter l'hivernage d'un Plongeon imbrin (*Gavia immer*) à Prignonieux en décembre 86 (J.C. Bonnet), d'un autre à l'Etang de La Jemaye en janvier 98 (P. Grisser) et celui de 2 Plongeurs catmarins (*Gavia stellata*) à Mauzac en décembre 90 (J.C. Bonnet).

Pour ce qui est des ardéidés, à noter l'hivernage d'une Grande Aigrette (*Egretta alba*) à l'Etang Grolhier en décembre 95 et janvier 96 (F. Fély), de 3 autres de novembre 97 à janvier 98 à l'Etang de Grolégeac (H. Versteegh) et celui d'un Butor étoilé (*Botaurus stellaris*), à Mauzac, d'octobre à décembre 84 (S. Fagette). Peut-être est-ce le même oiseau qui a été observé au même endroit en octobre 85 et en janvier 87 ...

2) Oiseaux fréquentant les haies, bois et forêts

2.a) Hivernants réguliers

La Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) est un hôte régulier de décembre à février alors que sa présence en temps que nicheur semble exceptionnelle.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*), Grive litorne (*Turdus pilaris*), Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*), bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*), Mésange noire (*Parus ater*) et Gros-bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) sont également des hivernants réguliers mais leurs effectifs varient considérablement d'une année à l'autre.

2.b) Hivernants rares

Le Milan royal (*Milvus milvus*) est présent lors de certains hivers froids (janvier 85).

Le Bruant fou (*Emberiza cia*) était observé assez régulièrement dans les années 80, de novembre à mars, essentiellement dans des "clairières buissonnantes avec végétation basse et relativement abondante", parfois isolément, mais " le plus souvent en petites troupes comptant jusqu'à 10 à 20 individus et se nourrissant au sol " (P. Grisser, Le Courbageot n°12). Depuis une dizaine d'années les observations de Bruant fou sont devenues rarissimes.

A noter tout de même 3 mâles et 1 femelle le 24/2/90 à St Martin Le Pin et quelques oiseaux le 25/12/90 à Champeaux-et- La- Chapelle- Pommier (F. Fély)

3) Avifaune recherchant les milieux ouverts

3.a) Hivernants réguliers

Le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : oiseau bien présent en hiver dans les zones de plaines (secteurs de Bergerac, Mauzac, Mussidan ...) et dans les secteurs de grande culture céréalière, ses effectifs augmentent parfois de façon considérable pendant les vagues de froid.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*), Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*) et Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) sont abondants sur les plaines et grandes surfaces labourées. Les Corbeaux freux (*Corvus frugilegus*) s'installent en novembre. En 1978, P. Grisser signalait l'existence de deux dortoirs associant Corbeaux freux et choucas et comptant chacun environ 5000 individus : l'un à Neuvic sur l'Isle, l'autre à l'ouest de Tocane.


3.b) Hivernants occasionnels

En général associé au vanneau, le pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) est noté certains hivers en petites troupes sur les vallées de l'Isle dans la région de Mussidan et de la Dordogne dans le secteur de Bergerac.

La Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

est quant à elle un hivernant encore plus rare : un oiseau à Varennes en janvier 1951 (P. Arnouil), un à Faux en janvier-février 1973 (P. Arnouil), un à Grand Castang en décembre 80 - janvier 81 (J.C. Bonnet). Pour clore la liste de ces observations hivernales, à noter la Pie-grièche grise découverte le 12/2/84 à Campsegret par S. Fagette et celle vue par P. Grisser à St Michel de Double le 12/3/77.

.....
Milan royal (*Milvus milvus*) posé et en vol
Photos : P. Petit



La Pie-grièche méridionale (*Lanius meridionalis*) :

Un oiseau présent à la Lande des Trois Pierres, sur la commune de Champeaux-et-La-Chapelle-Pommier, du 19/8/91 au 4/3/92 (F. Fély).

4) Oiseaux présents sur les zones de falaises

Deux passereaux appartenant à l'avifaune montagnarde sont à considérer comme hivernants réguliers dans notre département.

Le **Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)** fréquente chaque année les vallées de la Dordogne entre Caudon et Beynac et de la Vézère entre Le Moustier et St Cirq du Bugue. Parfois noté en hiver sur certaines églises et châteaux, cet oiseau doit également pouvoir être observé sur la vallée de la Dronne entre Brantôme et Bourdeilles. Les premiers hivernants sont constatés fin octobre ou début novembre (date la plus précoce : le 27 octobre 84), les dernières observations se situent en général fin mars / début avril avec parfois des mâles en plumage nuptial. Généralement on n'observe que des oiseaux isolés, parfois 2 individus semblent cohabiter sur la même falaise mais les querelles territoriales sont alors fréquentes. La population hivernante du tichodrome sur les falaises de Dordogne est sans doute inférieure à la dizaine d'individus depuis le début des années 90, elle était probablement supérieure auparavant.

L'**Accenteur alpin (*Prunella collaris*)** est parfois noté sur les mêmes sites que le tichodrome. Il affectionne plus particulièrement certains châteaux (Beynac, Castelnaud...) mais aussi les rues des villages situés en contrebas des falaises (Les Eyzies) ou longeant leurs sommets (Domme). Pascal Grisser a signalé l'observation d'un oiseau dans la cour d'une usine à Bergerac, recherchant sa nourriture parmi des graviers. En général les contacts concernent des petits groupes comptant jusqu'à 5-6 individus. La période d'observation s'étend de mi-octobre à mi-mars.

Les oiseaux de passage :

Seront évoquées dans ce chapitre les espèces non nicheuses en Dordogne, observées lors des migrations de printemps et d'automne, ou dont la présence a pu être notée " accidentellement " en hiver, sans que l'on puisse vraiment parler d'hivernage. L'ordre adopté sera celui retenu par la plupart des grands guides d'identification. Les circonstances de l'observation et noms des observateurs seront indiqués chaque fois que ces observations sont à considérer comme rares ou exceptionnelles dans le département.

Les espèces suivies de l'indication (10 Obs.) seront celles pour lesquelles nous ne disposons que d'un maximum de 10 observations au cours du XX^e siècle, celles suivies de l'indication (1 Ob.) n'ont donné lieu qu'à une seule observation pendant cette période.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*) (10 Obs.)

1 juv. tué à Lalinde le 27/11/68 (P. Arnouil). Un individu trouvé épuisé à Neuvic le 3/11/92 (J.P. Ronteix).

Plongeon imbrin (*Gavia immer*) (10 Obs.)

1 le 12/12/44 et 1 le 2/12/50 à St Capraise de Lalinde (P. Arnouil), 1 le 2/12/52 à Mauzac (P. Arnouil), un premier hiver à l'Etang de La Jemaye le 18/1/98 (P. Grisser).

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*) (10 Obs.)

1 à l'Etang de Miallet le 20/4/94 en plumage nuptial (F. Fély).

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) (10 Obs.)

1 à St Capraise de Lalinde le 17/12/44, 1 au barrage de Bergerac le 15/8/65 (P. Arnouil), 1 à l'Etang de La Jemaye le 30/3/91 (P. Grisser), 1 le 22/4/94 à l'Etang de Miallet et 2 le 24/4/95 sur le même site (F. Fély), 1 au barrage de Mauzac le 15/1/95 (S. Fagette), 1 à l'Etang de Lescourrou du 7 au 14/9/96 (J.C. Bonnet).

Oceanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*) (10 Obs.)

Plus de 15 à St Laurent des Hommes le 14/12/78 et encore 2 à Mussidan le 15/2/78 (P. Grisser), plusieurs à Lalinde aux mêmes dates (P. Arnouil), 1 à Mauzac le 8/11/2000 (J.C. Bonnet).

Fou de Bassan (*Morus bassanus*) (10 Obs.)

1 tué à Bergerac le 21/10/59, 1 à Lalinde le 5/4/62 (P. Arnouil), 1 adulte découvert épuisé à St Antoine de Breuil le 8/11/2000 (J.P. Ronteix).

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) (10 Obs.)

1 à Mauzac le 21/1/47 et 1 à Cause de Clérans le 22/1/50 (P. Arnouil), 1 à l'Etang Grolhier le 30/11/80 et 1 sur le même site le 10/9/81 (F. Fély), 1 le 6/5/85 à Mauzac (Mr Garcia), 1 à l'Etang de La Jemaye le 16/3/2000 (F. Jouhandoudet).

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

Nicheur jusqu'au début des années 60. Depuis une quarantaine d'années, observé seulement au passage et de plus en plus rarement.

Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) (1 Ob.)

1 juvénile en juillet 99 à St Médard de Mussidan (Mme Letraut).

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Présence de plus en plus régulière en fin d'été et début d'automne. Notée au passage à presque tous les mois de l'année.

Grande aigrette (*Egretta alba*) (10 Obs.)

1 au barrage de Mauzac le 21/9/94 (J.C. Bonnet), 1 à l'Etang de Lescourrou le 29/11/97, 1 aux étangs de Beynac le 14/11/99 et 1 autre à Mauzac le 6/11/2000 (J.C. Bonnet).

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

Observé aux passages de printemps et d'automne mais ces observations se raréfient depuis une dizaine d'années.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Notée de plus en plus fréquemment lors des 2 passages migratoires.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

Observée elle aussi de plus en plus fréquemment... mais aucune tentative de nidification pour le moment en Dordogne.

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)(10 Obs.)

1 femelle adulte à Bergerac en mars 1949 (P. Arnouil), 1 tuée à St Jory de Chalais le 12/10/56 (journal Sud-Ouest), 3 à Cours de Pile le 20/11/58 (P. Arnouil).

Oie des moissons (*Anser fabalis*)

2 posées à St Médard de Mussidan le 3/1/79, 19 à St Médard de Mussidan le 21/1/85 (P. Grisser), 1 à Mauzac le 25/10/92 (J.C. Bonnet), vols le 21/2/99 à St Mayme de Pereyrol (D. Cauchoix).

Oie cendrée (*Anser anser*)

Observée aux 2 passages lors de forts vents d'ouest.

Bernache cravant (*Branta bernicla*) (1 Ob.)

1 à Mauzac le 15/4/94 (D. Cauchoix).

Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*)

Espèce placée en catégorie C de la "Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental". Une le 11/9/93 à Prigonrieux (J.C. Bonnet), 1 au barrage de Mauzac le 12/1/98 (S. Fagette).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) (10 Obs.)

3 le 8/2/86 à Beynac (J.C. Bonnet), 6 le 12/1/87 à Mauzac (S. Fagette), 2 à Lescourrou le 7/1/96, 1 à Miallet le 11/1/96, 1 à l'Etang de Monmarvès le 22/12/96 (P. Durand), 2 à Mauzac le 17/11/98 (J.C. Bonnet).

Canard mandarin (*Aix galericulata*)

Espèce placée en catégorie C de la "Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental".
1 mâle le 11/12/93 à Mauzac (J.C. Bonnet).

Canard pilet (*Anas acuta*)

Vu aux passages migratoires sur quelques plans d'eau mais rare comme hivernant.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

Vue irrégulièrement aux 2 passages.

Nette rousse (*Netta rufina*) (1 Ob.)

Un mâle présent sur les gravières de Prigonrieux en août 91 (L. Couzi).

Macreuse noire (*Melanitta nigra*) (1 Ob.)

1 au barrage de Tuilières le 3/1/73 (P. Arnouil).

Macreuse brune (*Melanitta fusca*) (10 Obs.)

2 sur la Dordogne à Varennes le 13/1/68 (P. Arnouil), 1 femelle à l'Etang de Miallet le 7/1/96 (Mr Labidoire SEPOL).

Harle huppé (*Mergus serrator*) (1 Ob.)

1 mâle juvénile à Tuilières le 24/11/53 (P. Arnouil).

Milan royal (*Milvus milvus*)

Très régulier aux 2 passages, rare en tant qu'hivernant, exceptionnel comme nicheur.

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) (1 Ob.)

1 à Castelnaud le 20/5/94, remontant la vallée du Céou (G. Lecordier).

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) (1 Ob.)

1 immature présent le 1/5/97 à Chassignes près de Ribérac (Y. Cambon).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

Observé régulièrement aux 2 passages migratoires.

Busard pâle (*Circus macrourus*) (1 Ob.)

1 mâle présent à Faux du 14 avril à mi-mai 93 (P. Durant). A tenté pendant 3 semaines de s'apparier avec une femelle de Busard St Martin.

Aigle criard (*Aquila clanga*) (1 Ob.)

1 juvénile tué dans le Bergeracois le 15/10/1951 (P. Arnouil).

Aigle botté (*Hieraetus pennatus*)

Observé très irrégulièrement aux 2 passages.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

Régulier aux 2 passages, stationne parfois assez longuement au printemps.

Faucon Kobez (*Falco vespertinus*) (10 Obs.)

1 femelle immature à Vézac près de Mussidan les 19 et 20/5/86 (P. Grisser), 1 femelle à Montignac le 24/5/86 (D. Rat), 1 femelle à Faux le 9/9/90 (P. Durant), 1 mâle à St Mayme de Pereyrol du 21 au 23/5/92 (D. Cauchoix).

Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

Observé assez régulièrement au passage en automne.

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) (10 Obs.)

1 à Lanquais le 28/2/61 (P. Arnouil), 1 entendue le 1/4/2000 à Nanteuil de Bourzac 88 (F. Jouhandoudet).

Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*) (1 Ob.)

1 femelle adulte à Trémolat le 29/10/74 (P. Arnouil).

Grue cendrée (*Grus grus*)

La Dordogne se trouve sur l'axe migratoire classique de l'espèce qui a toutefois tendance à passer plus à l'ouest de notre département en migration de printemps qu'en migration d'automne. Un immature a hiverné à Montagnac la Crempse en 95-96 et 96-97.

Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*) (1 Ob.)

1 à Port de Couze le 18/9/62 (P. Arnouil).

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) (10 Obs.)

4 au barrage de Bergerac le 4/5/79 (P. Arnouil), 1 oiseau le 1/6/82 à Gurat sur la Lizonne, 1 à Bergerac le 9/4/85 (J.C. Bonnet), 7 à St Laurent des Hommes les 23 et 24/4/88 (P. Grisser), 3 à Prigonrieux le 29/5/88 (L. Couzi), 2 à Mauzac le 8/4/92 (J.C. Bonnet) et 2 à l'étang de Miallet le 22/4/94 (F. Fély)

Pour le moment nous ne disposons donc que d'observations de printemps.

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) (10 Obs.)

1 individu posé le 2/4/77 à St Laurent des Hommes (P. Grisser), 3 à Bergerac le 4/5/79 (P. Arnouil), un vol de 22 le 29/9/81 à St Laurent des Hommes (P. Grisser), 5 à Mauzac le 5/5/82 (Mr Garcia), 5 à l'Etang Grolhier le 1/12/97 (Y. Cambon), 12 à Lanquais le 3/4/98 (M. Hoare), 2 à l'Etang de Lescourrou le 15/9/98 (J.C. Bonnet).

Petit gravelot (*Charadrius dubius*)

Observé régulièrement aux 2 passages migratoires, par ailleurs nicheur irrégulier.

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*)

1 à Mauzac le 5/10/46 (P. Arnouil). Vu irrégulièrement au passage d'automne à St Laurent des Hommes (P. Grisser) et à l'Etang de Miallet (F. Fély), régulier à l'automne à l'Etang de Lescourrou (J.C. Bonnet).

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) (10 Obs.)

1 à St Laurent des Hommes le 23/5/83 (P. Grisser), 1 le 1/11/95 à l'Etang de Lescourrou , 1 autre le 3/5/97 sur le même site (J.C. Bonnet) et 2 le 11/9/99, toujours à l'Etang de Lescourrou (D. Cauchoix).

Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*) (1 Ob.)

1 en plumage nuptial du 19 au 25/3/82 à St Laurent des Hommes en compagnie de vanneaux huppés (P. Grisser).

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) (10 Obs.)

1 à l'Etang de Lescourrou le 23/9/96 (P. Durant), sur le même site 2 le 5/9/98 (J.C. Bonnet) et 1 autre le 5/9/99 (P. Durant)

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

2 du 15 au 17/8/89 à Prigonrieux et 1 autre sur le même site le 1/9/90 (L. Couzi). Régulier au passage d'automne à Lescourrou depuis 1995 (J.C. Bonnet).

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) (10 Obs.)

1 à St Laurent des Hommes le 11/5/79 (P. Grisser) et 2 à Lescourrou le 28/8/2000 (J.C. Bonnet).

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) (10 Obs.)

4 à l'Etang de Lescourrou le 21/9/96 (J.C. Bonnet) et sur le même site 2 juvéniles le 2/9/97, 1 oiseau le 5/9/98 (B. Eliotout) et 2 le 6/9/99 (J.C. Bonnet).

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

1 à Mauzac le 19/5/46 (P. Arnouil), 1 à Mauzac en septembre 84 (J.C. Bonnet), 1 à St Laurent des Hommes en novembre 84 (P. Grisser), 1 à Mauzac le 20/3/91 et 1 autre sur le même site le 22/3/92 (J.C. Bonnet), 33 le 12/12/94 à l'Etang de Miallet (F. Fély). Régulier à l'automne à l'Etang de Lescourrou depuis 1996.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

1 femelle à Pontours le 4/5/67 (P. Arnouil), de passage assez régulier à St Laurent des Hommes (P. Grisser) et à l'automne à l'Etang de Lescourrou.

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) (10 Obs.)

1 à la poudrière de Bergerac le 2/12/67 (P. Arnouil), 1 à St Laurent des Hommes le 15/1/81 et 1 autre sur le même site le 21/3/82 (P. Grisser). A la fois de passage et hivernant.

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

1 à Varennes le 10/4/51 (P. Arnouil). Régulièrement contactée au passage à St Laurent des Hommes de 79 à 86 (P. Grisser). Une le 13/3/83 à Mauzac et 1 juvénile le 1/11/95 à l'Etang de Lescourrou (J.C. Bonnet)

Barge rousse (*Limosa lapponica*) (10 Obs.)

1 à St Laurent des Hommes le 3/5/81 (P. Grisser) et 1 le 10/9/91 à Mauzac (J.C. Bonnet).

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) (10 Obs.)

1 à St Laurent des Hommes le 11/5/82 (P. Grisser), 11 le 20/4/91 à Faux (P. Durant) et 4 vus en vol à Cherval le 5/8/97 (F. Fély, F. Jouhandoudet, J.L. Hentz).

Courlis cendré (*Numenius arquata*)


Observé irrégulièrement en hiver, surtout lors des vagues de froid, parfois au printemps. Deux le 29/11/95 à l'Etang de Miallet (F. Fély.)

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

1 à St Capraise de Lalinde le 2/4/68 (P. Arnouil), 1 le 24/4/84 et 1 le 27/4/86 à St Laurent des Hommes (P. Grisser), 1 le 15/8/89 à Prigonrieux et 1 le 20/4/92 à Mauzac (J.C. Bonnet), 1 le 6/5/92 à La Chapelle Pomier et 1 le 20/4/94 à l'Etang de Miallet (F. Fély). De passage assez régulier à l'automne à l'Etang de Lescourrou.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

De passage régulier mais en faible nombre au printemps et à l'automne.



1. Mouette rieuse (*Larus ridibundus*),
Photo : P.Petit
2. Mouette pygmée (*Larus minutus*),
Photo : J.L. Hentz
3. Vol de Sterne caugek (*Sterna sand-
vicensis*), Photo : P. Petit

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)
De passage régulier au printemps et à l'automne.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)
Régulier aux 2 passages, hivernant rare.

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)
De passage régulier mais en faible nombre à l'automne à l'Étang de Lescourrou.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)
Régulier aux 2 passages migratoires, hivernant rare devenant assez courant.

Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*) (10 Obs.)
1 adulte le 13/12/50 et 1 adulte le 15/1/51 trouvés morts au barrage de Tuilières (P. Arnouil), 1 juvénile à Cause de Clérans le 14/10/52 (P. Arnouil), 1 adulte au barrage de Tuilières les 12 et 13/10/60 (P. Arnouil). Pas d'autre observation depuis une quarantaine d'années.

Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*) (10 Obs.)
1 immature à Daglan le 13/9/79 (F. Charmoy). Un oiseau trouvé épuisé à Vitrac le 11/11/91, soigné puis relâché le 5/1/92 (J.P. Ronteix).

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*) (1 Ob.)
1 juvénile tué à St Capraise de Lalinde le 19/8/64 (P. Arnouil).

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) (10 Obs.)
1 au barrage de Bergerac le 17/10/72 (P. Arnouil), 1 immature à Bergerac le 15/2/97 (J.L. Verrier).

Mouette pygmée (*Larus minutus*) (10 Obs.)
3 le 25/1/84 à St Laurent des Hommes (P. Grisser), 1 le 12/12/87 à Mauzac (J.C. Bonnet), 1 le 16/9/98 et 1 adulte le 10/11/2000 à l'Étang de Lescourrou (J.C. Bonnet).

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
Observable tous les mois de l'année, en particulier lors de tempêtes.

Goéland cendré (*Larus canus*) (10 Obs.)
1 adulte le 13/8/95 à Mauzac, 1 à l'Étang de Lescourrou le 9/1/98 et 1 le 28/12/99 à Périgueux sur les bords de l'Isle (J.C. Bonnet).

Goéland brun (*Larus fuscus*) (10 Obs.)
3 le 2/4/77 à St Laurent des Hommes, 1 le 1/2/80 sur le même site (P. Grisser), 1 à Beynac le 8/6/87 (P. Grisser), 1 adulte à St Mayme de Péreyrol le 11/10/88 (J.C. Bonnet), 1 adulte et 2 immatures le 11/10/97 à l'Étang de Lescourrou (J.C. Bonnet)

Goéland leucophée (*Larus cachinans*)
De passage assez régulier sur la Dordogne.

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) (10 Obs.)
1 à Mauzac le 14/2/90 (J.C. Bonnet). Une trouvée à Chancelade dans une cour de H.L.M., le 9/11/2000, après une tempête, relâchée à Liboume (J.P. Ronteix).

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) (10 Obs.)
1 au barrage de Bergerac le 31/5/73, 1 autre au même endroit le 12/5/74 (P. Arnouil), 5 le 13/8/78 au barrage de Mauzac (P. Arnouil) et 4 le 15/4/92, toujours à Mauzac (J.C. Bonnet).

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) (10 Obs.)

1 au barrage de Bergerac le 25/9/74 (P. Arnouil), 1 juvénile tué à Faux le 20/10/74 (P. Arnouil), 1 adulte le 17/9/94 au barrage de Bergerac (D. Cauchoix et J.C. Bonnet).

Sterne arctique (*Sterna paradisaea*) (10 Obs.)

1 premier hiver à St Laurent des Hommes du 18 au 22/11/84 (P. Grisser), 1 adulte les 17 et 18/9/94 à Mauzac (J.C. Bonnet).

Sterne naine (*Sterna albilrons*) (1 Ob.)

1 au barrage de Mauzac le 8/5/2000 (J.C. Bonnet et D. Cauchoix).

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) (10 Obs.)

2 à Varennes le 6/4/68 (P. Arnouil), 1 adulte à St Laurent des Hommes le 16/7/83 (P. Grisser), 1 à Prigonrieux le 14/4/88 (J.C. Bonnet), 1 le 24/4/95 à l'Etang de Mialet (F. Fély), 1 le 25/9/96 à l'Etang Grolhier (F. Fély), 1 à l'Etang de Lescourrou le 4/4/98 (J.C. Bonnet).

Guifette noire (*Chlidonias niger*)

Observée très régulièrement en mai sur l'Etang Grolhier (F. Fély).

Petit-duc scops (*Otus scops*) (10 Obs.)

1 chanteur le 4/4/82 à Cherval (P. Grisser), 1 trouvé blessé à Cours de Pile le 21/5/88 (S. Fagette), 1 chanteur le 4/5/89 à St Mayme de Péreyrol (J.C. Bonnet).

Hibou des marais (*Asio flammeus*) (10 Obs.)

1 au barrage de Bergerac le 13/12/52 (P. Arnouil), 1 à Liorac le 3/11/74 (P. Arnouil), 1 à St Laurent des Hommes le 19/10/77 (P. Grisser), 1 à Bayac le 27/4/85 (Mr Garcia) et 1 à St Médard de Mussidan le 6/3/89 (P. Grisser).

Guépier d'Europe (*Merops apiaster*)

En dehors des rares cas de nidification, quelques observations lors des passages de printemps et d'automne.

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) (1 Ob.)

2 oiseaux observés à Boisse, près d'Issigeac, le 6/6/98 (J.L. Hentz).

Pic cendré (*Picus canus*) (10 Obs.)

1 observé le 6/5/2000 à Servanches, en forêt de La Mole (F. Jouhandouet).

Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) (10 Obs.)

1 oiseau noté au vol (cris) à St Mayme de Péreyrol le 16/10/88 (P. Grisser).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Observée régulièrement aux 2 passages migratoires.

Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) (1 Ob.)

Plusieurs oiseaux tués vers Ribérac le 5/11/66 (journal Sud-Ouest).

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) (10 Obs.)

1 à St Capraise de Lalinde le 10/9/45, 1 à Varennes le 2/4/46 et 1 autre sur le même site le 17/4/71 (P. Arnouil). Une à St Laurent des Hommes le 15/3/79, 1 autre sur le même site le 28/3/89 (P. Grisser), 1 le 27/3/96 à l'Etang de Miallet (P. Grisser).

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

De passage régulier au printemps et à l'automne.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

De passage régulier au printemps et à l'automne.

Monticole bleu (*Monticola solitarius*) (1 Ob.)

1 mâle à La Roque Gageac le 21/12/98 (J.C. et C. Bonnet).

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

Observé très régulièrement lors de la migration de printemps à St Mayme de Péreyrol (J.C. Bonnet). Les observations d'automne sont beaucoup plus rares.

Locustelle luscinoïde (*Locustella luscinioides*) (1 Ob.)

1 chanteur observé le 25/4/84 à St Mayme de Péreyrol (J.C. Bonnet).

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) (1 Ob.)

2 chanteurs contactés entre le 16/5 et le 22/6/90 près de Daglan (G. Lecordier).

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) (1 Ob.)

1 mâle adulte chanteur le 18/4/84 à Ste Marie de Chignac (P.J. Dubois).

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Observé régulièrement aux 2 passages migratoires.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

De passage régulier et en grand nombre à l'automne, rare au printemps.

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) (10 Obs.)

1 femelle à Varennes le 12/10/86 (P. Arnouil), un mâle et une femelle à Mauzac le 31/10/91 (J.C. Bonnet).

Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) (1 Ob.)

6 individus à la gravière de la Moze, à St Médard de Mussidan, le 4/4/83 (P. Grisser).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) (10 Obs.)

1 du 15 août au 3 septembre 90 sur les landes de Monsec (F. Fély), 1 à St Mayme de Péreyrol le 19/9/92 (J.C. Bonnet).

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

Observations de printemps de plus en plus rares pour un oiseau peut-être disparu de notre département en tant que nicheur.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) mâle
Photo : L. Couzi



Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) (10 Obs.)
1 adulte tué à Ste Agne le 8/8/68 (P. Arnouil), 2 individus à Teyjat le 30/9/90 (D. Raymond).

Etourneau roselin (*Sturnus roseus*) (1 Ob.)
1 immature à Naussanne le 11/11/63 (P. Arnouil).

Sizerin flammé (*Carduelis flamma*) (1 Ob.)
1 juvénile le 18/2/52 à Liorac (P. Arnouil).

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
Une trentaine à St Mayme de Péreyrol le 28/3/82 (J.C. Bonnet). Nombreuses observations en 1990, d'août à novembre (F. Fély, P. Grisser, J.C. Bonnet). Depuis cette date, assez peu d'observations : 2 le 19/9/93 à St Martin Le Pin, 5 le 21/8/97 à Abjat sur Bandiat et 1 le 19/9/97 à St Martin Le Pin (F. Fély).

Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*) (1 Ob.)
1 mâle le 18/11/84 en compagnie d'alouettes des champs à St Mayme de Péreyrol (J.C. Bonnet).

Remarque :

A cette liste, il faut ajouter 3 espèces probablement échappées de captivité :

- le Flamant du Chili (*Phoenicopotus chilensis*) : 1 oiseau le 31/8/86 à Lalinde (S. Fagette)
- l'Oie à tête barrée (*Anser indicus*) : 1 à Bergerac le 5/5/96 (J.C. Bonnet).
- le Canard carolin (*Aix sponsa*) : 1 mâle fin 93 à Mauzac (J.C. Bonnet).

Conclusion:

Au total ce sont donc 256 espèces d'oiseaux appartenant aux catégories A, B, et C de la " Liste des Oiseaux du Paléarctique Occidental " qui ont été observées en Dordogne au cours du XX^e siècle. Parmi elles, un peu moins de la moitié (126) ont niché dans notre département, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle.

Le XXI^e siècle sera-t-il plus ou moins productif que son prédécesseur ? Seul l'avenir le dira. En tout état de cause, cela dépendra au moins de deux facteurs : l'intérêt que porteront les hommes à la protection de milieux souvent superbes mais tellement fragiles... et le temps que voudront bien consacrer les futurs ornithologues départementaux à l'observation et à l'étude de l'avifaune locale.

Remerciements:

Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont bien voulu me fournir leurs données et sans lesquels cette synthèse n'aurait pas pu être réalisée. J'adresse tout particulièrement ma gratitude à Pierre Arnouil, Frédéric Fély et Pascal Grisser qui m'ont communiqué des comptes-rendus très fouillés de leurs observations.

Bibliographie:

- Yeatman - Berthelot, D. (1991) *Atlas des Oiseaux de France en Hiver* - Société Ornithologique de France, Paris.282 pp.
- Dubois, P.J. et al (2000) *Inventaire des Oiseaux de France . Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan.397 pp.
- Bonnet, J.C. (1993) *Inventaire de l'Avifaune observée en Dordogne (1976-1992)*
- Bonnet, J.C.(2001) *Inventaire de l'avifaune observée en Dordogne au cours du XX^e siècle. Espèces nicheuses. Le Courbageot* 18, 17-23.