

faune-aquitaine.org



faune-aquitaine.org



Liste des oiseaux d'Aquitaine (arrêtée au 31 juillet 2012)

La liste des oiseaux d'Aquitaine (arrêtée au 31 juillet 2012)

Olivier Le Gall & le Comité d'Homologation Aquitain
c/o LPO, 433 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d'Ornon

En collaboration
avec le Comité d'Homologation Aquitain



La liste des oiseaux d'Aquitaine (arrêtée au 31 juillet 2012)

Mots clé : oiseaux, liste, Aquitaine

Auteur (s) : Olivier Le Gall & le Comité d'Homologation Aquitain
c/o LPO, 433 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d'Ormon

L'Aquitaine est une région vaste et diversifiée, dont les milieux naturels hébergent, à titre régulier ou occasionnel, de nombreuses espèces d'oiseaux nicheurs, migrateurs, hivernants ou qui cumulent plusieurs de ces statuts. Pour la première fois, la présente liste tente de faire le point sur ces statuts espèce par espèce et, lorsque c'est possible, sous-espèce par sous-espèce.

Au total, la liste des oiseaux d'Aquitaine arrêtée au 31 juillet 2012 comporte 416 espèces, dont 222 ont un statut de nicheur.

Il s'agit évidemment d'un travail préliminaire qui a vocation à être enrichi et mis à jour de manière régulière : cela devra être fait au moins annuellement, et sera facilité par les travaux du Comité d'Homologation Aquitain et l'outil collaboratif Faune-Aquitaine.org¹. Le fichier de référence est téléchargeable sur le site Faune-Aquitaine.org.

Etablissement de la liste

Le processus qui a permis d'établir la présente liste a été le suivant :

1. **Extraction** de Faune-Aquitaine.org (datée du 24 septembre 2011) de la liste des espèces mentionnées, assortie pour chaque département et pour la région entière du nombre de mentions et du statut de nidification maximal.
2. **Vérification** auprès des observateurs de la fiabilité des données « isolées », c'est-à-dire concernant des espèces très rarement mentionnées et n'ayant pas donné lieu à un processus d'homologation au moment de leur découverte. Plusieurs données non confirmées par leur auteur au terme du processus d'homologation n'ont pas été prises en compte dans la présente liste ; elles restent toutefois présentes pour mémoire dans

Faune-Aquitaine.org sous le statut « à valider ».

3. **Confrontation** à d'autres sources d'information, au premier rang desquelles la base de données du Comité d'Homologation National, consultable en ligne². De plus, la littérature ornithologique a été consultée et notamment les revues *Le Casseur d'Os*, *Le Courbageot*³ et *Faune-Aquitaine Publications*, et plus spécialement les synthèses de Bonnet (2001, 2002), Grangé (2002) et Hentz & Bourcié (2002), ainsi bien sûr l'atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine 1974-1984 (Boutet & Petit, 1987).

Les chroniques ornithologiques publiées par ces revues ainsi que, pendant quelques temps, par le *LPO Infos* régional, ont cependant été considérées avec la plus grande prudence : en règle générale seules les observations homologuées par le CHN ont été retenues. Il en a été de même des observations rapportées sur divers sites et forums Internet dépourvus de système de validation des données.

A l'inverse, quelques données mentionnées par le CHN sur la base de mentions bibliographiques non consolidées n'ont pas été prises en compte. C'est par exemple le cas du Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps* dont le CHN mentionne deux données bibliographiques régionales antérieures au processus d'homologation (début en 1981) et qui ne sauraient passer les critères actuels d'homologation (voir Fleury, 1975), ce qui devrait d'ailleurs conduire à leur suppression de la liste du CHN (P.J. Dubois & S. Reeber, communication personnelle) : ces deux données étant à notre connaissance les seules mentions pour la région, cette espèce ne

² http://www.chn-france.org/chn_donnees.php

³ http://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=1183&item=17

¹ <http://www.faune-aquitaine.org>

figure pas dans la liste des oiseaux d'Aquitaine.

Les données concernant des espèces non déjà signalées dans Faune-Aquitaine.org y ont été saisies en mode « donnée de seconde main », sauf quelques données signalées dans la bibliographie ancienne qui ne sont plus traçables à une échelle géographique compatible avec Faune-Aquitaine.org, où a minima l'échelle communale doit être connue.

4. **Consultation** de différents experts de l'avifaune régionale (et itérations avec le point précédent).
5. **Mise à jour éventuelle** avec de nouvelles données apparues et traitées par le CHA jusqu'au 31 juillet 2012.

Définition des statuts phénologiques des espèces

Les statuts des espèces ont été définis de la manière suivante, initialement avec l'aide des outils de recherche et de synthèse fournis par Faune-Aquitaine.org, et complétés grâce à la connaissance des ornithologues de la région :

- **Nicheuse (N)** : espèce pour laquelle des indications fiables de sa nidification dans la région existent (le plus souvent il s'agit d'un code European Bird Census Council, EBCC, « probable » ou « certain » dans Faune-Aquitaine.org) ; le statut de certaines espèces nicheuses est complété de la manière suivante :
 - **Nicheuse occasionnelle (NO)** : espèce qui a parfois niché dans la région, mais en effectifs faibles et de manière irrégulière ;
 - **Nicheuse éteinte (NE)** : espèce jadis régulièrement nicheuse, mais pour laquelle aucun indice de nidification n'a été rapporté récemment (dans l'attente de leur éventuelle redécouverte...);
- **Migratrice de passage (M)** : espèce observée en période de migration ; des pics phénologiques (nombre d'observations par décade) correspondant à une augmentation de la fréquence des observations pendant l'une ou l'autre des périodes migratoires (ou les deux) sont observés sur Faune-Aquitaine.org ; NB toutes les espèces hivernantes qui ne sont pas nicheuses sont par définition migratrices puisqu'il a bien fallu qu'elles arrivent dans la région, mais ne sont indiquées « M » que si les observations sont significativement plus nombreuses par décade en période migratoire qu'en hiver ;

- **Hivernante (H)** : espèce observée en hiver ; un pic phénologique correspondant à la période hivernale est observé sur Faune-Aquitaine.org.
- **Erratique (E)** : espèce dont le nombre d'observations est trop faible pour lui attribuer de manière fiable un statut phénologique propre.

Définition des classes de rareté des espèces

Dans Faune-Aquitaine.org, chaque espèce est associée à un statut de rareté prédéfini. Pour autant, associer un statut de rareté à une espèce est un exercice compliqué : le terme de « rareté », à défaut d'une définition précise, fait référence à une probabilité de rencontre de cette espèce sur le territoire. Cette probabilité dépend elle-même de plusieurs paramètres écologiques de cette espèce : sa phénologie (longueur de la période de présence sur le territoire régional au cours de l'année), sa répartition (fraction de l'espace régional où l'espèce est susceptible d'être rencontrée ; Godin 2002), sa densité au sein de son aire de répartition régionale et sa « détectabilité » sur le terrain (probabilité de la contacter si elle est présente ; pour une espèce donnée, ce paramètre est susceptible de changer au cours de la saison et même de la journée).

Pour représenter de manière synthétique l'ensemble de ces paramètres, nous avons calculé un « Indice de rareté » de chaque espèce pour la période prise en considération. Cet indice découle directement de la fréquence des observations, après une simple normalisation pour la période prise en compte :

$$I_{\text{espèce}}(\text{période}) = 1.000.000 \times \frac{Nb_{\text{espèce}}(\text{période})}{Nb_{\text{total}}(\text{période})}$$

Pour la période prise en considération, $I_{\text{espèce}}(\text{période})$ est l'indice de rareté de l'espèce, $Nb_{\text{espèce}}(\text{période})$ le nombre de mentions de l'espèce dans Faune-Aquitaine.org et $Nb_{\text{total}}(\text{période})$ le nombre total d'observations d'oiseaux dans le même corpus.

Cet indice fournit une représentation très grossière, mais il a l'avantage sur d'autres qui ont été essayés d'être à la fois le plus simple et celui qui a fourni la classification la plus fidèle à l'image que chaque expert de terrain se fait de la rareté de chaque espèce.

La période considérée pour établir la présente liste est « avant le 24 septembre 2011 » (date de l'extraction qui a servi à faire le calcul).

Les classes de rareté proposées sont les suivantes :

- **Très rare (TR)** : $I_{\text{espèce}} < 50$

- **Rare (R)** : $50 < I_{\text{espèce}} < 250$
- **Peu commun ou localisé (PCL)** : $250 < I_{\text{espèce}} < 4000$
- **Commun (C)** : $4000 < I_{\text{espèce}} < 10000$
- **Très commun (TC)** : $10000 < I_{\text{espèce}}$

Les espèces dont l'Indice de rareté était proche des limites entre classes ont éventuellement été réattribuées à une classe voisine « à dire d'expert » pour tenir compte de la phénologie, de la répartition et de la détectabilité de chacune. C'est également le cas de certaines espèces très rares qui avaient attiré les observateurs et donc fait l'objet de mentions redondantes dans Faune-Aquitaine.org, faussant l'Indice de rareté.

Il faut noter que, pour l'établissement de cette première liste, nous avons considéré les classes de rareté globalement, sans nous attacher à affiner le classement de chaque espèce pour chacun de ses statuts phénologiques (ex. « nicheur rare, hivernant commun »), ni pour chacun des départements (ex. « rare en Dordogne, commun en Gironde »). De même, les indices de rareté n'ont pas été systématiquement attribués aux sous-espèces.

Définition de la catégorie « CAF régionale »

La Commission de l'Avifaune Française (CAF⁴) tient à jour la liste des oiseaux de France et définit le statut de présence de chaque espèce selon cinq catégories⁵ (CAF, 2007) :

A – Espèces présentes : observées au moins une fois depuis 1950, et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu ;

B – Espèces jadis présentes : comme A, mais qui n'a plus été revue depuis 1950 ;

C – Espèces acclimatées : introduites ou échappées de captivité dans le Paléarctique occidental depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine ;

D – Espèces d'origine douteuse : les individus observés ont pu être aidés volontairement par l'Homme ou bien il s'agit d'échappés de captivité ;

E – Espèces échappées : les individus observés sont supposés d'origine captive.

Dans la plupart des cas, la catégorie régionale indiquée dans la liste est la même que la catégorie

nationale. Les exceptions sont les suivantes pour les espèces des catégories A, B et C :

- Cygne noir *Cygnus atratus* : catégorie C et non E, car l'espèce niche depuis plusieurs décennies en milieu naturel dans la région, et y a probablement fait souche ;
- Oulette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca* et Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : catégorie C et non BC, car aucune information n'est disponible à notre connaissance sur la présence ancienne de ces deux espèces par voie naturelle dans la région ;
- Vautour fauve *Gyps fulvus* et Vautour moine *Aegypius monachus* : catégorie A et non AC car ces espèces sont présentes à l'état naturel dans la région, indépendamment des programmes de réintroduction menés ailleurs ;
- Faucon gerfaut *Falco rusticolus*, Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptes paradoxus*, Grive dorée *Zoothera dauma* et Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* : catégorie B et non A, car ils n'ont pas été revus dans la région depuis 1950
- Pigeon biset *Columba livia* : catégorie BC et non A, car à notre connaissance il n'y a plus de population sauvage de cette espèce dans la région depuis longtemps, et il y a par ailleurs une forte présence de populations acclimatées ;
- Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii*, Perruche à collier *Psittacula krameri* et Inséparable de Fischer *Agapornis fischeri* : catégorie D et non C, car ces espèces ne semblent pas avoir fait souche dans la région, même si des cas de nidification ont été observés pour la dernière de ces espèces.

Les espèces des catégories D et E, qui n'exploitent pas les biotopes régionaux dans leur cycle reproductif naturel (catégories A et B) ou acquis (catégorie C), ne sont pas prises en compte dans la liste ci-dessous sauf, pour faciliter la veille les concernant, quelques espèces de catégorie D dont la nidification a déjà été observée en milieu naturel dans la région (indiquées « Dn » dans la liste).

Au total, la liste des oiseaux d'Aquitaine comporte 416 espèces : 396 en catégorie A, 6 en catégorie B, 16 en catégorie C et 4 en catégorie Dn (le total est supérieur à 412 du fait des espèces relevant de deux catégories). Sur ces 416 espèces, 222 ont un statut de nicheur, dont 8 de nicheur éteint.

⁴ <http://www2.mnhn.fr/crbpo/spip.php?rubrique106>

⁵ <http://www2.mnhn.fr/crbpo/spip.php?rubrique111>

Et maintenant...

Cette liste constituera un référentiel utile, mais elle doit vivre et évoluer pour suivre l'évolution des statuts des espèces bien sûr, mais aussi celle de la connaissance qu'on en a. Elle a donc vocation à être remise à jour régulièrement, sans doute annuellement au moins dans un premier temps, à l'image de la liste des espèces proposée par la CAF pour le territoire national.

Sa publication même permettra de la confronter à l'expertise de la communauté naturaliste régionale, qui ne manquera pas de réagir en proposant la révision de tel ou tel statut en fonction d'éléments qui nous auraient échappé ici. Elle permettra aussi des prospections ciblées pour confirmer ou compléter les statuts indiqués. Notamment, la communauté naturaliste pourra s'attacher à préciser le statut régional des différentes sous-espèces d'une espèce donnée. Sur la base de cette liste, l'analyse pourra en outre se voir déclinée sur des territoires particuliers de la région : un département, une zone biogéographique, etc.

Pour que chacun puisse l'utiliser à sa guise et ainsi mieux contribuer à l'enrichir, la liste est téléchargeable sur le site Faune-Aquitaine.org, sous une forme plus complète incluant les espèces des catégories D et E, et l'ensemble des sous-espèces de l'avifaune française pour les espèces présentes en Aquitaine. Les versions successives le seront également, et seront différenciées par des noms de fichier contenant la date à laquelle la liste est arrêtée (« LOAK_31Jul12 » pour la présente liste).



Bécasseau échasse : F. Jouandoudet.
Guêpier d'Europe : L. Couzi
Rouge-gorge familier : J. Martinez
Aigle botté : A. Naves



Remerciements

Nous remercions tous ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires et suggestions, et notamment dans la région Jean-Claude Bonnet, Stéphane Duchateau, Frédéric Dupuy et Laurent Joubert ainsi que le comité de pilotage de l'atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine, et pour la Commission de l'Avifaune Française Philippe J. Dubois, Frédéric Jiguet et Pierre Le Maréchal.

Littérature

- Bonnet, J.C. (2001). Inventaire de l'avifaune observée en Dordogne au cours du XXème siècle: espèces nicheuses. *Le Courbageot* **18**, 17-23.
- Bonnet, J.C. (2002). Inventaire de l'avifaune observée en Dordogne au cours du XXème siècle: seconde partie, les hivernants. *Le Courbageot* **19**, 2-10.
- Boutet, J.Y., & Petit, P. (1987). Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine 1974-1984. Centre Régional Ornithologique Aquitaine-Pyrénées, Bordeaux. 241pp.
- CAF (2007). En direct de la CAF ; Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* **14**, 234-246.
- Fleury, A. (1975). Inventaire des oiseaux rares observés en Aquitaine. *Le Courbageot* **2**, 10.
- Godin, J. (2002). Degré de rareté, évolution de la distribution et particularités de l'herpétofaune de la Région Nord - Pas-de-Calais. *Bulletin de la Société Herpétologique de France* **104**, 16-35.
- Grangé, J.L. (2002). Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'Os* **2**, 84-132.
- Hentz, J. L. & Bourcié, C. (2002). Le lac de la Prade (33): synthèse ornithologique 1983-1998. *Le Courbageot* **20**, 1-22.

Liste des oiseaux d'Aquitaine (au 31 juillet 2012)

- La première colonne donne l'espèce ou la sous-espèce considérée, lorsque la distinction a été faite dans la région. Lorsque plusieurs sous-espèces sont données dans la liste des oiseaux de France (CAF, 2007), leur nombre est indiqué même si la distinction de ces sous-espèces n'a pas été faite en Aquitaine, afin de susciter cette prospection auprès de la communauté naturaliste régionale.
- « Cat. » indique la catégorie régionale de chaque taxon (A : présent ; B : jadis présent ; C : acclimaté ; D : origine douteuse ; E : échappé).
- N, M, H et E indiquent les statuts phénologiques du taxon (N : nicheur ; NO : nicheur occasionnel ; NE : nicheur éteint ; M : pic migratoire ; H : pic hivernal ; E : erratique).
- RaT indique le statut de rareté du taxon (TC : très commun ; C : commun ; PCL : peu commun ou localisé ; R : rare ; TR : très rare).
- CHA et CHN indiquent que le taxon est soumis à homologation régionale (CHA) ou nationale (CHN).

NB Lorsqu'une seule sous-espèce est présente dans la liste, ses statuts phénologique et de rareté sont donnés à la ligne de l'espèce correspondante.

Ordre: Anseriformes**Famille: Anatidae**

Cygne tuberculé <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	AC	N		H		C		
Cygne noir <i>Cygnus atratus</i> Latham, 1790	C	N		H		PCL		
Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus</i> Ord, 1815	A			H		R	CHA	
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R	CHA	
Oie des moissons <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) (incl. 2 ssp)	A			H		TR		
Oie à bec court <i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1833	A			H		TR		CHN
Oie rieuse <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769) (incl. 2 ssp)	A			H		R		
Oie cendrée <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	AC	N		H		PCL		
– Oie cendrée "type" <i>Anser anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	AC							
Oie des neiges <i>Anser caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	BD							CHN
Bernache du Canada <i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	C	N		H		PCL		
Bernache nonnette <i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	AD			H		R		
Bernache cravant <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A			H		PCL		
– Bernache à ventre sombre <i>Branta bernicla bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
– Bernache à ventre pâle <i>Branta bernicla hrota</i> (O.F. Müller, 1776)	A			H		TR		
– Bernache du Pacifique <i>Branta bernicla nigricans</i> (Lawrence, 1846)	A			H		TR	CHA	
Bernache à cou roux <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	A			H		TR		CHN
Ouette d'Egypte <i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	C	NO		H		R		
Tadorne casarca <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	C	NO		H		R		
Tadorne de Belon <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Canard de Barbarie <i>Cairina moschata</i> Linnaeus, 1758	Dn	NO						
Canard carolin <i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Dn	NO						
Canard mandarin <i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	C	NO		H		R		
Canard siffleur <i>Anas penelope</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Canard à front blanc <i>Anas americana</i> (Gmelin, 1789)	A		M			TR		CHN
Canard chipeau <i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Sarcelle à ailes vertes <i>Anas carolinensis</i> (Gmelin, 1789)	A				E	TR		CHN
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	AC	N		H		TC		
Canard pilet <i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Sarcelle d'été <i>Anas querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Sarcelle à ailes bleues <i>Anas discors</i> (Linnaeus, 1766)	A				E	TR		CHN
Canard souchet <i>Anas clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Nette rousse <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	A	NO				R		
Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	A				E	TR	CHA	
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	A			H		R		
Fuligule morillon <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	A			H		R		
Fuligule à tête noire <i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	A			H		TR		CHN
Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	A	NE		H		R		
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		TR	CHA	
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	A		M	H		PCL		
Macreuse à bec jaune <i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832)	A				E	TR		CHN
Macreuse à front blanc <i>Melanitta perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		CHN
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Harle piette <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Harle huppé <i>Mergus serrator</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Harle bièvre <i>Mergus merganser</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Erismature rousse <i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	C				E	TR		
Erismature à tête blanche <i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	A				E	TR		CHN

Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
AC	N		H		C		
C	N		H		PCL		
A			H		R	CHA	
A			H		R	CHA	
A			H		TR		
A			H		TR		CHN
A			H		R		
AC	N		H		PCL		
AC							
BD							CHN
C	N		H		PCL		
AD			H		R		
A			H		PCL		
A			H		PCL		
A			H		TR		
A			H		TR	CHA	
A			H		TR		CHN
C	NO		H		R		
C	NO		H		R		
A	N		H		PCL		
Dn	NO						
Dn	NO						
C	NO		H		R		
A			H		PCL		
A		M			TR		CHN
A	N		H		PCL		
A	N		H		C		
A				E	TR		CHN
AC	N		H		TC		
A	N		H		PCL		
A	N	M			PCL		
A				E	TR		CHN
A	N		H		PCL		
A	NO				R		
A	N		H		PCL		
A				E	TR	CHA	
A			H		R		
A			H		PCL		
A			H		R		
A			H		TR		CHN
A	NE		H		R		
A			H		TR	CHA	
A		M	H		PCL		
A				E	TR		CHN
A				E	TR		CHN
A			H		R		
A			H		R		
A			H		PCL		
A			H		R		
C				E	TR		
A				E	TR		CHN

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Ordre: Galliformes								
Famille: Phasianidae								
Lagopède alpin <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) (incl. 2 ssp)	A	N		H		TR		
– Lagopède alpin des Pyrénées <i>Lagopus muta pyrenaica</i> (Hartert, 1921)	A							
Grand Tétrás <i>Tetrao urogallus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		TR		
– Grand Tétrás aquitain <i>Tetrao urogallus aquitanicus</i> (Ingram, 1915)	A							
Colin de Virginie <i>Callipepla virginianus</i> (Linnaeus, 1758)	C	NE				TR		
Perdrix rouge <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	AC	N		H		PCL		
Perdrix grise <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	AC	N		H		R		
– Perdrix grise "type" <i>Perdix perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	C	N		H				
– Perdrix grise des Pyrénées <i>Perdix perdix hispaniensis</i> (Reichenow, 1892)	A	N		H				
Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Faisan de Colchide <i>Phasianus colchicus</i> (Linnaeus, 1758)	C	N		H		C		
Ordre: Ciconiiformes								
Famille: Gaviidae								
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	A			H		PCL		
Plongeon arctique <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	A			H		PCL		
Famille: Podicipitidae								
Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	A	N		H		PCL		
Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) (incl. 2 ssp)	A			H		R		
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Grèbe à cou noir <i>Podiceps nigricollis</i> (C.L. Brehm, 1831)	A			H		PCL		
Famille: Procellariidae								
Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	A			H		R		
Puffin cendré <i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769) (incl. 2 ssp)	A	NE	M			R		
Puffin majeur <i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	A		M			TR	CHA	
Puffin fuligineux <i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789)	A		M			R	CHA	
Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	A		M			R	CHA	
Puffin des Baléares <i>Puffinus mauretanicus</i> (Lowe, 1921)	A		M			PCL		
Puffin de Macaronésie <i>Puffinus baroli</i> (Bonaparte, 1857)	A				E	TR		CHN
Famille: Hydrobatidae								
Océanite de Wilson <i>Oceanites oceanicus</i> (Kühl, 1820)	A				E	TR		CHN
Océanite tempête <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	NE		H		R		
Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1817)	A			H		R		
Famille: Sulidae								
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	A		M	H		PCL		
Famille: Phalacrocoracidae								
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		C		
– Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Blumenbach, 1798)	A							
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761) (incl. 2 ssp)	A	N		H		R		
– Cormoran huppé "type" <i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	A							
Famille: Pelecanidae								
Pélican blanc <i>Pelecanus onocrotalus</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		CHN
Famille: Ardeidae								
Butor étoilé <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	A	N				R		
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	A	NO	M			R		
Héron garde-bœufs <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Aigrette des récifs <i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792) (incl. 2 ssp)	A				E	TR		CHN
Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	A	N		H		TC		
Grande Aigrette <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Héron cendré <i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
Héron pourpré <i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766)	A	N				PCL		
Famille: Ciconiidae								
Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			PCL		
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		C		
Famille: Threskiornithidae								
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	A		M			R		

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	C					PCL		
Spatule blanche <i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		PCL		
Famille: Phoenicopteridae								
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i> (Pallas, 1811)	A				E	TR		
Ordre: Falconiformes								
Famille: Accipitridae								
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Elanion blanc <i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	A	N		H		PCL		
Milan noir <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	A	N	M			TC		
Milan royal <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		TR		
Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Vautour percnoptère <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				PCL		
Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	A	N		H		PCL		
Vautour moine <i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	A				E	TR	CHA	
Circaète Jean-le-blanc <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	A	N	M			PCL		
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	A	N		H		PCL		
Busard pâle <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	A		M			TR		CHN
Busard cendré <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Buse variable <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
– Buse variable "type" <i>Buteo buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
– Buse des steppes <i>Buteo buteo vulpinus</i> (Gloger, 1833)	A				E	TR		CHN
Buse féroce <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	A				E	TR		CHN
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	A				E	TR		CHN
Aigle criard <i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	A			H		TR		CHN
Aigle pomarin <i>Aquila pomarina</i> (C.L. Brehm, 1831)	A				E	TR		CHN
Aigle botté <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	A	N				PCL		
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Aigle de Bonelli <i>Hieraetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822)	A		M			TR	CHA	
Aigle ibérique <i>Aquila adalberti</i> (C.L. Brehm, 1861)	A				E	TR		CHN
Famille: Pandionidae								
Balbusard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			PCL		
Famille: Falconidae								
Faucon crécerellette <i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818)	A				E	TR	CHA	
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	A		M			R	CHA	
Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				C		
Faucon d'Éléonore <i>Falco eleonora</i> (Géné, 1839)	A		M			TR	CHA	
Faucon sacre <i>Falco cherrug</i> (Gray, 1834)	A				E	TR		CHN
Faucon gerfaut <i>Falco rusticolus</i> (Linnaeus, 1758)	B				E	TR		CHN
Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	A	N		H		PCL		
– Faucon pèlerin "type" <i>Falco peregrinus peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	A	N		H				
– Faucon pèlerin "brookei" <i>Falco peregrinus brookei</i> (Sharpe, 1873)	A				E			
– Faucon pèlerin "calidus" <i>Falco peregrinus calidus</i> (Latham, 1790)	A				E			
Ordre: Gruiformes								
Famille: Rallidae								
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	A	N	M			R		
Marouette poussin <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	A				E	TR	CHA	
Marouette de Baillon <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	A				E	TR		CHN
Râle des genêts <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	A	NE	M			TR		
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Foulque macroule <i>Fulica atra</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Famille: Gruidae								
Grue cendrée <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	A		M	H		C		
Grue du Canada <i>Grus canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		CHN
Famille: Otididae								
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	A	NE				R		
Outarde barbue <i>Otis tarda</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		CHN

Ordre: Charadriiformes**Famille: Haematopodidae**Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A N H PCL**Famille: Recurvirostridae**Echasse blanche *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) A N M PCLAvocette élégante *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758) A N H PCL**Famille: Burhinidae**Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758) A N H PCL**Famille: Glareolidae**Glaréole à collier *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) A M TR CHA**Famille: Charadriidae**Petit Gravelot *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 A N M PCLGrand Gravelot *Charadrius hiaticula* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A M H PCLGravelot kildir *Charadrius vociferus* (Linnaeus, 1758) A A E TR CHNGravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (Linnaeus, 1758) A N H PCLPluvier guignard *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758) A M TR CHAPluvier bronzé *Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776) A E TR CHNPluvier doré *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) A H PCLPluvier argenté *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) A H CVanneau sociable *Chettusia gregaria* (Pallas, 1771) A E TR CHNVanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) A N H C**Famille: Scolopaciidae**Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A M H PCLBécasseau sanderling *Calidris alba* (Pallas, 1764) A M H PCLBécasseau semipalmé *Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766) A E TR CHNBécasseau minute *Calidris minuta* (Leisler, 1812) A M H PCLBécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) A M RBécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) A E TR CHNBécasseau de Baird *Calidris bairdii* (Coues, 1861) A E TR CHNBécasseau tacheté *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) A M TR CHABécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821) A E TR CHNBécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) A M PCLBécasseau à échasses *Micropalama himantopus* (Bonaparte, 1826) A E TR CHNBécasseau violet *Calidris maritima* (Brünnich, 1764) A M H PCLBécasseau variable *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp) A M H CBécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) A M TR CHNBécasseau rousset *Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819) A M TR CHNCombattant varié *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) A M PCLBécassine sourde *Lymnocyrtus minimus* (Brünnich, 1764) A H RBécassine des marais *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A N H CBécassine double *Gallinago media* (Latham, 1787) A E TR CHNBécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) A M TR CHNBécasse des bois *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758) A N H PCLBécasse d'Amérique *Scolopax minor* J.F. Gmelin, 1789 A E TR CHNBarge à queue noire *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A M H CBarge rousse *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) A M PCLCourlis corlieu *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) A M PCLCourlis cendré *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A N H PCLChevalier arlequin *Tringa erythropus* (Pallas, 1764) A M H PCLChevalier gambette *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp) A N M H CChevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) A M R CHAChevalier aboyeur *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) A M H PCLChevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* (Gmelin, 1789) A M TR CHNChevalier culblanc *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758) A M H PCLChevalier sylvain *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758) A M PCLChevalier bargette *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) A M TR CHNChevalier guignette *Actites hypoleucos* (Linnaeus, 1758) A N M H CChevalier grivelé *Actites macularia* (Linnaeus, 1766) A E TR CHNTournepierrre à collier *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) A M H PCLPhalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819) A E TR CHNPhalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) A M H R CHAPhalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) A M H PCL**Famille: Stercorariidae**Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) A M PCL

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			PCL		
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	A		M			TR	CHA	
Grand Labbe <i>Catharacta skua</i> Brünnich, 1764	A		M	H		PCL		
Famille: Laridae								
Mouette blanche <i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774)	A				E	TR		CHN
Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	A		M			R		
Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Goéland railleur <i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)	A		M			TR	CHA	
Mouette de Bonaparte <i>Chroicocephalus philadelphia</i> (Ord, 1815)	A				E	TR		CHN
Mouette rieuse <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	A	N		H		TC		
Mouette pygmée <i>Hydrochelidon minutus</i> (Pallas, 1776)	A			H		PCL		
Mouette de Ross <i>Rhodostethia rosea</i> (MacGillivray, 1824)	A				E	TR		CHN
Mouette atricille <i>Larus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		CHN
Mouette de Franklin <i>Larus pipixcan</i> Wagler, 1831	A				E	TR		CHN
Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	A			H		PCL		
Goéland d'Audouin <i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	A		M			TR	CHA	
Goéland cendré <i>Larus canus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A			H		PCL		
Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	A			H		R	CHA	
Goéland brun <i>Larus fuscus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		C		
– Goéland de la Baltique <i>Larus fuscus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	A			H				
– Goéland brun "graellsii" <i>Larus fuscus graellsii</i> Brehm, 1857	A	N		H				
– Goéland brun intermédiaire <i>Larus fuscus intermedius</i> Schiöler, 1922	A			H				
Goéland argenté <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 (incl. 2 ssp)	A	N				PCL		
Goéland d'Amérique <i>Larus smithsonianus</i> Coues, 1862	A				E	TR		
Goéland leucopée <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	A	N		H		C		
Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	A			H		R	CHA	
Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides</i> Meyer, 1822 (incl. 2 ssp)	A			H		R		CHN
– Goéland à ailes blanches "type" <i>Larus glaucooides glaucooides</i> Meyer, 1822	A			H				
– Goéland de Kumlien <i>Larus glaucooides kumlieni</i> Brewster, 1883	A				E			
Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	A			H		R	CHA	
Goéland marin <i>Larus marinus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Sterne fuligineuse <i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	A				E	TR		CHN
Sterne bridée <i>Onychoprion anaethetus</i> (Scopoli, 1786)	A				E	TR		CHN
Sterne naine <i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	A	NO	M			PCL		
Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	A		M			TR		
Sterne caspienne <i>Sterna caspia</i> (Pallas, 1770)	A		M			R		
Guifette moustac <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	A		M			R		
Guifette noire <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			PCL		
Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	A		M			TR	CHA	
Sterne caugek <i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	A	N		H		PCL		
Sterne élégante <i>Sterna elegans</i> Gambel, 1849	A	N				TR		CHN
Sterne royale <i>Sterna maxima</i> Boddaert, 1783	A				E	TR		CHN
Sterne voyageuse <i>Sterna bengalensis</i> Lesson, 1831	A	N				TR		CHN
Sterne pierregarin <i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	A		M			R		
Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	A		M			TR	CHA	
Famille: Alcidae								
Guillemot de Troil <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) (incl. 2 ssp)	A			H		PCL		
Pingouin torda <i>Alca torda</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Mergule nain <i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		TR	CHA	
Macareux moine <i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		TR		
Famille: Pteroclididae								
Syrnhapte paradoxal <i>Syrnhaptus paradoxus</i> (Pallas, 1773)	B				E	TR		CHN
Ordre: Columbiformes								
Famille: Columbidae								
Pigeon biset <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	BC	N		H		TC		
Pigeon colombin <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		PCL		
Pigeon ramier <i>Columba palumbus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		TC		
Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	A	N	M	H		TC		
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			C		
Tourterelle orientale <i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)	A				E	TR		CHN
– Tourterelle orientale "meena" <i>Streptopelia orientalis meena</i> (Sykes, 1832)	A							
Famille: Psittacidae								
Inséparable rosegorge <i>Agapornis roseicollis</i> Vieillot, 1818	Dn	NO						
Famille: Cacatuidae								

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Calopsitte élégante <i>Nymphicus hollandicus</i> Kerr, 1792	Dn	NO						
Ordre: Cuculiformes								
Famille: Cuculidae								
Coucou geai <i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			TR		
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				C		
Ordre: Strigiformes								
Famille: Tytonidae								
Effraie des clochers <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) (incl. 3 ssp)	A	N		H		PCL		
Famille: Strigidae								
Petit-duc scops <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				R		
Grand-duc d'Europe <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		R		
Chevêche d'Athéna <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Chouette hulotte <i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		C		
Hibou moyen-duc <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Hibou des marais <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	A	NE	M	H		R		
Chouette de Tengmalm <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TR		
Famille: Caprimulgidae								
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N				PCL		
Ordre: Apodiformes								
Famille: Apodidae								
Martinet noir <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				TC		
Martinet pâle <i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	A	N				R	CHA	
Martinet à ventre blanc <i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				R		
Ordre: Coraciiformes								
Famille: Alcedinidae								
Martin-pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		C		
Famille: Meropidae								
Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Famille: Coraciidae								
Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	A				E	TR		
Ordre: Upupiformes								
Famille: Upupidae								
Huppe fasciée <i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				C		
Ordre: Picimorphes								
Famille: Picidae								
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N				PCL		
Pic cendré <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	A				E	TR	CHA	
Pic vert <i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		TC		
– Pic vert "type" <i>Picus viridis viridis</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
– Pic de Sharpe <i>Picus viridis sharpei</i> (Saunders, 1872)	A	N		H		PCL		
Pic noir <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		C		
Pic mar <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Pic à dos blanc <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803) (incl. 2 ssp)	A	N		H		R		
– Pic de Lilford <i>Dendrocopos leucotos lilfordi</i> (Sharpe & Dresser, 1871)	A							
Pic épeichette <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Ordre: Passeriformes								
Famille: Alaudidae								
Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	A		M			TR	CHA	
Cochevis huppé <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		PCL		
Alouette lulu <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M	H		PCL		
Alouette des champs <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M	H		C		
Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		TR	CHA	

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Famille: Hirundinidae								
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			C		
Hirondelle de rochers <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	A	N		H		PCL		
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			TC		
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			C		
Hirondelle rousseline <i>Hirundo daurica</i> (Linnaeus, 1771)	A	NO	M			R		
Famille: Motacillidae								
Pipit de Richard <i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	A		M	H		R		
Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			C		
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	A	NO	M	H		C		
Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	A		M			TR	CHA	
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798) (incl. 2 ssp)	A			H		PCL		
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 6 ssp)	A	N	M			PCL		
– Bergeronnette printanière "type" <i>Motacilla flava flava</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
– Bergeronnette nordique <i>Motacilla flava thunbergi</i> Billberg, 1828	A		M			R		
– Bergeronnette d'Italie <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> Savi, 1831	A		M			TR		
– Bergeronnette flavéole <i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834)	A		M			PCL		
– Bergeronnette ibérique <i>Motacilla flava iberiae</i> Hartert, 1921	A	N	M			PCL		
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	A	N	M	H		PCL		
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N	M	H		TC		
– Bergeronnette grise "type" <i>Motacilla alba alba</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M	H		TC		
– Bergeronnette de Yarrell <i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	A			H		PCL		
Famille: Cinclidae								
Cinacle plongeur <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Famille: Troglodytidae								
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		TC		
Famille: Prunellidae								
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		C		
Accenteur alpin <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	A	N		H		PCL		
Famille: Saxicolidae								
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		TC		
Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i> C.L. Brehm, 1831	A	N				C		
Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N				PCL		
– Gorgebleue à miroir blanc <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Meisner, 1804)	A		M					
– Gorgebleue de Nantes <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934	A	N						
Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. Gmelin, 1774)	A	N		H		TC		
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	A	NO	M			PCL		
Tarier pâle <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) (incl. 3 ssp)	A	N		H		C		
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
– Traquet motteux "type" <i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M					
– Traquet du Groenland <i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i> (Gmelin, 1789)	A		M					
Traquet oreillard <i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A				E	TR	CHA	
Traquet du désert <i>Oenanthe deserti</i> (Temminck, 1825)	A				E	TR		CHN
Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	A	N				R		
Monticole bleu <i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				TR		
Famille: Turdidae								
Grive dorée <i>Zoothera dauma</i> (Latham, 1790)	B				E	TR		CHN
Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
– Merle à plastron nordique <i>Turdus torquatus torquatus</i> (Linnaeus, 1758)	A		M			PCL		
– Merle à plastron alpestre <i>Turdus torquatus alpestris</i> (C.L. Brehm, 1831)	A	N				TR		
Merle noir <i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		TC		
Grive litorne <i>Turdus pilaris</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		PCL		
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i> C.L. Brehm, 1831 (incl. 2 ssp)	A	N	M	H		TC		
Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 (incl. 2 ssp)	A		M	H		PCL		
Grive draine <i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M	H		PCL		
Famille: Sylviidae								
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	A	N		H		C		
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Locustelle de Pallas <i>Locustella certhiola</i> (Pallas, 1811)	A				E	TR		CHN
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	A	N				PCL		
Locustelle fluviatile <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	A				E	TR		CHN
Locustelle lusciniôide <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	A	N				R		

	Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	A		M			R		
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N	M			PCL		
Rousserolle isabelle <i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)	A				E	TR		CHN
Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	A				E	TR	CHA	
Rousserolle effarvatte <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				R		
Hypolaïs bottée <i>Hippolais caligata</i> (Lichtenstein, 1823)	A				E	TR		CHN
Hypolaïs icterine <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	A				E	TR	CHA	
Hypolaïs polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	A	N				C		
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N	M	H		TC		
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	A	N	M			PCL		
Fauvette épervière <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	A				E	TR		CHN
Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A		M			TR	CHA	
Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	A	N				TR	CHA	
Fauvette grisette <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	A	N	M			PCL		
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Fauvette passerinette <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) (incl. 3 ssp)	A	N				TR		
Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	A	N				R		
Pouillot verdâtre <i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	A		M			TR		CHN
Pouillot de Pallas <i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas, 1811)	A		M			TR		CHN
Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	A		M			TR	CHA	
Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	A	N	M			PCL		
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	A	N	M			R		
Pouillot ibérique <i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	A	N				R		
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) (incl. 3 ssp)	A	N	M	H		TC		
– Pouillot véloce "type" <i>Phylloscopus collybita collybita</i> (Vieillot, 1817)	A	N	M	H		TC		
– Pouillot véloce "abietinus" <i>Phylloscopus collybita abietinus</i> (Nilsson, 1819)	A			H				
– Pouillot véloce "tristis" <i>Phylloscopus collybita tristis</i> Blyth, 1843	A			H			CHA	
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A		M			PCL		
Famille: Regulidae								
Roitelet huppé <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N		H		PCL		
Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	A	N	M	H		C		
Famille: Muscipidae								
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)	A				E	TR	CHA	
Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	A		M			TR	CHA	
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) (incl. 2 ssp)	A	N	M			PCL		
Famille: Timaliidae								
Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	A	NE			E	TR		
Léiothrix jaune <i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	C	N		H		PCL		
Famille: Aegithalidae								
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 5 ssp)	A	N		H		TC		
– Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus europaeus</i> (Hermann, 1804)	A							
Famille: Paridae								
Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		TC		
Mésange charbonnière <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		TC		
Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Mésange noire <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Mésange nonnette <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		PCL		
Famille: Sittidae								
Sittelle torchepot <i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 2 ssp)	A	N		H		TC		
Famille: Tichodromadidae								
Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	A	N		H		R		
Famille: Certhiidae								
Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris</i> (Linnaeus, 1758) (incl. 3 ssp)	A	N		H		PCL		
Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 (incl. 2 ssp)	A	N		H		TC		
Famille: Remizidae								
Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	A			H		R		
Famille: Oriolidae								
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				PCL		
Famille: Laniidae								
Pie-grièche isabelle <i>Lanius isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833 (incl. 2 ssp)	A				E	TR		CHN
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	A	N				PCL		

		Cat.	N	M	H	E	RarT	CHA	CHN
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A			H		R		
Pie-grièche méridionale <i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	(incl. 2 ssp)	A	NE		H		R		
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A	N				PCL		
Famille: Corvidae									
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 3 ssp)	A	N		H		TC		
Pie bavarde <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A	N		H		TC		
Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A				E	TR	CHA	
Chocard à bec jaune <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)		A	N		H		PCL		
Crave à bec rouge <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		PCL		
Choucas des tours <i>Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 3 ssp)	A	N		H		PCL		
Corbeau freux <i>Corvus frugilegus</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		R		
Corneille noire <i>Corvus corone</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		TC		
Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A				E	TR	CHA	
Grand Corbeau <i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		PCL		
Famille: Sturnidae									
Étourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		TC		
Étourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820		A	NO			E	TR	CHA	
Étourneau roselin <i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)		A				E	TR		CHN
Famille: Passeridae									
Moineau domestique <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 3 ssp)	A	N		H		TC		
Moineau friquet <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		PCL		
Moineau soulcie <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)		A	N		H		R		
Niverolle alpine <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)		A	N		H		R		
Famille: Fringillidae									
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 3 ssp)	A	N	M	H		TC		
Pinson du Nord <i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758)		A			H		PCL		
Serin cini <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)		A	N		H		TC		
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)		A	N		H		R		
Verdier d'Europe <i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 4 ssp)	A	N		H		TC		
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 4 ssp)	A	N		H		TC		
Tarin des aulnes <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)		A	NO		H		C		
Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A	N	M	H		C		
Sizerin flammé <i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 3 ssp)	A			H		TR	CHA	
Bec-croisé bifascié <i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789		A				E	TR		CHN
Bec-croisé des sapins <i>Loxia curvirostra</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 4 ssp)	A	N		H		PCL		
– Bouvreuil trompettant <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)		A				E	TR		
– Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i> Vieillot, 1816		A	N		H		PCL		
Grosbec casse-noyaux <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		PCL		
Famille: Emberizidae									
Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A		M			TR	CHA	
Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A		M	H		R		
Bruant à calotte blanche <i>Emberiza leucocephalos</i> S.G. Gmelin, 1771		B				E	TR		CHN
Bruant jaune <i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758)		A	N		H		PCL		
Bruant zizi <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766		A	N		H		PCL		
Bruant fou <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766		A	N		H		PCL		
Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i> (Linnaeus, 1758)		A	N	M			R		
Bruant rustique <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776		A				E	TR		CHN
Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776		A				E	TR		CHN
Bruant des roseaux <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	(incl. 2 ssp)	A	N		H		PCL		
Bruant mélanocéphale <i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769		A				E	TR		CHN
Bruant proyer <i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)		A	N	M			PCL		