



Les observations remarquables de rhopalocères de 2011 à 2017 en Auvergne

Plan

- Les découvertes (nouvelles stations) et redécouvertes.**
- Les migrateurs / colonisateurs exceptionnels / erratiques exceptionnels.**
- Les espèces en expansions.**
- Les futures découvertes ou redécouvertes probables dans l'Allier.**
- Les sources consultées.**

Remarques

1. Les noms des espèces de papillons employés dans ce document (scientifiques et vernaculaires) sont ceux de la liste Fauna-Europaea de 2017. Ils sont suivis du nom du descripteur ainsi que du statut (entre crochets) de présence en vigueur en 2017 en Auvergne (TR = Très rare ; R = Rare ; PF = Peu fréquent).
2. Toutes les photos présentées dans ce document correspondent aux données mentionnées et représentées en vert sur les cartes correspondantes.
3. Toutes les données représentées sur les cartes en noir et en vert sont issues de faune-auvergne.org. Les données représentées en blanc sont issues soit de faune-auvergne.org soit d'autres sources mentionnées à la fin de ce document.
4. Afin de ne pas surcharger ce document et de ne pas dépasser les 25 minutes de présentation, seules les espèces les plus rares en Auvergne ayant fait l'objet d'observation(s) remarquable(s) sont présentées. Cette liste n'est donc pas exhaustive.
5. La mention "Historique" utilisée dans ce document ne fait pas allusion seulement aux données historiques (c'est à dire qui ont plus de 50 ans) mais aux connaissances antérieures des observations de l'espèce correspondante.

Les découvertes (nouvelles stations) et redécouvertes


La Mélitée des Linaires - *Melitaea deione* (Geyer, 1832) [TR]

● Le 31 juillet 2016 à Retournac (43) par Didier Perrocheau.

○ **Historique** : Pour la Haute-Loire : Connue dans l'Ouest du département (Margeride) par Bruno Gilard depuis 2005. Dans le reste du département, l'espèce n'a été mentionnée qu'une seule fois en 2012 (à 25km plus à l'Est), sur la maille E079N646.

● Le 10 juin 2017 à Beaulieu (63) par Damien Pages (confirmation photos et analyse des genitalia par Romain Riols).

○ **Historique** : Pour le Puy-de-Dôme : Une donnée de 1951 à Ardes et une donnée de 2005 à Achat (les deux stations se situent à une dizaine de km à l'ouest de Beaulieu).



● Données Faune-Auvergne



Photo : Damien Pagès

L'Hespérie de l'Épiaire - *Carcharodus lavatherae* (Esper, 1783) [TR]


● Deux stations découvertes au centre et au sud de la Haute-Loire par Didier Perrocheau.

- Le 22 juin 2014 à Saint-Martin-de-Fugères et au Brignon.
- Le 19 juin 2016 à Polignac (centre 43).

○ **Historique** : En Haute-Loire : Première mention de l'espèce par P. Bachelard à Saint-Arcons-d'Allier en 1991 (revue en 1999) et une donnée de Bruno Gilard à Saint-Ilpize en 2010.

● Deuxième mention départementale le 01 juin 2017 à Rentières (63) par François Legendre.

○ **Historique** : Il existe une mention de C. Oberthur datant de 1910 à Lamontgie (une vingtaine de km à l'est) d'un individu de sa collection privée soit 107 ans plus tôt.



● Données Faune-Auvergne




Photo : François Legendre

Le Semi-Apollon - *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) [R]

- Le 28 mai 2015 à Chaliers (15) par Pascal Peyrache. Cette espèce est connue pour être localisée dans les clairières, le long des lisières ensoleillées de hêtraie et dans les prairies herbeuses où pousse son unique plante hôte, la corydale solide. Néanmoins, les années d'abondance de population, certains individus peuvent montrer un comportement de dispersion. C'est généralement le cas de femelles. Hors cette observation concerne un mâle en parfait état dans un milieu typique de l'espèce avec présence de la plante hôte. Ceci peut laisser supposer de la découverte d'une nouvelle station qu'il faudra confirmer par d'autres observations.

○ **Historique** : Jamais recensé en Margeride. Les stations les plus proches sont à plus de 30 km en Aubrac.



● Données Faune-Auvergne




Photo : Pascal Peyrache

L'Azuré Osiris - *Cupido osiris* (Meigen, 1829) [TR]

- Découverte en Haute-Loire d'un tout nouveau secteur par Didier Perrocheau (4 stations sur 3 communes) au centre du département à 50 km de la station connue le plus proche.
 - Le 27 mai 2016 Saint-Germain-Laprade.
 - Le 12 juin 2016 à Rosières.
 - Le 17 juin 2016 à Polignac.

○ **Historique** : En Haute-Loire, cette espèce n'était connue du département, avant 2016, seulement que de l'extrême Nord-Ouest, notamment sur la station de la butte calcaire de Montlaizon découverte le 22 juin 2008 par Bruno Gilard (première mention départementale).



● Données Faune-Auvergne




Photo : Didier Perrocheau

La Thècle des Nerpruns - *Satyrrium spini* (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

- Découverte de trois stations au centre de la Haute-Loire par Didier Perrocheau.
 - Saint-Germain-Laprade le 29 juillet 2016.
 - Saint-Martin-de-Fugères le 25 juin 2017 (sur deux stations différentes).

○ **Historique** : En Auvergne : une seule observation connue dans le Puy-de-Dôme à Vichel le 13 juillet 1994 (non revue depuis malgré de nombreuses recherches) et deux données de Haute-Loire en août 2010 à Prades et Saint-Julien-des-Chazes.



○ Données historique




Photo : Didier Perrocheau

L'Azuré de Chapman - *Polyommatus thersites* Cantener, 1834 [TR]

- Dix stations découvertes en 2013, 2014 et 2016 au centre de la Haute-Loire par Didier Perrocheau sur cinq communes (Polignac, Rosières, Saint-Germain-Laprade, coubon et Chadron).

○ **Historique** : En Haute-Loire : Première mention départementale le 7 juillet 2010 à Saint-Julien-des-Chazes par Antoine Longieras.



● Données Faune-Auvergne




Photo : Didier Perrocheau

Le Mercure - *Arethusana arethus* (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

● Découverte de deux stations en Haute-Loire :

- Le 19 août 2016 à Polignac par Paul Bonfils.
- Le 28 août 2016 à Saint-Haon par Sébastien Heinerich, Marine Kreder, Damien Pagès et Thibault Brugerolle.

○ Historique :

- Puy-de-Dôme : Une donnée en 1911 sur la maille E074N652 par J. Lafaury.
- Cantal : Une donnée en 1995 à Saint-Santin-de-Maurs par Daniel Tourlan.
- Allier : Une donnée en 2009 à Valigny par Aurélie Soissons.





Photo : Marine Kreder

L'Azuré de la Croisette - *Maculinea alcon rebeli* (Denis & Schiffermuller, 1775) [TR]

● Découverte de quatre nouvelles stations (total de douze stations connues actuellement)

- Le 4 juillet 2016 à Saint-Flour par Quentin Le Bayon.
- En 2017, trois stations à Andelat et Talizat par Pascal Peyrache. (Dont une station où la plante a été découverte par Romain Riols).

○ Historique : Dans le Cantal : Huit stations connues auparavant du PNA Maculinea Auvergne.



● Données Faune-Auvergne

● Données du PNA



Photo : Pascal Peyrache

Les migrants, colonisateurs et erratiques exceptionnels

L'Aurore de Provence - *Antocharis euphenoides* Staudinger, 1869 [TR]

- Première mention régionale le 26 mars 2011 à Cerzat (43) par Henri Maleysson.




Photo : Henri Maleysson

Le Pacha à deux queues - *Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767) [TR]

- Première mention départementale et deuxième mention régionale le 7 septembre 2016 à Anglards-de-Saint-Flour (15) par Maxime Paran.
- **Historique** : La toute première mention régionale date de 2004 en Haute-Loire par C. Bouyon.




Photo : Maxime Paran

L'Azuré de Lang - *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767) [TR]

- Deuxième mention régionale le 20 septembre 2014 à Saint-Diéry (63) par Anne et Pierre Rigaud. (espèce revue sur la même station le 16/08/15)
- Première mention départementale le 2 août 2015 à Lavastrie (15) par Pascal Peyrache.
- Première mention départementale le 7 août 2016 à Vieille-Brioude (43) par Didier Perrocheau.
- **Historique** : La toute première mention régionale date du 8 novembre 1977 à Saint-Germain-Lembron (63) par F. Fournier.





Photo : Anne & Pierre Rigaud


La Piéride de l'Ibérie - *Pieris manni* Mayer, 1851 [TR]

- 88 données dans le puy-de-Dôme en 2016 et 2017 (36 stations sur 22 communes essentiellement dans le centre du 63), 64 de Thibault Brugerolle.
- Première mention départementale le 28/07/2016 à Blesle (43) par Pascal Peyrache.

○ **Historique** : Une seule donnée connue en 2004 et 4 stations connues en 2014 (Mirefleurs, Veyre-Monton, Clermont-Ferrand et Cournon).



Connaissance de la répartition actuelle




Connaissance de la répartition en 2014

Le Miroir - *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) [PF]


- Le 15 juillet 2016 à Chadron (43) et le 10 juillet 2016 à Goudet (43) par Didier Perrocheau. Cette dernière donnée constitue la donnée la plus à l'Est (12km de plus en 2016) connue à ce jour au niveau National ! (E 3°55' 15.341").

○ **Historique** :

- Première mention régionale dans l'Allier (A. Deshommais) en 1977.
- Première mention départementale :
 - Cantal : En juillet 2000 à Lanobre (?). Le 21 juillet 2000 au Falgoux par Thierry Leroy.
 - Puy-de-Dôme : Le 23 juillet 2005 à Chambon-sur-Lac par Stéphan Oleszczynski.
 - Haute-Loire : Depuis 2008 par Bruno Gilard.




Connaissance de la répartition actuelle



Connaissance de la répartition en 2010

Les futures découvertes ou redécouvertes probables dans l'Allier



Sources

1. Faune-auvergne.org
2. Lepinet.fr
3. Inventaire National du Patrimoine Naturel - inpn.mnhn.fr
4. Archives publiées de la revue Arvernensis sur le site shnao.eu.
5. "Papillons du Puy-de-Dôme" (éd. Revoir)
6. "Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles" de Tristan Lafranchis
7. "La vie des papillons" de Tristan Lafranchis
8. fauneflore-massifcentral.fr
9. Plan National d'Action maculinea – maculinea.pnaopie.fr
10. CEN Auvergne (Aurélie Soissons)