



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Milan noir
Pierre-Cabard



Août 2019

Chronique ornithologique

Mois sans incident climatique notable, très sec, avec seulement quelques orages. Près de **30 000** données ont été reçues, pour **198** espèces sauvages, dont **37** ne nichent pas.

La migration est déjà sensible : rapaces (Milan noir, Bondrée), limicoles (**869** données contre **438** en juillet), passereaux (Martinet noir et nombreux migrateurs nocturnes).

Quelques espèces rares sont à signaler :

Crabier chevelu, Élanion blanc, Gypaète barbu, Marouette poussin, Chevalier stagnatile, Tournepietre, Coucougeai, Rollier, Locustelle luscinoïde.



Locustelle-luscinoïde
Didier Perrocheau

Tadorne de Belon :

10 oiseaux le 11 août à l'Écopole (63) (G. Le Coz). L'espèce est rare de mai à octobre.

Nette rousse : 8 données,

Une en Haute-Loire et environ 25 oiseaux dans le Puy-de-Dôme. C'est faible !

Grèbe à cou noir :

4 oiseaux en Haute-Loire. C'est peu, mais ce n'est que le début du passage.

Crabier chevelu :

Un le 10 août dans l'Allier (D. Marchal). L'espèce est rare en Auvergne. C'est la 9^{ème} donnée cumulée pour ce mois.

Héron pourpré : 44 données,

Oiseaux très dispersés sur la région. C'est le pic du passage.

Élanion blanc :

Un le 8 août dans l'Allier. (H. Samain, J.J. Limoges).

Milan noir : 342 données.

Beaucoup de mouvements, comme à l'habitude. Un des premiers migrateurs diurnes.

Vautour fauve : 197 données.

Il n'y a jamais eu autant de données pour un mois ! Il n'y avait eu que 37 données en août 2018. 7,5 oiseaux par groupe. Mézenc et sud-ouest de l'Auvergne.



Vautour fauve
Mathis Vérité

Vautour moine : 3 données.

3 oiseaux. C'est très peu. Ils n'ont donc pas suivi les Vautours fauves !

Gypaète barbu : 3 données.

2 visites : Lausa le 25 août dans le Sancy et Europe le 31 août dans le Cantal, oiseaux lâchés en mai dans les Causses. C'est encourageant.

Aigle royal : 10 données,

Belle série. 14 oiseaux au total. Cantal et Puy-de-Dôme.

Balbusard : 63 données.

Le couple auvergnat termine l'éducation de son jeune. Départ de la femelle vers le 15 août. Mais déjà de nombreux migrants.

Faucon émerillon :

Une femelle, précoce, le 31 août dans la Haute-Loire (D. Perrocheau), 3^{ème} donnée pour ce mois.



Faucon émerillon
Didier Perrocheau

Marouette ponctuée :

Un oiseau du 6 au 24 août à l'Écopôle-63. C'est tout. L'espèce est en fait très peu notée en août : 21 oiseaux en 45 ans. Oiseaux en dispersion avant de migrer, très difficiles à repérer.

Marouette poussin :

Un oiseau du 8 au 18 août à Borne (43). 4^{ème} individu noté en Auvergne. C'est dire la rareté de cette espèce à son passage en région.

Huitrier pie :

Un oiseau en migration la nuit (cri caractéristique) à Veyre-Monton (63) le 15 août (Th. Brugerolle). Cette espèce passe, en tout petit nombre, en mars-avril et août-septembre.

Grand gravelot : 6 données,

Noté sur 2 sites, en Allier et en Haute-Loire. C'est une espèce occasionnelle en août.

Pluvier guignard :

Un dans le Forez le 27 août (J.C. Corbel) et 10 dans le Cantal (M. Thibaut) le 30 août. Le pic de passage de cette espèce très rare (et difficile à repérer) est fin août-début septembre.

Bécasseau minute :

Un oiseau le 10 août à Borne (43) (M. Lacroix). C'est le début du passage, mais l'espèce est occasionnelle en août.

Bécasseau de Temminck :

Un le 11 août dans le Cantal. Le passage est en août-septembre. Espèce rare. Il y a 124 données dans Faune-Auvergne.

Bécasseau variable :

Un le 19 août à Compains (63) (M. Sacré). C'est très peu, mais il n'y a que 5 données par an en août pour les 10 dernières années.

Bécasseau cocorli : 5 données,

5 oiseaux. C'est une belle série pour une espèce occasionnelle. Passe surtout en septembre.

Combattant varié : 4 données,

Pour 20 oiseaux. C'est très peu. Il y avait eu 24 données en 2016.

Barge à queue noire :

Un oiseau passe de nuit (cris) à Veyre-Monton (Th. Brugerolle) le 3, et un autre le 14 août.

Pas notée à cette époque depuis 2010. Passe surtout en mars-avril.

Courlis corlieu :

Encore un oiseau noté la nuit le 1 août à Veyre-Monton (Th. Bugerolle). Passe normalement au printemps. 8^{ème} donnée en août.

Chevalier sylvain : 76 données,

Très belle série de données. (83 en 2015). Sur 10 sites. Surtout dans le sud de l'Auvergne. Espèce assez commune aux passages.

**Chevalier gambette : 2 données,**

4 oiseaux pour 2 sites. Il y a 4 données par an en août, mais l'espèce passe surtout au printemps.

Chevalier stagnatile :

Un oiseau le 3 août à Talizat (15) (S Reyt). Espèce très rare en Auvergne car elle migre par l'Europe de l'est (voir fiche espèce via le « i »). Il n'y a que 15 données au total dans Faune-Auvergne.

Tourneperrière à collier :

Un le 30 août à Borne (43) (Ch. Tomati). C'est une espèce de passage occasionnelle, très rare : 41 données dans Faune-Auvergne, dont 11 en août.

Sterne naine : 4 données,

3 oiseaux. C'est tout ! Cette espèce nous quitte en effet très tôt.

Guifette moustac : 2 données,

Une fin août à la Godivelle (63). Espèce très rare en août-septembre. Passe plutôt au printemps.

Guifette noire : 8 données,

Pour 7 oiseaux dispersés, et 20 ensemble le 31 août à Aydat (B. Gilbert), mais c'est un record pour ce mois ! Le passage d'automne est en effet peu important.

Coucou gris : 7 données,

Petite série de données (29 en 2017). Cette espèce part tôt aussi, en juillet.

Coucou-geai :

Un le 30 août aux Vastres (43) (Ch. Chaize). Il y a maintenant 11 données dans Faune-Auvergne. L'espèce est donc très rare. On peut consulter sa fiche avec le « i ».

Petit duc scops : 4 données,

3 oiseaux dans le Puy-de-Dôme et un en Haute-Loire. L'espèce est rarement notée en août.

Martinet noir : 125 données,

Oiseaux de passage pour la plupart. Les derniers seront vus en septembre.

Rollier : 2 données

Un dans le Puy-de-Dôme et 2 en Haute-Loire. C'est très peu après l'afflux de 2014 à 2017. L'espèce n'est visible qu'en été et il y a maintenant 199 données dans Faune-Auvergne.

Pipit rousseline : 5 données,

Pour 9 oiseaux sur 5 sites. Espèce migratrice avec 4,6 données en moyenne en août. On est donc dans la moyenne.

Gorge bleue à miroir : 31 données,

Sur 9 sites dans le sud de l'Auvergne. C'est un record. Il y a en effet 9 données en moyenne par mois d'août.

Monticole de roche : 28 données,

C'est une belle série de données. Les derniers seront vus fin septembre.

Merle à plastron : 6 données,

Très rare à cette époque. Il y a en effet en moyenne 4 données par an en août.

Cisticole des joncs :

Une le 1 août à Cussac (15) (B. Richoux). On est loin du record de 2016 (41 données). On revient donc à la « normale ».

Locustelle tachetée : 7 données,

Pour 7 oiseaux. Ce n'est pas mal. En moyenne en effet il y a 4 données en août.

Locustelle luscinoïde :

Une à la mi-août à Borne (43) (D. Perrocheau, R. Riols). Migrateur très rare : seulement 11 données dans Faune-Auvergne.

Phragmite des joncs : 37 données,

Belle série de données. 8 sites. C'est le pic du passage.

Fauvette babillarde :

Un oiseau de passage le 25 août dans le Puy-de-Dôme (Th. Brugerolle). Très rare à cette époque : 11 données dans Faune-Auvergne en août.

Gobe-mouche noir : 598 données,

Pour 1577oiseaux. Record absolu pour ce mois !

Pie-grièche écorcheur : 667 données,

Record absolu pour ce mois aussi. Les arrivées en mai ont été tardives. Il est probable que ces départs tardifs en sont la conséquence.

Pie-grièche grise : 116 données,

C'est peu, mais comme les années précédentes. Il y avait eu 257 données en 2015. Probablement moins de recherche.

Pie-grièche à tête rousse : 13 données,

C'est faible, mais c'est le mois des départs. Le record de ce mois est de 34 données. Un seul oiseau noté dans le Cantal.

Cassenoix moucheté : 12 données,

Tous les oiseaux vers le Mézenc. C'est une série moyenne. Le record pour ce mois est de 31 données en 2017.

Moineau Soulcie : 6 données,

C'est peu. Le record est de 13 données en 2012. Mais l'espèce est très localisée. A souligner tout de même 4 oiseaux le 1^{er} août en Haute-Loire (Ch. Tomati) où l'espèce est rare.

Venturon montagnard : 4 données,

Pour une dizaine d'oiseaux sur les Estables (43). C'est faible. Il y a, en moyenne, 10 données pour ce mois.

Bruant ortolan : 8 données,

C'est un record, car il y a, en moyenne, 2 données pour ce mois. Au total 38 oiseaux notés, surtout lors de leur migration nocturne, fin août (Th. Brugerolle).

J.P. Dulphy - 7 septembre 2019

