
ISSN 0154 - 2109







## Notes et Notules







## Une nouvelle observation de Gélinotte des bois Bonasa bonasia (Tetraonidae) en Auvergne

Bruno Corbara, Martine Court

L'observation ayant motivé la présente note a eu lieu de façon totalement fortuite au cours d'une promenade mycologique (d'où absence de jumelles ou d'appareil photo), effectuée le 27 Août 2012 dans le Bois de Mallevieille (orthographié Malleveille sur la carte IGN ; communes de La Chaulme et Saint-Clément de Valorgue, Puy-de-Dôme), par temps totalement découvert.

Le "contact" a eu lieu vers 17h15 de la façon suivante. L'un de nous (BC) est passé à 50cm de l'oiseau sans l'apercevoir. La deuxième d'entre nous (MC), qui marchait environ quatre mètres en arrière, voit l'oiseau immobile au sol et s'arrête à moins d'un mètre de ce dernier. Le premier d'entre nous, interpellé à haute voix, mettra près de 5 secondes à distinguer l'oiseau cryptique, immobile au niveau du sol puis, revenant sur ses pas, s'en approchera à environ 1,50m. À courte distance, nous avons donc pu l'observer attentivement pendant près de 15 secondes. L'oiseau, un gallinacé de la taille d'une perdrix, se redressera alors lentement et s'éloignera sur ses pattes pour se réfugier dans un taillis. Le contact aura duré au total près de 20 secondes, ce qui nous aura permis de bien mémoriser les caractéristiques de l'oiseau - en particulier une tache rouge au dessus de l'œil et d'abondantes taches ventrales brunes et rouille - et de l'identifier d'un commun accord, après consultation le jour même d'un guide de terrain (*Le Guide Ornitho* de Delachaux & Niestlé), comme une Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* de sexe mâle (présence d'une caroncule rouge).

Le point précis du contact, situé à 1250 mètres d'altitude (coordonnées ~ N 45°29'18"/E 3°57'2"; carte IGN Saint-Anthème 2733E), correspond à un chemin qui, à un demi kilomètre de là, via un chemin plus large (inclus dans un circuit VTT) rejoint la D67 (qui correspond alors sur une brève distance au parcours du GR3). À cet endroit précis, le chemin a tendance à se refermer et des branches obligent le promeneur à se baisser. Le Bois de Mallevieille (point culminant 1287 m), classé en totalité ZNIEFF de type 1 (Id SPN 83P 000548) est inclus dans le périmètre du PNR du Livradois-Forez. Il s'intègre à un massif forestier plus vaste avec en particulier au SSE le Bois du Roi (une forêt "historique" dont le bornage par pierres à fleur de lys est bien connu dans la région; p.c. 1278 m) et, plus au Sud encore, le bois de La Chaulme (p.c. 1153 m).

Le site de contact présente les caractéristiques requises par l'espèce telles que rappelées par GUELIN (2010). Il s'agit d'une forêt à sapins pectinés dominants avec hêtres et sorbiers et sous-bois de myrtilles. La diversité des classes d'âges de la strate arborée, le degré de fermeture de la végétation localement important, le grand nombre de troncs morts au sol ou encore debout, et la richesse de leur couverture en bryophytes témoignent d'un degré de naturalité relativement élevé. Pour ce qui est de la tranquillité du site, si le circuit VTT semble assez peu fréquenté, il l'est néanmoins régulièrement par quelques motos de cross.

L'observation n'a pu être confirmée par deux explorations ultérieures effectuées par l'un d'entre nous le 29 Août (1h30 de recherche en spirale au départ du site de contact) et le 29 Septembre (2h00). Un suivi en période de production de chant s'impose donc dans les mois à venir.

Au cours des dernières décennies, à l'exception de deux individus vus en vol dans les Combrailles en 1991 (AMBLARD, 1992), les observations de Gélinotte des bois dans le Massif Central concernent avant tout le Massif du Forez et les Bois Noirs (BRUGIERE, 1988, PIECHAUD, 1988, GUELIN, 2010). Notre observation confirme donc la présence de la Gélinotte des bois en Auvergne, cette région correspondant depuis la disparition de l'espèce dans les Pyrénées (elle y est néanmoins en cours de réintroduction), à sa limite occidentale de répartition en Eurasie.

NDLR : Toutes les données anciennes connues sont dans l'article de GUELIN (2010). Aucune n'avait été signalée depuis 2002.

## Bibliographie

**AMBLARD, 1992.** L'observation de deux Gélinottes des bois dans les Combrailles: rencontre fortuite ou survie discrète ? *Le Grand Duc*, 40, p.26.

GUELIN F., 2010. La Gélinotte des bois. In Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne, LPO Auvergne, p. 51-52.

**BRUGIERE D., 1988**. Évolution de l'avifaune reproductrice des départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute Loire, du Cantal et de la Lozère au cours des quinze dernières années. Mise au point sur cette avifaune. *Le Grand Duc*, 33: 40-66.

**PIECHAUD E., 1988.** Une observation de Gélinotte des bois (*Bonasa bonasia*) dans le Massif des Bois Noirs (Saint-Priest-la-Prugne - Loire). *Le Grand Duc*, 32: 47-49.