




ISSN 0154 - 2109



Nouvelle reproduction certaine de la Bécassine des marais *Gallinago gallinago* en Auvergne.

Thierry Leroy



Bécassine des marais (R. Riols)

LE GRAND-DUC N°82 (ANNEE 2014)

Manuscrit reçu le 12 janvier 2014

✉ Thierry LEROY, thierry.leroy047@orange.fr



Introduction

La découverte d'un nid garni de la bécassine des marais en mai 2012 dans le marais de Lascols est l'occasion de faire le point des observations de reproduction certaine citées dans la littérature ornithologique auvergnate. Ces observations apparaissent très rares. D'ailleurs, les effectifs nicheurs de ce limicole sont faibles en Auvergne et en France.

L'observation

Dans la matinée du 11 mai 2012, un chanteur de bécassine des marais se fait entendre régulièrement en bordure sud-est de la narse de Lascols, commune de Cussac, Cantal. Depuis la route départementale menant au hameau de Lascols, il est aisé de l'entendre. Après quelques dizaines de mètres en direction du centre de la narse, une bécassine s'envole sous nos pieds. Spontanément, et parce que nous avons connu deux cas similaires, en 1991 et en 1994, nous recherchons des indices de présence dans les touffes de végétation. Dans la seconde qui suit, nous trouvons un nid garni qui contient 4 œufs (figure 1). Après une observation attentive mais courte et la prise de quelques photographies, nous quittons rapidement ces lieux.

Les œufs sont disposés en croix (GEROUDET, 1983), la pointe vers l'intérieur du nid, sauf un, probablement déplacé lors de l'envol précipité de l'adulte (seule la femelle couve d'après TROLLIET & IBANEZ, 1994 et GEROUDET, 1983). Ces œufs prennent place dans un nid assez sommaire en forme de coupe, tapissé d'herbes sèches, probablement des feuilles de *Carex vesicaria*. Ce nid est bien caché, au sec, en bordure d'une touffe de canche cespiteuse *Deschampsia cespitosa*. La végétation aux alentours immédiats consiste en des prairies humides composées de *Carex vesicaria* et de *Deschampsia cespitosa* (figure 2).



© LPO Auvergne - T.Leroy

Figure 1 : le nid garni trouvé le 11 mai 2012 dans la narse de Lascols (Cantal)



© LPO Auvergne - T Leroy

Figure 2 : la prairie humide qui accueille le nid de bécassine des marais, situé dans les touffes de molinie cespitueuse du premier plan

Les autres observations de reproduction certaine en Auvergne

Avant cette observation de 2012, seuls 6 cas de reproduction certaine sont cités dans la littérature ornithologique auvergnate (faune-auvergne.org ; BERNARD, 2010 ; BLANCHON *et al.*, 1995 ; FRENOUX, 2005) :

- Le 5 juin 1988, « un adulte sur un nid contenant 4 œufs à Lascols ». Cette observation est mentionnée telle quelle dans faune-auvergne.org et par FRENOUX (2005), mais elle n'a pas été retrouvée dans les annales publiées de la LPO Auvergne. Elle reste donc peu circonstanciée et l'auteur n'est pas cité.
- Le 16 mai 1991, suite à l'envol d'un adulte dans les pieds de l'observateur (Thierry Leroy), un nid contenant 4 œufs est découvert à Lascols, dans une cariçaie humide. Les œufs sont disposés en croix avec la pointe vers le centre du nid. Ce nid garni est revu le 20 mai. Le 31 mai, des coquilles d'œufs éclos sont présentes sur les bords du nid et un adulte s'envole non loin. Le 9 juin, le nid est vide et les coquilles ont disparu, mais un adulte s'envole dans sa proximité.
- Le 12 mai 1994, « un nid garni contenant 3 œufs à Cussac » (Thierry Leroy).
- Le 19 avril 1998, « un individu sur un nid vide à Lascols » (Joël Bec).
- Le 19 juin 2001, 2 jeunes oiseaux s'envolent de façon hésitante et par sauts au passage de l'observateur (Thierry Leroy) sur le lac de l'Esclauze (Egliseneuve-d'Entraigues, 63) ;
- Le 20 juin 2005, des juvéniles non ou à peine volants ont été observés dans la narse de Lascols et un individu a été bagué (source ONCFS).

Discussion

Ces 7 données de reproduction certaine constituent les seules observations documentées et référencées dans la littérature ornithologique auvergnate et sur le site faune-auvergne.org (ce dernier bénéficie aussi d'un processus d'homologation des données).

Les données auvergnates de reproduction certaine de la bécassine des marais sont donc très rares. Pourtant l'espèce est citée nicheuse dès les années 1970 dans les départements du Puy-de-Dôme (MOUILLARD & CHOUSSY, 1971) et du Cantal (COINTRE *et al.*, 1972). Ces affirmations de reproduction ne sont pas renseignées : pas de référence à des observations précises et circonstanciées.

Sur ces 7 cas de reproduction certaine, 6 se déroulent dans la narse de Lascols. Ce site est considéré « depuis longtemps comme le plus régulier et le plus important pour la reproduction de l'espèce en Auvergne » (BERNARD, 2010). Des indices probables de reproduction y sont évoqués depuis le printemps 1980 : des chants entendus à plusieurs reprises par Jean-Paul Salasse (ROCHE & ROCHE, 1981). Il s'agit de la deuxième mention historique auvergnate de reproduction probable, qui intervient juste après celle obtenue en 1978 dans le marais de Limagne, commune de Siaugues-Sainte-Marie en Haute-Loire (BRUGIERE, 1981). La narse de Lascols accueille donc une petite population reproductrice, estimée entre 1 et 5 couples (*obs. pers.*) depuis plus de 30 ans. Le second site de reproduction certaine est le lac de L'Esclauze, dans le Puy-de-Dôme. Les premiers indices de reproduction probable y datent de 1995 : 2 individus chevrotent dans la soirée du 26 mai (*obs. pers.* non publiée) et observation de Monsieur Malterre (LALLEMANT *et al.*, 1996). Une petite population, estimée entre 1 et 3 couples, s'y reproduit toujours (*obs. pers.*). Il s'agit donc, dans les 2 cas, de sites de reproduction occupés d'assez longue date.

Ces 2 localités se situent dans un contexte de moyenne montagne aux alentours des 1000 m d'altitude. Elles se caractérisent par une surface importante en zone humide favorable à la bécassine : 45 ha pour Lascols et 30 ha pour l'Esclauze (BERNARD, 2010). Ces milieux humides sont diversifiés, riches, et peu perturbés. Ils possèdent une grande naturalité, ainsi qu'une grande tranquillité au printemps (lorsque la chasse est fermée). Ils sont surtout entourés de prairies naturelles pâturées ou fauchées, relativement extensives.

La population de Bécassine des marais auvergnate est estimée entre 10 et 20 couples (TOURRET, 1995 ; BOITIER, 2000 ; FRENOUX, 2005 ; BERNARD, 2010). Parmi les régions hébergeant des populations supérieures à 10 individus, seule l'Auvergne maintient ses effectifs avec 8-18 couples en 2010, répartis sur 5 sites du Cantal et 4 du Puy-de-Dôme (MICHELAT *in* DE SEYNES et LES COORDINATEURS-ESPECE, 2011). La population française est jugée en déclin, puisque la dernière estimation propose une fourchette entre 56 et 93 couples, en indiquant que pour la première fois la population nicheuse française tombe en dessous de la barre des 100 couples (MICHELAT *in* DE SEYNES et LES COORDINATEURS-ESPECE, 2011). Effectivement, les effectifs étaient auparavant évalués entre 100 et 300 couples selon les auteurs (100 à 150 pour DUBOIS *et al.*, 2008 ; 200 pour GRISSER & ROCAMORA, 1999 ; entre 200 et 300 couples pour TROLLIET & IBANEZ, 1994 ; entre 100 et 185 pour DUBOIS & MAHEO, 1986). Cette espèce est donc inscrite « en danger » dans les listes rouges auvergnate et française (LPO AUVERGNE, 2000 ; UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2011). La population européenne, estimée entre 1,8 et 11 millions de couples, est aussi considérée en déclin (GRISSER & ROCAMORA, 1999).

Ces 7 cas de reproduction permettent d'esquisser un calendrier de reproduction :

- construction probable du nid en avril (observation d'un individu fréquentant un nid vide le 19 avril 1998) ;
- couvaison en mai et début juin (observations de nid garni d'œufs les 11 mai 2012, 12 mai 1994, 16 et 20 mai 1991 et 5 juin 1988). Ces données s'intègrent entre le 3 mai et 28 juin, dates extrêmes de ponte trouvées en France (DUBOIS & MAHEO, 1986) ;
- éclosion vers fin mai / début juin (un cas d'éclosion entre le 20 et 31 mai 1991) ;
- l'envol des jeunes vers mi juin (observation de juvéniles non volants ou voletant le 19 juin 2001 et le 20 juin 2005).

Bibliographie

BERNARD M., 2010. Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, *in* LPO AUVERGNE, 2010. *Atlas des oiseaux nicheurs d'auvergne*. LPO Auvergne. Delachaux et Niestlé, Paris, pp. 174-176.

BLANCHON R., TOURRET P., DULPHY J.P., LALLEMANT J.J.L. & DUBOC P., 1995. Annales ornithologiques de la LPO Auvergne : période du 15.07. 1993 au 14.07.94. *Le Grand Duc* 46 : 25-46.

BOITIER E. (Dir.), 2000. Liste commentée des oiseaux d'Auvergne. *Le Grand Duc*, hors série n°1, 132 p.

BRUGIERE D., 1981. Nidifications remarquables du Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*), du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) et probablement de la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) en Haute-Auvergne. *Le Grand Duc* 19 : 17-18.

COINTRE J. P., DAMERON, FRESQUET D. & SALASSE J.P., 1972. Complément à la liste des oiseaux nicheurs du Cantal. *Le Grand-Duc* 4 : 39.

DE SEYNES A. et LES COORDINATEURS-ESPECE, 2011. Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2010. *Ornithos* 18 (3) : 145-181.

DUBOIS P.J. & MAHEO R., 1986. *Limicoles nicheurs de France*. Ministère de l'Environnement, Ligue française de protection des oiseaux, BIROE, 291 p.

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G & YESOU P., 2008. *Nouvel inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 p.

FRENOUX J.M., 2005. Etat des populations des limicoles en Auvergne. Nidification, phénologie migratoire et hivernage. Bilan de 35 années d'observation (1970-2004). *Le Grand Duc*, 67 : 1-101.

GEROUDET P., 1983. *Limicoles, gangas et pigeons d'Europe*. Tome 2. Delachaux et Niestlé, Paris, 259 p.

GRISSER P. & ROCAMORA G. 1999. Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, in ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation*. Société Ornithologique de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris : pp. 76-77.

HOULGATTE J.M., 1978. Etude de la reproduction des oiseaux aquatiques sur les tourbières du Cantal. Rapport d'étude, non paginé.

LALLEMANT J.J., TROMPAT A., DULPHY J.P., BONNET A., GILARD B., VIGIER, D. & PIALOUX J.P., 1996. Annales ornithologiques de la LPO Auvergne : période du 15.07. 1994 au 14.07.95. *Le Grand Duc* 49 : 21-44.

LPO AUVERGNE, 2000. *Oiseaux menacés d'Auvergne*. 75 p.

MOUILLARD & CHOussy D., 1971. Liste des oiseaux nicheurs du Puy-de-Dôme. *Le Grand Duc* 2 : 28-35.

ROCHE D. & ROCHE P., 1981. Annales du Centre ornithologique Auvergne. Période du 15.07.79 au 14.07.80. *Le Grand Duc* 18 : 33-68.

TOURRET P., 1995. *Liste rouge des oiseaux nicheurs d'Auvergne*. Rapport LPO Auvergne & DIREN Auvergne, 22 pages et annexes.

TROLLIER B. & IBANEZ F. 1994. Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G., *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989*. Société Ornithologique de France, Paris : pp. 296-297.

UICN FRANCE, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2011. *La liste rouge des espèces menacées en France*. Paris, France, 28 p.

