

Chronique naturaliste - avifaune

Cette chronique ornithologique est loin d'être exhaustive et a été réalisée à partir de la sélection d'observations ornithologiques saisies sur www.faune-drome.org. La période concernée correspond à l'hiver (décembre à février) mais, pour certaines espèces, par manque de temps, je n'ai considéré que les données de décembre et janvier (12-01). Je procède essentiellement en relevant les données d'espèces peu fréquentes à très rares (notamment les migra-

trices) ; j'essaie aussi de mentionner les maxima observés et de donner un ordre d'idée du nombre de données saisies par espèce. Si toutefois vous pensez que certaines de vos observations méritent de figurer dans les prochaines éditions de cette chronique, merci de m'en informer avant sa parution !
Bonne lecture et bon printemps !

Vincent Palomares (vincent_palomares@yahoo.fr)

Grèbe à cou noir : 1 le 5/2 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares)

Grand Cormoran : effectifs maximaux correspondant à des migrateurs, observés à Pierre-Aiguille, dont 685 le 18/2 et 450 le 19/2 (B. Delhome).

****Cormoran pygmée** : l'immaturation découverte le 16/11 à la Roche-de-Glun (B. Delhome et R. Métais) y est observé jusqu'au 5/12 (A. Le Calvez) puis ponctuellement le 14/1, (B. Veillet et al.) ; le reste du temps il a été observé sur le plan d'eau des Pierrelles à Mauves-07 (infos sur www.faune-ardeche.org).

Grande Aigrette : 328 données (max de 136 en 01) ; observations régulières de un à deux individus sur un même site. Effectifs maximaux à Livron-sur-Drôme avec 32 au dortoir le 25/12 (E. Blancard), ainsi qu'à Montélimar, avec 23 le 26/2 (V. Fort). A signaler : l'individu observé le plus en altitude (523 mètres) l'a été à Saoû le 1/12 (C. Tessier).

Héron garde-boeufs : près de 100 données (90% en janvier), réparties sur une cinquantaine de sites. De belles troupes sont observées dans la moitié sud du département, comme 50 à Eurre le 24/12 (M. de Montgolfier) ou 60 au dortoir à Montélimar le 25/12 (J-C. Mantellier). Le nord de la Drôme, habituellement moins visité, notamment en hiver, l'a été semble-t-il davantage, avec notamment des effectifs maximaux de 37 le 28/12 à Mercuriol (B. Delhome), de 30 les 22-23/1 à Beausemblant (F. Léglière et V. Palomares), mais aussi de 18 le 20/1 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Crémillieux). Moins d'observations en février : maximum de 70 le 8/2 à Montoisson, où une vingtaine d'oiseaux sont retrouvés morts, affaiblis suite à la vague de froid (C. Tessier).

Butor étoilé : 1 le 13/2 à Grane (J. Armand) et 1 le 25/2 à Montélimar (V. Fort).

Cigogne blanche : 78 données : 9 données en 01 avec les premiers migrateurs notés à partir de la mi-janvier : 6 le 19/1 à Montélimar (V. Borel), 6 à la Motte-de-Galaure (L. Crémillieux) et 8 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) le 20, 9 à Serves-sur-Rhône le 22/1 (V. Palomares) et 11 à Valence le 26/1 (C. Carton) ; 12 à La Coucourde (C. Richerd) et 1 à Die (G. David) le 27/1, ainsi qu'une dizaine à Valence le 30/1 (N. Bompard). En février, 69 données concernant 2000 à 2600* migrateurs, avec un net passage à partir du 18/2. Fort passage noté le 29/2 avec plus de 400 individus, dont 280 à

Livron (J. Dumoutier), et le 27/2 avec plus de 400 individus, dont 243 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et J. Lesage). Des groupes importants sont également notés en d'autres sites et d'autres dates : 75 le 18/2 aux Tourettes (V. Marconnet), 107 le 19/2 à Hauterives (S. Fayon), 94 le 21/2 à Tain-l'Hermitage (B. Delhome), 71 le 22/2 à Montélimar, dont des oiseaux bagués en Alsace et en Allemagne (N. Parrain), le même jour, 85 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et L. Delaye) et 66 à Savasse (J-L. Bonis), et également 184 le 26/2 à Châteauneuf-du-Rhône (M. et V. Fort), ...

* A noter : les décomptes sont rendus difficiles car l'heure de passage de nombreux groupes n'a pu être précisée...

Cigogne noire : premières migratrices le 29/2 avec 4 individus observés à Pierre-Aiguille (B. Delhome), précédemment passées au col de l'Escrinet et la veille à Largentière-07 (infos sur migraction.net et faune-ardeche.org).



Ouette d'Egypte par Rémi Métais le 5/2 à La Roche-de-Glun

Oie cendrée : 42 données, dont 24 en janvier concernant seulement 12 individus : un groupe de 5 est observé sur la basse Isère du 13/12 au 29/12 à Granges-les-Beaumont (R. Métais, L. Carrier et al.), où un individu est toujours présent le 22/1 (P-Y. Croyal et M. Seguière). Egalement 2 en vol sud le 29/12 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et 5 migrateurs en vol nord le 29/1 à Bourg-lès-Valence (V. Palomares et J. Paoli). Davantage d'observations de migrateurs en février, avec 18 données concernant 471 individus, notamment le 25/2 avec 20 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), 40 à Salles-sous-

chronique naturaliste - avifaune

Bois (C. Long), 14 à Cléon-d'Andran (E. Boulenc) et 9 à Montmeyran (J. Girard-Claudon) ; à noter ce même jour un passage record de 936 migrateurs à Meysse-07 (E. Boulenc sur migration.net) ; à noter également 52 le 28/2 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 50 le 29/2 à Eurre (J. Armand) ainsi que 56 à Salettes (R. Chabanne).

Oie rieuse : un adulte en migration est observé le 25/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), en compagnie de deux oies cendrées ; ce groupe est revu vingt minutes plus tard à Andance-07 (V. Palomares sur faune-ardeche).

Bernache nonnette : un adulte est observé le 17/2 à Châteauneuf-du-Rhône (T. Blanchon).

Ouette d'Égypte : en janvier, uniquement observée à Châteauneuf-du-Rhône où le couple nicheur et ses 4 jeunes de l'année ont été observés à quatre reprises (V. Fort et al.). En février, un individu fait son apparition le 5/2 à La Roche-de-Glun (B. Delhome, R. Métais et al.), ainsi qu'un autre le 27/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Laval). Huit individus différents seront donc observés fin-février.

Tadorne casarca : 2 les 8 et 9/2 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet)

Tadorne de Belon : peu d'individus : 3 à Châteauneuf-sur-Isère le 6/1 (L. David) et 3 le 15/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort et J-L. Bonis), 1 du 4 au 16/2 à La Roche-de-Glun (D. Ariagno et al.), 1 le 16/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Delhome et R. Métais) et 1 le 26/2 à Saint-Nazaire-en-Royans (L. Cremillieux).

Canard siffleur : 35 données réparties sur une dizaine de sites ; max de 4 le 18/1 à Châteauneuf-sur-Isère (P-Y. Croyal), de 7 le 3/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), de 4 le 25/1 à Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) et le 25/2 à Montélimar (V. Fort), et de 3 le 16/2 à Serves-sur-Rhône (B. Delhome). 2 le 5/2 à la Roche-de-Glun (R. Métais et al.), le 5/2 à Etoile-sur-Rhône, le 8/2 à Laveyron (V. Palomares), noté à l'unité le 6/12 à Erôme, le 28/12 à Granges-les-Beaumont (F. Lloret), les 8-10/2 à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux et al.). A noter un plus grand nombre d'observations sur davantage de sites suite à la vague de froid de début février.

Canard chipeau : 78 données en janvier contre plus de 100 en février ! Davantage de données début février, suite à la vague de froid. En janvier, observations régulières sur plusieurs sites, avec les maxima suivants : 15 le 6/12 à Lorient-sur-Drôme (V. Fort), 30 les 22-23/1 à la Roche-de-Glun (B. Delhome et R. Fay) et 13 le 27/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). Hors vallée du Rhône, également noté à Moras-en-Valloire les 26-27/1 (V. Palomares et L. Cremillieux). En février, maxima de 49 le 25/2 sur le secteur de Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 22 le 22/2 à Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) et de 27 le 18/2 à Serves-sur-Rhône (B. Delhome).

Canard souchet : en janvier, 10 données réparties sur 5 sites, puis plus de 30 données davantage réparties en février ; à la Roche-de-Glun, un groupe de 13 est noté le 23/12 (R. Métais et B.

Delhome), également 2 à 4 du 7 au 22/2 ; une femelle stationne à Moras-en-Valloire du 17 au 24/2 (L. Cremillieux et al.) (...)

Sarcelle d'hiver : en janvier, 45 données réparties sur 20 sites ; observations régulières en petit nombre sur plusieurs localités, avec les maxima suivants : 10 le 22/12 à Montélimar

(J-L. Bonis), 7 le 19/12 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais), 9 le 3/1 à Romans-sur-Isère (F. Lloret), 4 le 18/1 à Albon (F. Légglise), 4 le 27/1 à Manthes (L. Cremillieux), 5 le 14/12 à Granges-les-Beaumont (L. Carrier), ou encore 4 le 16/12 à la Roche-de-Glun (L. David). Davantage de données (87) en février, suite à la vague de froid, avec des maxima de 14 le 5/2 à Livron-sur-Drôme (T. Deana), 10 le 13/2 à Grâne (J. Armand), 15 le 14/2 à Manthes (L. Cremillieux) et de 38 le 22/2 à Montélimar (J-L. Bonis).

Nette rousse : en janvier, observée uniquement dans le secteur de Châteauneuf-du-Rhône, avec un effectif maximal de 280 le 27/1 (V. Fort). En février, davantage de données, sur un plus grand nombre de sites avec, par exemple, 1 le 8/2 à Manthes (L. Cremillieux), 1 le 9/2 à Andancette et max. de 2 le 10/2 à Serves-sur-Rhône (F. Légglise), 8 le 12/2 à Etoile-sur-Rhône (F. Lloret), 7 le 22/2 à Saulce-sur-Rhône (J-L.



Photo : Benoît Delhome

Bonis) et 2 le 22/2 à La Roche-de-Glun (B. Delhome).

Fuligule milouin : en janvier, 105 données réparties sur une douzaine de sites ; observations régulières sur plusieurs localités, avec les maxima suivants : 660 le 15/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 26 le 18/12 à la Roche-de-Glun (N. Bazin et F. Manalt), 37 le 27/12 à Etoile-sur-Rhône (F. Lloret), 13 à Saint-Nazaire-en-Royans le 11/1 (L. Carrier). Hors vallée du Rhône, à signaler un mâle à Manthes les 20-26/1 (L. Cremillieux). (...)

Fuligule morillon : en janvier, 88 données réparties sur une dizaine de sites ; observations régulières sur plusieurs localités, avec des maxima proches de la trentaine à la Roche-de-Glun (R. Métais et al.) et à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). (...)

Fuligule milouinan : unique observation d'une femelle le 26/1 à Donzère (V. Fort).

Fuligule nyroca : un mâle à Châteauneuf-du-Rhône les 14-15/1 (V. Fort et J-L. Bonis) ainsi qu'à Ancône le 25/1 (J-L. Bonis). Un mâle est également repéré le 22/2 à Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis).

Garrot à œil d'or : rares données en février, suite à la vague de froid : une femelle est observée sur le Rhône, les 9 et 10/2 (V. Palomares et F. Légglise) ainsi qu'un mâle le 29/2 à Granges-les-Beaumont (L. David et P-Y. Croyal).

Harle huppé/bièvre : 2 femelles indéterminées remontent

chronique naturaliste - avifaune

Photo : Alexandre Movia



le Rhône à St-Vallier le 15/1 (L. David)...

Harle bièvre : rares données en février également, avec un individu en plumage féminin observé à Ponsas le 5/2 (V. Palomares), ainsi que 3 le 28/2 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) ; un couple stationne du 26 au 29/2 à Bourg-de-Péage (A. Movia).

Harle piette : un individu en plumage féminin est observé du 4 au 6/2 à Saint-Nazaire-en-Royans (N. Biron et al.), tout comme un autre du 12 au 28/2 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort et al.) ; à l'instar du bièvre, il s'agit d'une espèce rarement observée en Drôme et surtout à la faveur de vagues

Photo : Patrick Labour



de froid, comme celle ayant sévi en ce début février...

Gypsaète barbu : 51 données, réparties sur une quinzaine de sites et concernant au moins 4 individus différents. Cordouane est observée du 2/12 au 8/1 dans le secteur de St-May (C. Tessier, J. Traversier et al.), à Romeyer le 7/1 (J. Traversier et P. Labour), à Die le 9/2 (J-P. Choisy) ; Tussac est observé à Chamaloc les 21/12 et 13/1 (J-P. Choisy), à Romeyer le 7/1 (J. Traversier et P. Labour), à Treschenu-Creyers le 10/12 (J. Traversier et E. Blancard) puis à Saint-May à partir du 14/2 (J. Traversier) ; Nisa n'est observé que le 28/12 à Treschenu-Creyers (C. Carton) et Stephan ne l'est que le 10/12 à Treschenu-Creyers également (J. Traversier

et E. Blancard).

Milan noir : une donnée hivernale concerne un individu le 25/1 à Eurre (J. Armand) ; 5 autres données en février, à partir du 16/2 à Larnage (F. Daronnat), ensuite, 1 le 19/2 à Loriol-sur-Drôme (Y. Kayser), 5 le 27/2 à Chatuzange-le-Goubet (D. Ducrocq) et 1 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet),



Photo : Patrick Labour

puis 3 à Pierre-Aiguille le 29/2 (B. Delhome).

Milan royal : 9 données en décembre, seulement 2 en janvier, contre 55 en février ! Passage sensible en dernière décade de février, bien mis en évidence à Pierre-Aiguille, avec 16 le 29/2, 13 le 28/2, 21 le 27/2, 17 le 22/2, migrateurs isolés ou par groupes de 2 à 4 individus. A noter qu'en première décade, des migrateurs ont été observés en vol sud (fuites dues à la vague de froid).

Busard Saint-Martin : en janvier, 22 données pour 24 individus, réparties sur les communes suivantes de la moitié nord du département : Albon et Anneyron (F. Légli), Beausembant (R. Métais), Besayes (S. Moreno), Châteauneuf-de-Galaure (L. Cremillieux), Combovin (A. Traversaz), Granges-les-Beaumont (L. David), Lens-Lestang (V. Palomares), Léoncel (J-J. Bertin), Montchenu (A. Traversaz), Montélier (S. Blache) Montrigaud (F. Légli), Romans-sur-Isère (L. Carrier) et St-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux).

Buse pattue : un individu est signalé le 17/12 à Pont-de-l'Isère (R. Métais).

Aigle de Bonelli : un adulte (ou sub-adulte) est observé le 7/1 dans le secteur de Sainte-Croix (T. Deana, P. Labour et J. Traversier).

Faucon émerillon : en janvier, 11 données concernant des individus isolés notés sur les communes suivantes : Anneyron (F. Légli), Chabeuil (J. Girard-Claudon et F. Lloret), Granges-les-Beaumont (L. David), Lens-Lestang (D. De Sousa), Mévouillon (S. Corre), Pierrelatte (S. Corre), Pont-de-l'Isère (R. Fay), St-Gervais-sur-Roubion (J. Girard-Claudon), St-Marcel-lès-Valence (S. Blache).

Faucon pèlerin : en plaine, en janvier, l'espèce a été notée

chronique naturaliste - avifaune

sur les communes suivantes : Albon (F. Légli), Anneyron (V. Palomares), Beausemblant (F. Légli), Bonlieu-sur-Roubion (J. Girard-Claudon), Bourg-les-Valence (L. David), Chabeuil (F. Lloret), Chantemerle-les-blés (B. Delhome), Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon), Montélier (S. Blache), Montmeyran (F. Lloret), Pierrelatte (V. Fort), St-Marcel-les-Valence (R. Métais), St-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux)...

Gélinotte des bois : unique observation le 15/2 à Die (G. David), à une altitude relativement faible (934 mètres, une première pour l'observateur).

Tétrasyre : unique observation le 13/1 à Romeyer (G. David)

Grue cendrée : premiers passages de retour fin février : 40 le 28/2 à Crest (T. Deana) et 1 le 29/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et J. Lesage).

Courlis cendré : uniques données durant la vague de froid de

de 5 le 6/12 à Erôme (V. Palomares) ; 1 à 2 individus notés à Bourg-lès-Valence (L. David), Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet et al.), Etoile-sur-Rhône (F. Lloret et al.), la Garde-Adhémar (V. Fort), Gervans (V. Palomares), Grane (J. Armand), Granges-les-Beaumont (L. Cremillieux), Pont-de-l'Isère (Y. Gonnet), la Roche-de-Glun (R. Métais et al.), Saulce-sur-Rhône (J-L. Bonis) et Tain-l'Hermitage (V. Palomares).

Chevalier culblanc : en janvier, 37 données réparties sur 7 sites de la basse Isère ou de la vallée du Rhône : max de 4 le 12/1 à Châteauneuf-sur-Isère (P-Y. Croyal et Y. Gonnet) et de 2 le 11/12 à Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon). Ailleurs, individus isolés notés à Albon les 3-23/1 (F. Légli et al.) et à Gervans le 8/1 (V. Palomares).

Mouette rieuse : en janvier, plus de 200 données, réparties exclusivement en basse vallée de l'Isère et en vallée du Rhône. Aux dortoirs, effectifs maximaux de 1200 le 15/1 à Donzère (V. Fort) et de 951 le 23/12 à Bourg-lès-Valence (R. Métais) se dirigeant au dortoir de Soyons (07).

Mouette tridactyle : 1 ad le 17/12 à Saint-Nazaire-en-Royans (N. Biron ; donnée homologuée par le CHR), observation faisant suite à un fort coup de vent sur l'Atlantique...



Mouettes rieuses - Photo : Sabine Couvent

début février : 1 le 11/2 à Granges-les-Beaumont et 4 le 13/2 à Romans-sur-Isère (L. David).

Barge à queue noire : un individu stationne du 18 au 20/2 à Serves-sur-Rhône (B. Laval et B. Delhome).

Vanneau huppé : en janvier, 39 données réparties sur une dizaine de sites ; particulièrement et régulièrement noté à l'extrémité nord du département avec des effectifs maximaux de 248 le 18/1 à Lens-Lestang (V. Palomares) et de 580 le 24/12 à Albon (B. Delhome). Ailleurs, maxima de 56 le 17/1 à Alixan (B. Delhome), de 26 le 13/1 à Châteauneuf-du-Rhône (C. Durand-Leloup), de 70 le 8/1 à Donzère (V. Fort) et de 66 le 18/12 à St-Gervais-sur-Roubion (J. Girard-Claudon). 15 données en février, pour l'essentiel en halte dans les mêmes secteurs, mais certains sont notés en migration active comme ce groupe de 21 le 19/2 à Montmeyran (J. Girard-Claudon) ou de 6 le 29/2 à Bouchet (J-N. Heron).

Pluvier doré : uniquement observé en janvier avec 5 données sur 3 sites : à Lens-Lestang, max de 15 le 18/1 (V. Palomares) ; ailleurs 1 le 17/1 à Alixan (B. Delhome) et 1 le 18/1 à Albon (V. Palomares).

Chevalier guignette : en janvier, 74 données essentiellement concentrées sur la basse Isère et en vallée du Rhône : max



Goéland brun - Photo : Vincent Palomares

Mouette pygmée : un individu est signalé le 4/2 à La Roche-de-Glun (D. Ariagno).

Goéland cendré : seulement 16 données en janvier, contre 48 en février. En début de période, essentiellement observé à Bourg-lès-Valence avec le premier de l'hiver le 10/12 (A. Le Calvez), où un maximum de 2 individus y est noté le 14/1 (V. Palomares) ; ailleurs en vallée du Rhône : 1 le 26/12 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 le 31/12 à Gervans (V. Palomares), 2 le 15/1 à Donzère (V. Fort), 1 le 22/1 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). En basse Isère, seul un adulte est noté à Romans le 25/1 (J. Duchamp) ; à noter enfin deux individus dans les cultures d'Albon le 16/1 (F. Légli). Net afflux suite à la vague de froid de février, avec des effectifs maximaux de 17 le 2/2 à Albon (V. Palomares), 4 le 5/2 à Livron (T. Deana) et le 10/2 à Ponsas (V. Palomares) ; des individus sont observés en vol nord en fin de période avec notamment 12 le 28/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome).

Goéland leucophaée : 425 données essentiellement réparties

chronique naturaliste - avifaune

le long du Rhône, de l'Isère et de la Drôme. Aux dortoirs, effectifs maximaux de 340 le 15/1 à Donzère (V. Fort), de 577 le 19/1 à Bourg-lès-Valence (B. Laval) et de 189 le 25/1 à la Garde-Adhémar (V. Fort). Des mouvements vers le nord sont notés à Pierre-aiguille fin février, avec par exemple 181 le 26/2 (B. Delhome).

Goéland brun : 35 données (20 en janvier) réparties sur 5 sites ; essentiellement observé au dortoir de Bourg-lès-Valence avec le premier de l'hiver le 18/12 (N. Bazin et F. Manalt) et où un maximum de 9 individus y est noté le 14/1 (V. Palomares) puis de 10 le 27/2 (A. Le Calvez). Ailleurs, 1 le 27/12 à Châteauneuf-du-Rhône (T. et Y. Blanchon), 1 le 6/1 à Ponsas (V. Palomares), 1 le 15/1 à Tain-l'Hermitage et 2 le 28/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome).

Goéland argenté : unique donnée d'un adulte le 31/12, en vol au dortoir de Bourg-lès-Valence (V. Palomares).

Goéland pontique : 11 données concernant au moins 7 individus différents, repérés au dortoir de Bourg-lès-Valence (2 ad + 1 H3 + 2 H2 + 3 H1) avec un maximum de 5 le 14/1 (V. Palomares). A noter que parmi eux un H1 (obs le 21/1) et un H2 (obs le 14/1), bagués dans le sud de la Pologne, ont été recontactés sur la décharge de Penol-38 le 23/1 (D. De Sousa sur www.faune-isere.org). Le H2 déjà repéré le 14/1 est de nouveau observé le 28/1 à Bourg-lès-Valence (A. Le Calvez et V. Palomares) ainsi qu'à Beauchastel-07 le lendemain soir (V. Palomares et J. Paoli sur www.faune-ardeche.org) ; cela illustre bien les mouvements de grands goélands entre les différentes décharges et dortoirs du sud de la région.

Pigeon colombin : 17 données ; à noter un beau regroupement de 40 individus le 1/12 sur le site d'observations régulières de Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais) ; ailleurs, max de 20 le 15/12 à St-Marcel-lès-Valence (R. Métais), 23 le 21/12 à Mercuriol (B. Delhome), 30 le 25/12 à Alixan (S. Blache), 9 à Montvendre et 14 le 8/1 à Chabeuil (A. Le Calvez), 14 le 17/1 à Montélier (B. Delhome). En février, pas de données jusqu'au 19/2, date à laquelle les premiers migrateurs de pas-



Fauvette à tête noire - Photo : Roger Mathieu

sage sont notés, avec 4 à Montmeyran (J. Girard-Claudon) et 2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome).

Effraie des clochers : seules données d'un chanteur le 17/12 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et le 28/2 à Die (P. Lloret).

Hibou moyen-duc : à Saint-Marcel-lès-Valence, 9 individus sont notés (dortoir diurne) le 2/12 (R. Métais et B. Delhome) ; ailleurs, un seul le 23/12 à Montélier (S. Blache).

Chevêchette d'Europe : chant noté le 24/2 à Saint-Martin-en-Vercors (V. Fort).

Chouette de Tengmalm : chant noté en plein jour le 24/2 à Pommerol (C. Tessier).

Pipit farlouse : en janvier, 92 données, provenant particulièrement du nord du département, avec des groupes max de 30 le 1/1 à Montmeyran (F. Lloret), ou de 25 le 15/12 à Châteauneuf-de-Galaure (R. Métais)...

Pipit spioncelle : en janvier, 26 données concernant essentiellement des individus isolés le long du Rhône et de l'Isère ; à noter 20 le 4/12 à Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon) et 3 le 8/1 à Gervans (V. Palomares).

Hirondelle de rochers : aucune donnée avant le 18/2 ; 13 données en tout, essentiellement en provenance des Baronnies (C. Tessier et J. Traversier) et de Pierre-Aiguille (B. Delhome et J. Lesage) ; 3 de retour le 18/2 aux Prés



Pouillot véloce de type sibérien observé par Aymeric Le Calvez au Grand Charran (Valence), le 9/12

(G. David) et maximum de 16 le 26/2 à Pierre-Aiguille (B. Delhome).

Accenteur alpin : 9 données en janvier (aucune en plaine) : 1 le 2/12 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp), 3 le 18/12 à Saint-May (C. Tessier), 1 les 19 et 24/12 à Villeperdix (J. Traversier), 1 le 20/12 à Plan-de-Baix (B. Pascal), 1 le 25/12 à La Motte-Chalancon (J. Traversier), 3 le 8/1 à Beauregard-Baret (P. Vermot-Gauchy), 2 le 15/1 à La Roche-sur-le-Buis (A. Delhomme) et 3 le 22/1 à Val-Maravel (F. Droussen). A noter les seules données de plaine à Pierre-Aiguille les 18 et 29/2 (B. Delhome et J. Lesage).

Gorgebleue à miroir : un mâle en halte migratoire est déjà de retour le 29/2 à Saint-Julien-en-Quint (M. Llioret).

Grive mauvis : 80 données, dont la moitié en février. Effectifs

chronique naturaliste - avifaune

maximaux de 80 le 27/1 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et le 13/2 à Bourg-lès-Valence (Y. Gonnet).

Cisticole des joncs : unique observation d'un individu le 3/2 à Pierrelatte (S. Corre). Cette espèce a nettement régressé ces dernières années en Drôme, potentiellement à cause de la rigueur des deux précédents hivers. Espérons que la vague



Photo : B. Labet

de froid de début février n'aura pas eu raison de cet individu ! A suivre ce printemps...

Fauvette à tête noire : plus de 40 données pour chacune des deux dernières décades de janvier, contre la moitié début février (vague de froid ?). Il semble que l'hiver jusqu'alors très doux a favorisé le stationnement aux quatre coins du département...

Pouillot véloce de type sibérien : deux données : 1 le 9/12 à Valence (A. Le Calvez, observation homologuée par le CHR) et 1 le 23/12 à La Roche-de-Glun (B. Laval).

Mésange alpestre : en janvier, 10 données en provenance du Vercors et du Diois : à Léoncel le 2/12 (J. Duchamp), à Bouvante les 18 et 22/1 (D. Ariagno et J. Duchamp), à Romeyer les 29/12, 3 et 13/1 (G. David et A. Provost), à Recoubeau-Jansac le 11/12 (G. Goujon), à Vassieux-en-Vercors le 8/1 (J. Duchamp) et à Val-Maravel le 22/1 (F. Deroussen).

Tichodrome échelette : en janvier, 15 données concernant des individus isolés : le 2/12 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp), le 14/12 à Sahune (A. Hargreaves), le 1/1 à Saint-Julien-en-Quint (F. Arod), les 6 et 28/1 à Rochefort-Samson (C. Santos) et le 14/1 à Beauregard-Baret (P. Vermot-Gauchy), le 10/1 à Châteauneuf-de-Bordette (J. Traversier), le 12/1 à Cornillac et les 17 et 20/1 à Rémuzat (J. Traversier), le 12/1 à Peyrus et le 23/1 à Saou (F. Lloret), le 15/1 à Montbrun-les-Bains (J. Traversier et J. Girard-Claudon).

Grimpereau des bois : en janvier, seulement 4 données d'individus isolés en provenance du Vercors : le 2/12 à Léoncel (J. Duchamp), les 22/12 et 8/1 à Bouvante (D. Ariagno et B. Laval), le 14/1 à Vassieux-en-Vercors (D. Ariagno).

Pie-grièche grise : observée régulièrement à La Bégude-de-Mazenc du 15/10 au 12/1 (S. Couvent) ; un individu est également observé le 14/12 à Montrigaud (F. Légglise).

Pie-grièche méridionale : rares données : 3 les 15/1 et 19/2 à

Ferrassières (J-M. Desprez) ; 2 le 15/1 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (J. Traversier et J. Girard-Claudon).

Corneille mantelée : 3 données, avec une le 12/1 à Pierrelatte (F. Camacho), une le 22/1 à Die (P. Lloret) et une le 24/1 à Châtillon-en-Diois (B. Cuerva). Egalement un hybride (avec corneille noire) le 27/2 à Châteauneuf-sur-Isère (B. Laval).

Moineau soulcie : seulement 4 données : 2 le 18/12 à Gigors-et-Lozeron (F. Humbert), 2 le 15/1 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (J. Traversier et J. Girard-Claudon) et 1 le 25/1 à Sainte-Jalle (A. Hargreaves)

Pinson du Nord : 83 données, dont 51 en février (vague de froid ?), avec de faibles effectifs maximaux de 20 le 14/1 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome), de 19 le 3/1 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet), et de 30 le 2/12 à Bouvante et



Photo : Patrick Labour

le 8/12 à Omlèze (J. Duchamp). L'essentiel des données concerne 1 à 4 individus.

Grosbec casse-noyaux : 86 données, dont 50 en février ; groupes comptant moins d'une vingtaine d'individus : max de 20 le 14/2 à Romans-sur-Isère (R. Métais), 12 le 1/12 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) et de 8 à Saint-May le 14/12 (C. Rollant). L'essentiel des observations concerne toutefois un à deux individus.

Bruant jaune : en janvier, 28 données ; effectifs rarement élevés ; max de 25 le 3/1 à Bellgarde-en-Diois (E. Blancard) et de 20 le 18/12 à Marsanne (J. Girard-Claudon).

Bruant fou : en janvier, 35 données, essentiellement en provenance des Baronnies ; max de 10 le 18/1 à Gigors-et-Lozeron (F. Savasta) et de 15 le 3/1 à Villeperdrix (J. Traversier). A noter 4 données en moyenne vallée du Rhône : 1 le 3/1 à La Roche-de-Glun (Y. Gonnet), 1 le 21/12 à Serves-sur-Rhône (F. Légglise), 1 le 3/12 à Beausemblant et 2 le 15/12 à Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares).

Bruant proyer : en janvier, 22 données réparties sur une douzaine de sites de plaine ; max de 30 le 3/12 à Bonlieu-sur-Roubion (J. Girard-Claudon), 29 le 18/12 à Alixan (F. Lloret et N. Gautier), 17 le 4/1 à Pierrelatte (V. Fort), 20 le 12/1 à Albon (V. Palomares), 20 le 15/1 à Chabeuil (F. Lloret), ...

** espèce dont les données sont soumises à homologation régionale*

chronique naturaliste - herpétofaune



Depuis quelque temps, un bilan des observations herpétologiques était souhaité. Je vais donc vous proposer chaque trimestre une chronique herpéto, un peu à l'image de ce que fait Vincent Palomares pour les oiseaux. Je tirerai mes données également de Faune-Drôme, mais pour ceux qui ne transmettent pas, vous pourrez toujours me faire parvenir vos observations par mail (loicdavid@yahoo.fr), afin d'être le plus complet possible. L'hiver est généralement une période calme pour les reptiles et les amphibiens. Mais quelques individus, troublés par les températures chaudes de décembre ou la vague de froid de février, n'ont pu échapper aux yeux des naturalistes drômois. Voici donc les observations herpétologiques de décembre 2011, janvier et février 2012)

Loïc David

Amphibiens



Photo : Benoît Delhomme

Salamandre tachetée : entre le 2 décembre et le 22 février, pas moins de 13 salamandres ont été retrouvées écrasées, principalement dans la moitié Nord du département, dont 6 sur la commune de Moras en Valloire (N. Parrain ; A. Traversaz). Seulement 6 observations d'individus bien vivants dont une larve le 27 février à Gigors et Lozeron (F. Savasta).

Crapaud commun : 2 écrasés (J. Traversier - St Féréol Trente Pas ; J. Girard Claudon - Autichamp) et 3 bien vivants (J. Girard Claudon - Donzère ; Y. Masse - Aubenasson).

Triton palmé : 1 à St Uze le 05 décembre (R. Métais) ainsi que 2 mâles observés à Grâne le 11 janvier (N. Parrain).

Reptiles

Seulement trois données de serpents : 1 **couleuvre vipérine** dérangée dans son trou d'hibernation le 6 décembre à Livron

sur Drôme (N. Parrain), 1 **couleuvre verte et jaune** assez jeune retrouvée morte près de bottes de paille le 24 février à Bourg-lès-Valence (L. David) et une **coronelle girondine** retrouvée écrasée le 26 février sur la route de Charsac (Y. Bertrand).



Photo : Y. Gonnat

Lézard vert occidental : 3 observations d'individus morts (voir photo) dont 2 les 5 et 10 février à la Roche de Glun et St Marcel-lès-Valence (Y. Gonnat et L. Delaye), durant la période très froide qui pourrait les avoir fait sortir de leur coin d'hivernage. Le premier avait été retrouvé écrasé le 23 décembre à Arnayon (J. Traversier) par des températures sûrement beaucoup plus chaudes !

Lézard des murailles : 4 observations durant le mois de décembre. Aucune observation entre le 24 janvier et le 19 février, et de nouveau des observations dans la dernière décade de février. N'hésitez pas à transmettre vos observations : le lézard des murailles est présent presque partout en Drôme !

Ayez le déclic : « J'observe, je clique ! »

Saisissez vos observations sur www.faune-drome.org :
522 inscrits pour un peu plus de 137 000 données naturalistes à ce jour...

