

chronique naturaliste - avifaune

Cette chronique a été réalisée notamment à partir de la sélection d'observations ornithologiques saisies en ligne sur www.faune-drome.org. La période concernée correspond au printemps (mars à mai). Ce printemps a été marqué par des conditions météorologiques médiocres en avril-mai ayant perturbé le passage des migrateurs (et potentiellement la reproduction de certaines espèces). Ces conditions ont néanmoins favorisé l'observation de limicoles en halte en aval de Romans (apparition localisée de vasières sur un tronçon de l'Isère), avec de belles troupes d'espèces peu courantes dans le département (chevaliers arlequins, combattants variés, bécasseaux cocorlis). Le passage de plusieurs espèces s'est aussi étalé davantage jusqu'en mai ;

c'est le cas par exemple des cigognes blanches, dont les effectifs ne cessent d'augmenter d'un printemps à l'autre (plus de 4000 depuis janvier 2013). Un suivi bénévole régulier à Pierre-Aiguille a également été ponctué de belles journées de passage, notamment en mars et en mai (bondrées). Au chapitre des nicheurs, à signaler les premières preuves de reproduction drômoise pour le Courlis cendré et le Vanneau huppé!

Pour les prochaines chroniques, merci de m'envoyer vos plus belles photos prises en Drôme sur la période afin de les illustrer ! Bonne lecture et bon été (enfin !) !

Vincent Palomares - [vincent_palomares\(at\)yahoo.fr](mailto:vincent_palomares(at)yahoo.fr)


Grèbe huppé : seule construction de nid notée le 24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) ; premières couvaisons notées le 6/5 à Châteauneuf-du-Rhône et Montélimar (V. Fort), où les premiers poussins avaient été observés le 17/5 l'an passé... Aucun poussin noté sur la période...

Grèbe à cou noir : 1 du 1^{er} au 7/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J.L. Bonis, V. Fort & V. Palomares)

Grand Comoran : à Pierre-Aiguille, plus de 5800 migrateurs sur la période, dont près de 5300 en mars (voir article pp 18-19).

Bihoreau gris : un individu est observé le 14/3 à Manthes (Anonyme), ce qui constitue la seule donnée disponible en mars... Les autres données concernent des individus proches des colonies de reproduction de la Basse Isère et de la basse vallée du Rhône.

Héron pourpré : premiers le 22/3 à Montélimar puis le 27/3 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort), seules données du mois de mars. La plupart des observations sont réalisées en avril, durant le maximum du passage (22 données), mais sur les sites d'observation régulière, des individus sont encore observés en mai : à Chavannes (B. Delhome), Montélimar (J.L. Bonis) et Romans-sur-Isère (A. Clavel)



Cigogne noire - photo : Vincent Palomares

Cigogne noire : 30 individus observés, dont la moitié à Pierre-Aiguille : 8 en mars, 5 en avril et 2 en mai où la dernière est observée le 9/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). Les autres données concernent également des migratrices en vol, à l'exception de deux individus observés le 9/4 : l'un se posant dans le lit de l'Eygues à Sahune (J. Traversier) et l'autre en pêche dans un petit canal au milieu des cultures d'Albon, s'y posant le soir et repartant en migration le lendemain vers 10 h (V. Palomares)

Cigogne blanche : plus de 2000 migratrices observées sur la période, essentiellement en mars (82 données pour près de 1100 individus), mais plus d'observations que d'habitude ensuite, certainement des oiseaux retardés par les mauvaises conditions météo : 43 données en avril (700 ind) et encore 19 en mai (200 ind). Groupes max de 150 le 2/3 à La Garde-Adhémar (M. Benmann), 115 le 12/3 à Combovin (R. Métais), 143 le 3/4 à Romans (A. Clavel). Seulement deux observations après la mi-mai : 1 le 17/5 à Etoile-sur-Rhône (R. Métais) et 5 le 22/5 à Albon (V. Palomares)


Cygne tuberculé : constructions de nid notées fin-mars à Montélimar, où les premiers jeunes sont observés le 14/5 (J.L. Bonis)

Oie rieuse : l'adulte hivernant est vu pour la dernière fois le 7/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort et J.L. Bonis)

Oie cendrée : seulement 3 données ; 2 groupes de migratrices en vol nord en mars : 10 le 18 à Livron (L. Félix) et 6 le 28 à Nyons (R. de Coster) ; un individu isolé est observé sur le musoir amont du barrage de Bourg-lès-Valence le 16/5 (V. Palomares)

Bemache nonnette : l'échappé de captivité poursuit son séjour à Bourg-de-Péage où il est encore observé le 19/5 (F. Lloret)

Crabier chevelu - photo : Jean-Louis Bonis



Crabier chevelu : 4 données en provenance de Montélimar, concernant au moins 2-3 oiseaux, probablement des migrateurs en halte : 2 le 17/4 (C. Durand-Leloup) puis 1 du 8 au 28/5 (J.C. Cordara, C. Comte et J.L. Bonis)

Héron garde-boeufs : en dehors des secteurs classiques de présence, à noter des mouvements vers le nord à deux reprises à Pierre-Aiguille (3/3 et 1/4), un des deux groupes de 5 a par ailleurs été observé en halte dans une pâture à vaches de Laveyron (V. Palomares). Encore 8 en vol nord le 26/5 à Albon (V. Palomares)

Aigrette garzette : migratrices notées en 04-05 ; groupe maximal de 14 le 5/5 à Tulette (J.N. Heron)

Grande Aigrette : 57 données en mars, 32 en avril et 7 en mai. En mai, 1-3 individus observés à Montélimar (J.L. Bonis) et Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et deux groupes en migration, avec 10 le 11/5 à Haute-rièves (A. Traversaz) et 6 le 23/5 à Beaumont-lès-Valence (A. Charbonneau), des effectifs étonnants à cette période, parmi les plus importants relevés sur la période.

Héron cendré : premiers jeunes au nid observés le 13/4 à Beaumont-Monteux (J.J. Peyrard)

chronique naturaliste - avifaune

Ouette d'Égypte : le couple de Châteauneuf-du-Rhône, s'étant reproduit les deux années passées, a remis cela cette année mais de manière encore plus précoce, un mois plus tôt, avec l'apparition d'une nichée de 5 poussins le 10/4 (J-L. Bonis). Un deuxième couple est observé sur Montélimar mais aucune reproduction n'y est pour l'instant observée (C. Durand-Leboup et J.C. Cordara)



Tadome de Belon - photo: Vincent Palomares

Tadome de Belon : présence continue durant tout le mois de mars sur l'Isère en aval de Romans, avec un maximum de 11 le 9/3 (A. Clavel) ; ailleurs, une femelle stationne du 4 au 22/3 à Moras-en-Valloire (L. Cre-millieux), 3 en migration le 8/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais et B. Delhome) et un individu le 13/3 à Livron (M. Grouazel)

Canard siffleur : 4 données seulement ; un en migration le 4/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais & B. Delhome), 2 le 23/3 à Beaumont-Montoux (B. Delhome), à Châteauneuf-du-Rhône, un couple le 23/3 et un dernier mâle le 25/4 (V. Fort & J-L. Bonis)

Sarcelle d'hiver : deux derniers individus signalés le 23/4 à Montélimar (J-L. Bonis) et le 30/4 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret) ; groupes max de 33 le 7/3 à Montélimar (J-L. Bonis)

Canard colvert : première nichée observée le 2/4 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) ; même première date que l'an passé

Canard pilet : 3 données seulement, début mars : 2 en migration le 8/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais & B. Delhome) ; à Châteauneuf-du-Rhône, 1 le 6/3 (V. Palomares) et 2 le 10/3 (T. Blanchon)

Canard souchet : à peine 20 données, soit 3 fois moins que l'an passé ; 4 premiers le 22/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), groupe max de 15 le 23/4 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) et dernier le 30/4 à Montélimar (J-L. Bonis)

Canard chipeau : 23 données seulement, concernant en général moins de 10 oiseaux ; l'unique donnée de mai concerne un couple dont la femelle couvait à La Roche-de-Glun le 25/5 (B. Delhome), deuxième donnée de reproduction certaine actuellement dans la base faune-drome !

Sarcelle d'été : 33 données, concernant en général 13 migrateurs en halte ; groupes max de 26 le 18/3 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), et de 14 le 24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) ; dernière le 30/4 à Montélimar (J-L. Bonis)

Nette rousse : plus de 90 données, dont près de la moitié en avril (passage) ; max de 242 sur le site classique de Châteauneuf-du-Rhône (V. Palomares) ; aucune observation de nichée sur les sites de reproduction de Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône, Ancône et Saucé-sur-Rhône, où des couples sont par ailleurs présents (V. Fort, J-L. Bonis & al.)...

Fuligule milouin : 20 données en mars, 12 en avril et encore 9 en mai ; les données de mai concernent quelques mâles à Châteauneuf-du-Rhône, mais aussi une femelle le 14/5 (J-L. Bonis) et deux autres le 27/5 à Granges-lès-Beaumont (L. David)... A suivre...

Fuligule nyroca : un mâle stationne parmi des milouins à Châteauneuf-du-Rhône jusqu'au 7/3, site sur lequel sont par ailleurs repérés deux hybrides milouin x nyroca, avec un mâle le 4/3 (S. Maury) et une femelle le 6/3 (V. Palomares)

Fuligule morillon : 21 données en mars et 24 en avril ; en mai l'espèce n'est plus observée que dans les secteurs de reproduction sur la basse

vallée de l'Isère (7 données). A Châteauneuf-du-Rhône, le dernier est observé le 25/4 (J-L. Bonis), max de 50 le 6/3 sur ce site (V. Palomares)

Garrot à œil d'or : une mâle stationne les 7 et 8/3 à Châteauneuf-du-Rhône (M & V. Fort, J-L. Bonis)

Harle huppé : 3 mâles en halte migratoire le 1/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Harle bièvre : un couple sur la Boume le 6/3 à Sainte-Eulalie-en-Royans (J. Duchamp)

Bondrée apivore : première le 22/4 à Pierre-Aiguille (12 en avril) où 2600 migratrices sont observées entre le 1^{er} et le 12/5, dont 2400 rien que du 7 au 12 (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara et al.)

Milan noir : plus de 3000 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 2587 en mars, 356 en avril et 144 en mai ; maximum journalier de 426 individus le 20/3 (R. Métais) puis de 563 le 26/3 (C-H. Traversier). Nid occupé le 14/4 à Chatuzange-le-Goubet et couvaie notée le 3/5 à Chavannes (B. Delhome)

Milan royal : près de 370 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 257 en mars, 81 en avril et encore 30 en mai (pour l'essentiel, des immatures de 2^e année ce dernier mois). Les effectifs paraissent plus élevés que la moyenne cette année avec plusieurs journées de mars totalisant plus de 40 individus : 41 le 8, 54 le 9 (R. Métais) et 57 le 26 (C-H. Traversier) ; encore 23 le 17/4 (B. Delhome).



Canard colvert - photo: Vincent Palomares

Gypaète barbu : Au moins 5 individus différents sur la période. "L'hivernage" des 3 immatures lâchés dans le Vercors s'est poursuivi dans les Baronnies jusqu'à début mai. "Cordouane" (femelle de 4^e année) est présente jusqu'au 7/3 (J. Traversier, C. Tessier), puis de nouveau du 29/4 au 2/5 (N. Renous, C. Tessier, J. Traversier). Le 4/5, elle est dans le Haut-Diois à Boulc (F. Varagnat). "Tussac" (mâle 3^e année) est présent jusqu'au 5/5 dans les Baronnies (A. Hargreaves, F. Bégou, T. Cugnod et al.), et dans le Vercors par la suite (transmis par B. Betton, PNR du Vercors). "Angébo" (mâle 2^e année) est lui aussi régulièrement dans les Baronnies, à l'exception notable du 27/3 où il est observé à la Répara-Auriples (T. Deana) ; part ensuite dans un très long périple à travers le centre et sud de la France dès la mi-avril : le 16 en Ardèche, le 17 dans le Cantal, le 18 en Dordogne, le 19 dans l'Aveyron, les 20 et 21 dans le Gard, le 22 dans les Gorges du Verdon. Depuis cette date, fréquente les Alpes du Sud ! (données satellite PNR du Vercors). "Belle motte" (femelle 2^e année), après un hiver passé dans le Mercantour, est de retour sur le Vercors, notamment le 6/5 à Châtillon-en-Diois (fide J. Traversier). "Basalte" (mâle 2^e année lâché dans les Grands Causses en 2012) : localisé par sa balise satellite le 14/5 à Beauregard-Baret, avant de continuer vers le nord-est et le massif du Mont-Blanc puis le Valais !

Vautour percnoptère : première donnée dans les Baronnies le 21/3 (A. Delhomme), puis 2 dès le lendemain dans les gorges de l'Eygues (C. Tessier). Il s'agit du seul couple des Baronnies, comme ce fut le cas en 2012. Dans le Sud-Vercors, le mâle du couple arrive le 25/3 (R. Mathieu), le 11/4 le couple est reformé (C-H. Traversier). Des oiseaux non reproducteurs (immatures) sont notés dans le Vercors et les Baronnies, certainement 3 individus minimum (dont un bagué en 2009 dans l'Hérault). Comme en 2011 et 2012, des adultes sont observés dans la grande zone

chronique naturaliste - avifaune

"Dieulefit - Bourdeaux - Saoû - Comps". Il s'agit probablement des oiseaux nichant dans le Vercors et/ou les Baronnies, mais cette zone présente régulièrement de la nourriture et offre par ailleurs des secteurs favorables à la nidification. L'installation d'un couple dans ce secteur n'est donc pas à exclure, d'autant plus qu'il s'agit là d'une des zones les moins prospectées par les ornithologues drômois... A vos jumelles !

Vautour fauve : en mars, les observations se concentrent sur les reliefs, à l'exception d'un à Tulette le 20/3 (J.N. Héron). En avril, les observations en-dehors du relief sont en progression : un oiseau à Souspierre le 3/4 (T. Deana), 3 le 25/4 à Alex (J. Armand). Également 2 puis 10 individus en vadrouille à Crozes-Hermitage, lors du suivi de la migration à Pierre-Aiguille, les 24 et 25/4 (B. Delhomme, L. Delaye, C. Diers). En mai, les observations en plaine continuent, malgré les mauvaises conditions météo récurrentes : un à Donzère le 1/5 (J-L. Bonis), 2 puis 1 à Crozes-Hermitage les 7 et 11/5 (J-C. Cordara, R. Métais), 3 à Montmeyran le 8/5 (T. Deana), 6 à Crest le 27/5, 1 à Salettes le 29/5 (F. Chabanne). A cette période, l'augmentation des observations vers l'ouest se fait également sentir sur plusieurs lieux de la vallée de la Gervanne. En revanche, le Royans ne fournit aucune donnée pour l'espèce sur la période considérée.

Vautour moine : comme à l'accoutumée, la majorité des observations provient des Baronnies. A noter : un parmi les fauves le 20/5 à Plan-de-Baix (F. Varagnat) et quelques données sur le sud-Vercors, autour de Die et Chamaloc, dont Asphodèle, observée le 4/3, à plus de 40 km de son nid des Baronnies (J-P. Choisy, B. Lefevre, M. Prouveur, C. Lartigau).

Circaète Jean-le-Blanc : précurseur le 1/3 à Grignan (J. Caron) puis le 9/3 à Pierre-Aiguille où 34 migrateurs seront ensuite observés en mars (R. Métais, J-C. Cordara, L. Delaye, J. Lesage et al.) ; les retours sont assez tardifs et la migration s'étale jusqu'en mai ce printemps. La plupart des forts indices de reproduction proviennent des Baronnies : construction de nid notée dès le 19/3 à Sahune (C. Tessier), puis le 23/3 à Chalancon (E. Blancard) ; couvaison observée dès le 15/4 à Villeperdrix où un jeune au nid est observé le 20/5 (J. Traversier) ...

le 9/4 à Albon (V. Palomares, examen CHR en cours), un mâle adulte et une femelle le 13/4 de nouveau à Pierre-Aiguille (B. Laval, R. Métais, J-C. Cordara, L. Delaye et B. Delhome, donnée homologuée par le CHR) puis un 2^e année le 8/5 à Rochegude (J-N. Héron, examen CHR en cours)

Busard cendré : premier le 29/3 à Pierre-Aiguille, puis encore 12 migrateurs jusqu'au 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). Bon passage le 1/5 à Saint-May, avec 8 migrateurs observés en 4 heures de temps (J. Traversier). Neuf autres migrateurs isolés, de passage ou en chasse sont observés en avril-mai, dont 4 à Albon (V. Palomares). Aucun indice de reproduction sur la période.

Autour des palombes : 19 données, dont 2 concernant des migrateurs à Pierre-Aiguille (B. Delhome, L. Delaye, L. David et B. Laval) ; les autres observations concernent les Baronnies et le Vercors. Des parades sont observées le 2/5 à Saint-May (J. Traversier), unique indice probable de reproduction.

Epervier d'Europe : à Pierre-Aiguille, près de 700 migrateurs sur la période : 530 en mars, 119 en avril et 34 en mai ; max de 183 le 26/3 (C-H. Traversier, C. Rollant et L. Félix). Premières parades signalées le 9/3 à Pierrelongue (A. Delhomme) ; un aire occupée dans un pin sylvestre est repérée le 31/5 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana)

Buse variable : à Pierre-Aiguille, près de 2000 migrateurs sur la période : 1700 en mars, 219 en avril et encore 22 en mai ; max de 508 le 9/3 (R. Métais). Des transports de proies pour des jeunes sont notés le 7/5 à Grâne (S. Talhoet), unique indice certain de reproduction pour la période...

Aigle botté : un le 18/3 à Saint-Sorlin-en-Valloire (sous réserve d'homologation) et un clair le 13/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et J-C. Cordara, donnée homologuée par le CHR)

Aigle de Bonelli : deux immatures sont observés en début de période : un 3^e année le 30/3 à Die (C. Lartigau) et un 2^e année le 15/4 à Rémuzat (J. Traversier) ; le couple d'adultes des Baronnies observé en février ne semble malheureusement pas avoir été de nouveau observé...

Busard des roseaux - photo : Vincent Palomares



Busard des roseaux : premier le 7/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) puis le 8/3 à Pierre-Aiguille où 472 migrateurs sont observés : 390 en mars, 55 en avril et 17 en mai ; près de la moitié de l'effectif observé (!) est passé le 30/3 avec pas moins de 227 migrateurs (B. Delhome, R. Métais). Les observations sont régulières en mai et concernent pour la plupart des oiseaux immatures en chasse ou en migration. La nidification est probable en basse vallée de l'Isère où un transport de branche a notamment été observé le 28/4 (M. Segurier)

Busard Saint-Martin : 65 données, concernant essentiellement des hivernants et des migrateurs : 34 en mars, 21 en avril et 10 en mai. Peu de données de reproduction probable à l'exception d'un couple le 25/5 dans le secteur classique de Montrigaud (L. Beligné).

Busard pâle : printemps exceptionnel pour cette espèce en France, avec près de 70 migrateurs observés. La Drôme n'est pas en reste avec 6 individus observés : un mâle 3^e année le 6/4 à Lens-Lestang (D. de Sousa, sous réserve d'homologation), un mâle adulte le même jour à Pierre-Aiguille (B. Delhome, donnée homologuée par le CHR), un mâle 3^e année



Balbuzard pêcheur - photo : Vincent Palomares

Balbuzard pêcheur : premier le 8/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais) où 79 migrateurs seront observés jusqu'au 8/5, avec un max de 12 le 25/3 (C-H. Traversier) puis de 19 le 30/3 (B. Delhome et R. Métais). Une vingtaine d'autres migrateurs sont observés sur différents autres sites. Dernier le 13/5 à Grâne (J. Armand)

Faucon crécerelle : à Pierre-Aiguille, près de 200 migrateurs ont été observés : 99 en mars, 78 en avril et 14 en mai ; max de 31 le 26/3 (C-H. Traversier). Premier accouplement noté le 19/3 à Rochegude (V. Lallia) ; premier nid occupé signalé le 15/4 à Andancette (V. Palomares) ; premières couvaisons notées le 30/4 à Chantemerle-les-blés (B. Delhome) et premiers jeunes repérés au nid le 30/5 à Saoû (Y. Masse)

Faucon kobez : au moins 18 individus ont été observés du 21/4 au 27/5 en différents points du département (11 mâles, dont 3 ad. et 2 2^e année ; 7 femelles dont 2 ad et 5 2^e année) : 2 le 21/4 à Chabeuil (F. Lloret), 1 le 28/4 à Bellecombe-Tarendol (A. Haregreaves), 1 le 4/5 à Ferrassières (J. Traversier), le 8/5, un à Rochegude et un à Suze-la-Rousse (J-N. Héron), 1 le 10/5 à Chatuzange-le-Goubet (R. Métais), 1 le 12/5 à Bouvières (C. Ronne et Y. Blanchon), le 19/5 un à Albon (V. Palomares), un à Tulette (J-N.

chronique naturaliste - avifaune

Heron), un à Génissieux (R. Métais), 2 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 1 le 22/5 à Mévouillon (A. Hargreaves), 1 le 23/5 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome), le 27/5, 1 à Mirabel-et-Blacons (F. Varagnat) et 1 à Montclar-sur-Gervanne (T. Deana)

Faucon émerillon: 4 individus seulement : 3 migrateurs le 31/3 avec un à Gervans (B. Delhome) et 2 à Pierre-Aiguille (R. Métais, B. Delhome, J. Lesage et C.H. Traversier), dernier observé le 13/4 à Lens-Lestang (B. Veillet)

Faucon hobereau : premier le 6/4 à Pierre-Aiguille, où 61 migrateurs seront notés jusqu'au 10/5; max de 12 le 18/4 (B. Delhome et L. Delaye). En chasse, rassemblements comptant jusqu'à 6 individus le 5/5 à Montclar-sur-Gervanne (F. Varagnat)

Gélinotte des bois : 2 données seulement, en provenance du Vercors (B. Labet, T. Cugnod)

Lagopède alpin : aucune donnée sur la période...

Perdrix bartavelle : 4 mâles et 2 femelles le 30/5 à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat).

Caille des blés : premières entendues le 27/4 à Granges-les-Beaumont (L. David), puis le 2/5 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (C. Tessier); peu de données, en provenance d'une dizaine de sites seulement, bien moins que l'an passé à la même période...

Poule d'eau : accouplement noté le 7/4 à Saint-Vallier (C. Comte), construction de nid le 15/4 à La-Roche-de-Glun (B. Delhome et L. Delaye), premiers poussins le 8/5 à Séderon (A. Delhomme)

Foulque macroule : construction de nid le 15/4 à La-Roche-de-Glun (B. Delhome et L. Delaye), premières couvaisons notées le 19/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), mais premier poussin le 21/5 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David) (tardif : le 13/4 l'an passé à Manthes).

Grue cendrée : très fort passage en mars, assez exceptionnel, totalisant plus de 3500 migrateurs, dont 2145 du 8 au 23/3 à Pierre-Aiguille; sur ce site près de 2000 rien que du 8 au 10/3 (R. Métais, J.C. Cordara, J. Lesage, L. David, C. Diers et al.). De grands groupes sont observés en différents points du département avec, par exemple, le 3/3 : 145 à Tulette (J.-N. Heron), 160 à Montélier (S. Blache); le 8/3 : 191 à Anneyron (F. Légglise), 190 à Montmeyran (J. Girard-Claudon), 200 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort); le 9/3, beau groupe de 450 à Rochegude (V. Lallia), et de 200 à Beauvallon (A. Charbonneau); le 10/3, groupe de 250 à Montchenu (A. Traversier), de 200 à Valence (G. Cochet), etc. Ce passage a même été remarqué dans les Baronnies, avec par exemple 107 le 12/3 à Saint-May (B. Lefevre); les deux dernières sont observées le 2/4 à Taulignan (S. Damian-Picollet)

(V. Lallia), commune sur laquelle des indices de reproduction possible / probable sont notés, tout comme à La Bâtie-Rolland (B. Misiak), Saint-Gervais-sur-Roubion (D. Arsac), Anneyron (F. Légglise), Chabeuil (C.H. Traversier), Pierrelatte (V. Fort), La Garde-Adhémar (V. Fort et J.-L. Bonis), Tulette (T. Deana et J.-N. Heron), Châteauneuf-sur-Isère et Saint-Marcel-lès-Valence (V. Chartendault)



Petit gravelot - photo: Vincent Palomares

Petit Gravelot : seulement deux données en mars : 1^{er} le 6/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Palomares) puis le 27/3 à Chantemerle-les-Blés (Anonyme); des troupes de migrateurs sont classiquement notées dans les labours en avril, avec 7 le 5/4 puis 11 le 25/4 à Tulette (J.-N. Heron). Noté nicheur probable sur Albon (V. Palomares, B. Delhome, F. Légglise), Granges-les-Beaumont (L. David), Grâne (J. Armand), Saulce-sur-Rhône (V. Fort), Chabrillan (M. Augustyniak) et Nyons (R. de Coster)

Pluvier doré : 4 données dont deux concernant des individus en halte : 5 le 3/3 à La Garde-Adhémar (S. Maury) et 1 le 16/3 à Ferrassières (J. Traversier); en migration active, 6 parmi des vanneaux le 10/3 à La Garde-Adhémar (V. Fort) et 2 le 13/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome)

Vanneau huppé : la reproduction d'un couple est découverte le 22/5 à Albon, avec un individu couvant dans un semis de céréales (V. Palomares); il s'agit de la première preuve certaine de nidification pour le département. Le reste des données concerne des migrateurs, plus nombreux en mars, notamment le 10/3 avec 190 en migration à La Garde-Adhémar et 145 en halte à Pierrelatte (V. Fort); les deux derniers sont notés le 17/4 à Romans-sur-Isère (L. David).

Bécasseau cocorli : belle série d'observations du 26/4 au 7/5 sur les vasières de la Basse-Isère en amont de la Vanelle (7 données et autant de dates) totalisant au moins 8 individus, avec un max de 5 du 26 au 29/4 (F. Lloret, R. Métais, L. David, B. Delhome)

Bécasseau variable : seulement 3 données pour deux individus : 1 le 16/3 à Châteauneuf-du-Rhône (C. Richerd) et 1 les 7-8/4 à Albon, en bordure d'un tas de fumier et dans les labours (V. Palomares)

Combattant varié : belle série d'observations du 18/4 au 3/5 sur la Basse-Isère, en amont de la Vanelle (17 données totalisant au moins 33 individus), avec un effectif record de 23 individus les 26-27/4 (F. Lloret, R. Métais, L. David); ailleurs, 2 le 1/5 à La Garde-Adhémar (J.-L. Bonis)

Bécassine des marais : à peine 10 données; dernière le 21/4 à Granges-les-Beaumont (F. Lloret)

Bécasse des bois : 9 données, aucune donnée en mai; dernière le 13/4 à Aubres (T. Deana); uniques données de coule en mars les 12 et 26/3 à Beaurières (F. Deroussen)...

Courlis corlieu : unique donnée d'un individu en vol nord le 7/4 à Albon (V. Palomares)

Courlis cendré : 18 migrateurs sont observés en mars à Pierre-Aiguille du 3 au 23/3, avec un max de 12 le 16/3 (B. Delhome, J. Lesage, J.C. Cordara); encore 2 migrateurs le 9/5 à Cléon-d'Andran (E. Boulenc). En avril - mai, deux couples cantonnés sont observés sur Chabeuil (A. Vemet, C.H. Traversier) et Albon (V. Palomares, B. Delhome); sur ce dernier site, un couveur y est repéré le 18/5 (V. Palomares), ce qui constitue la première preuve certaine de l'espèce dans le département

Chevalier arlequin : belle série d'observations du 21/4 au 30/4 sur les

Outarde canepetière - photo: Vincent Fort



Outarde canepetière : au moins une dizaine de mâles et deux femelles sur les secteurs favorables des plaines viticoles de Tulette, Suze-la-Rousse et Rochegude (J.-N. Heron, V. Fort et T. Deana); une population semble donc s'y maintenir, printemps après printemps!...

Echasse blanche : 5 données du 10 au 19/4 concernant des migrateurs en halte isolés avec 3-4 individus en Basse Isère (F. Lloret, L. David, R. Métais, B. Delhome et L. Delaye) et un le 13/4 au lac de Champos à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (F. Légglise)

Oedicnème criard : premier retour (tardif) signalé le 19/3 à Rochegude

chronique naturaliste - avifaune

vasières de la Basse-Isère en amont de La Vanelle (13 données totalisant une vingtaine d'individus) (F. Lloret, R. Métais, L. David, F. Ambrosini, A. Clavel), avec un effectif record de 17 individus le 22/4 (F. Lloret) ; uniques données

Chevalier gambette : seulement 2 données avec 2 le 7/3 au barrage de Bourg-lès-Valence (S. Maury) et 2 dans un champ inondé à Montéliar (S. Blache)

Chevalier aboyeur - photo : Vincent Palomares



Chevalier aboyeur : 62 données (17 l'an passé !) ; premier le 4/4 à Valence (V. Palomares) puis le 15/4 sur les vasières de la Basse-Isère en amont de la Vanelle (L. David) où le stationnement est observé jusqu'au 25/5 avec un maximum de 23 individus le 23/4 (F. Lloret), pour un total d'au moins 50 individus sur la période (L. David, F. Lloret, A. Clavel, R. Métais, F. Ambrosini, B. Delhome). Ailleurs : à Albon, 1 du 16 au 19/4 (V. Palomares, L. Delaye, F. Légliše), 2 le 29/4 et 1 le 20/5 (B. Delhome) ; 1 le 23/4 à Montéliar (J-L. Bonis), 1 sur le 24/4 à Comillon-sur-l'Oule (E. Blancard), 2 le 30/4 à Beauregard-Baret (B. Labet) et 1 le 1/5 à La Garde-Adhémar (J-L. Bonis)

Chevalier culblanc : 16 données en mars, puis 56 en avril mais seulement deux données en mai, à Granges-lès-Beaumont : 1 le 9 (A. Clavel) et max de 8 le 10/5 (B. Laval)

Chevalier sylvain : 43 données ; premier le 15/4 sur les vasières de la Basse-Isère en amont de La Vanelle (L. David) où des observations sont réalisées jusqu'au 3/5, date à laquelle 6 individus sont encore observés (L. Delaye) ; max de 19 sur la Basse-Isère le 28/4 (F. Lloret) et de 21 dans un pré inondé le 1/5 à La Garde-Adhémar (J-L. Bonis). Ailleurs, 1 le 16/4 à Pierrelatte (N. Bazin) ; à Albon : 1 les 23-25/4 (V. Palomares), puis 1 le 2/5 (F. Légliše)

Chevalier guignette : 125 données dont la moitié durant le pic de passage en dernière décade d'avril (36 données) et première de mai (31 données) ; max de 19 le 29/4 sur l'Isère en amont de Romans (F. Lloret), puis de 32 le 3/5 (L. Delaye) ; ailleurs, max. de 8 ce même jour à Albon (B. Delhome) et de 14 le 7/5 à Ger Evans (V. Palomares)

Mouette mélanocéphale : unique donnée concernant 2 adultes nuptiaux le 27/5 à Granges-lès-Beaumont (L. David) ; ces oiseaux peuvent correspondre à des nicheurs du littoral méditerranéen ayant échoué leur reproduction à cause des intempéries du printemps (afflux à cette période en Auvergne et Champagne, alors que certaines colonies du littoral languedocien étaient bien vides)...

Mouette rieuse : à Pierre-Aiguille, plus de 13600 migratrices avec un pic de passage en mars (13575 individus), en fin de première décade (9211 du 7 au 10/3) ; seulement 26 en avril et 10 en mai (R. Métais, B. Delhome, J-C. Cordara et al.). Dernière le 19/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Goéland cendré : deux données seulement concernant 4 migrateurs observés à Pierre-Aiguille : 2 le 3/3 et 2 le 8/3 (B. Delhome, L. David et R. Métais)

Goéland brun : à Pierre-Aiguille, plus de 600 migrateurs sont observés, 574 en mars, 26 en avril et 29 en mai ; max de 94 le 25/3 (C-H. Traversier). Dernier le 10/5 à Chabeuil (C-H. Traversier) (...)

Goéland pontique : encore 2 H1 le 6/3 à Bourg-lès-Valence (V. Palomares, examen CHR en cours)

Sterne caspienne : une migratrice en vol nord le 13/4 à Pierre-Aiguille (sous réserve d'homologation)

Sterne pierregarin : uniquement notée en mai (8 données) ; la majorité des données (7) concernent probablement des oiseaux nicheurs de la colonie de Saulce-sur-Rhône, pouvant potentiellement se déplacer assez loin pour pêcher (de Livron à Montélimar) ; au moins deux couveurs y sont repérés le 28/5 (V. Fort) ; ailleurs, les 8 premières sont notées en vol nord le 2/5 à Pierre-Aiguille (B. Delhome)

Guifette moustac : uniquement notée à quatre reprises entre le 23/4 et le 23/5 : 1 à Montélimar le 23/4 (J-L. Bonis) et 2 le 8/5 (C. Comte et J-C. Cordara), 2 à Pierre-Aiguille le 8/5 (R. Métais) et 3 à Loriol-sur-Drôme le 23/5 (J. Armand)

Guifette noire : notée à trois reprises et à l'unité début mai : le 1/5 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret), le 8/5 à Livron-sur-Drôme (V. Palomares) et le 10/5 à Granges-lès-Beaumont (B. Laval)

Guifette leucoptère : deux adultes nuptiaux sont observés en chasse au-dessus de l'Isère le 1/5 à Granges-lès-Beaumont (J-C. Cordara et F. Lloret, examen CHR en cours) ; cette observation exceptionnelle pour le département fait suite à un petit afflux printanier notamment bien ressenti sur le littoral du Languedoc-Roussillon et en Camargue

Pigeon colombin : les 3/4 des données sont de mars et correspondent pour parties à des migrants ; passage maximal en 2^e décade avec 25 le 11/3 et 21 le 19/3 à Pierre-Aiguille (J-C. Cordara, B. Laval, L. Félix et L. David). Noté nicheur possible ou probable à Saint-Marcel-lès-Valence (B. Delhome et L. Delaye), Châteauneuf-sur-Isère (L. David), Allan et Châteauneuf-du-Rhône (V. et M. Fort)

Pigeon ramier : le passage migratoire est davantage marqué en mars, particulièrement suivi à Pierre-Aiguille avec 3320 migrants au cours de ce mois ; première construction de nid notée le 9/4 à Montoisson (J. Girard-Claudon), premier nid occupé le 23/4 à Bourg-lès-Valence (L. David) et premiers jeunes au nid le 3/5 à Montélimar (A. Fougeroux)

Tourterelle des bois : la première est observée le 17/4 à Salettes (Anonyme), puis le lendemain à Granges-lès-Beaumont (L. David) et Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster)

Coucou gris : premier entendu le 22/3 à Peyrins (C. Comte)

Coucou geai : un adulte le 9/5 à Saint-May (G. Brouard, phot., sous réserve d'homologation)

Effraie des clochers : toujours aussi peu de données : 5 dont une de pelote datant potentiellement de l'hiver à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome)... Observations en provenance d'Anneyron (F. Légliše), Allan (J-L. Bonis) et Lens-Lestang (S. Fayon)

Petit-duc scops : premier très précoce le 12/3 à Rochefort-Samson (P. Vermot-Gauchy), d'autant que le suivant n'est entendu que le 8/4 à Die (G. David) puis le 9/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Grand-duc-d'Europe : 15 données seulement, aucune en mai... Cela doit être le signe d'une moindre prospection après 4 années de prospection atlas, ou d'un printemps pluvieux ! ...



Chevêchette d'Europe - photo : Thomas Cugnod

Chevêchette d'Europe : unique donnée le 23/3 à Saint-Agnan-en-Vercors (T. Cugnod)...

chronique naturaliste - avifaune

Chevêche d'Athéna : premières pontes (en nichoir) notées le 1/5 à Romans-sur-Isère (L. David)

Chouette hulotte : premiers jeunes hors du nid le 23/4 à Colonzelle où le mâle avait été observé en train de ravitailler la femelle qui couvait le 23/3 (S. Moreno)

Hibou moyen-duc : noté à 8 reprises. Couvaision notée 6/4 à Romans-sur-Isère, où un jeune est signalé le 18/4 (L. David et G. Trochard), ainsi que le 30/5 à Saint-Martin-en-Vercors (F. Arod)



Pipit rousseline - photo : Jean-Louis Bonis

Chouette de Tengmalm : aucune donnée après la bonne année 2012

Engoulevent d'Europe : noté uniquement à 11 reprises, dont les premiers le 2/5 à Lesches-en-Diois (F. Deroussen) et le 6/5 au Poët-Laval (T. Deana) ; durant les deux dernières décades de mai, les 7 données ne concernent que des oiseaux en vol et silencieux, signe d'un printemps pluvieux! ...

Martinet noir : trois données précoces en mars puis bien peu avant la mi-avril : deux à Pierre-Aiguille les 7 et 8/3 (R. Métais et B. Delhome) puis un le 23/3 à Beaumont-Montoux (B. Delhome). A Pierre-Aiguille, plus de 10000 migrateurs, dont 8300 en mai (du 1 au 12/5)

Martinet à ventre blanc : premier le 7/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais). Unique indice certain de reproduction à Tain-l'Hermitage avec les ravitaillements de 3 nids notés le 30/5 (V. Palomares)

Martin-pêcheur d'Europe : aucun indice probant de reproduction n'est signalé...

Guêpier d'Europe : premiers le 14/4 à Pont-de-l'Isère (R. Métais) ; première colonie de nouveau occupée le 6/5 à Loriol-sur-Drôme (V. Chartrandault)

Rollier d'Europe : retours notés le 25/4 à Tulette et Vinsobres (T. Deana). J.-N. Heron signale des manifestations nuptiales timides ce printemps, potentiellement en raison des mauvaises conditions météorologiques ; premières tentatives d'accouplement et offrandes le 20/5 à Tulette (J.-N. Heron)

Huppe fasciée : premières le 9/3 à Chamaloc (A. Pagano) et le 10/3 à Rochegude (V. Lallia) ; becquée notée le 18/5 à Chamaret (S. Moreno)

Torcol fourmilier : premier le 11/3 à Eurre (J. Armand) puis le 21/3 à Livron-sur-Drôme (E. Ruchon) ; un accouplement et la visite d'un nichoir est notée le 17/5 à Saint-Julien-en-Vercors (E. Le Moigne)

Pic vert : loges creusées ou occupées fin mars - début avril (G. David, S. Ceyte et B. Laval)

Pic noir : une seule donnée de loge occupée, le 13/4 à Chabrillan (J. Armand)

Pic épeiche : premiers jeunes nourris au nid notés le 19/5 à Montmeyran (J. Girard-Claudon)

Cochevis huppé : unique observation le 25/4 à Saint-Restitut (T. Deana)

Alouette lulu : accouplement noté le 2/4 à Salles-sous-Bois (S. Damian-Piccollet) ; premières becquées notées le 4/5 à Mévouillon (J. Traversier)

Hirondelle de rivage : premières le 4/3 à Donzère (J.-L. Bonis), le 10/3 à Donzère (V. Fort) puis le 17/3 à Erôme et le 24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares)... Peu de données avant le mois d'avril, où des oiseaux regagnent les colonies : le 3/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), le 15/4 à Albon (V. Palomares), le 23/4 à Châteauneuf-sur-Isère où plus de 250 individus sont présents le 7/5 (F. Lloret)

Hirondelle rustique : premières le 7/3 à Suze-la-Rousse (info J. Caron) puis le 8/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et R. Métais). Des nids sont occupés à Allex à partir du 10/4 (Anonyme)

Hirondelle de fenêtre : 2 premières le 8/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et R. Métais) ; nids visités le 11/4 à La Motte-Chalancon (E. Ruchon), construits à partir du 15/4 à Pont-de-Barret (G. Bernard)

Pipit rousseline : premier le 13/4 à Albon (V. Palomares) puis le 14/4 à Saint-May (B. Pont)

Pipit des arbres : première donnée le 25/3 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares), puis le 26/3 à Die (C. Lartigau) et le 31/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais, B. Delhome et J.-C. Cordara) ; des chanteurs sont notés essentiellement dans le massif du Vercors

Pipit farlouse : dernier migrateur noté le 14/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais)

Pipit à gorge rousse : 3 dans un champ le 9/4 à Montélièr (S. Blache, sous réserve d'homologation)

Pipit spioncelle : seulement 7 données dont 5 concernant des migrants en avril : 1 le 6, 9 et 13/4 à Albon (V. Palomares et F. Légise), 1 le 8/4 à Eurre (A. Vernet) et 1 le 21/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret). Nicheur possible à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat) et Treschen-Creyers (A. Vemet)



Bergeronnette printanière - photo : Vincent Palomares

Bergeronnette printanière : premières le 27/3 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais) et le 30/3 à Saint-May (A. Hargreaves) ; passage marqué en avril sur Albon, avec notamment 108 en vol nord le 10/4 ou encore 76 le 22/4 (V. Palomares). La première sous-espèce à passer semble être la ssp flava, avec un max de 74 posées le 13/4 à Albon, parmi elles, quelques cinereocapilla ou métisses sont repérées ; première thunbergi le 16/4 sur ce site avec un max de 11 le 24/5 (V. Palomares)

Bergeronnette flavéole (printa ssp flavissima) : 2 femelles le 18/4 à Albon (V. Palomares, examen CHR en cours)

Bergeronnette de Yarrell (grise ssp yarrellii) : 1 le 2/3 à Montélièr (S. Blache, sous réserve d'homologation) et 2 le 11/3 à Albon (V. Palomares, examen CHR en cours)

Accenteur alpin : uniques données (5 dates) concernant des migrants en halte à Pierre-Aiguille, du 29/3 (A. Ulmer et B. Daurat) au 28/4 (B. Delhome) avec un max de 3 le 31/3 (C.-H. Traversier)

Rougegorge familier : accouplement observé le 26/4 à Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupeuz) ; premières becquées le 13/5 à Bellegarde-en-Diois (J. Traversier)

Rosignol philomèle : premiers retours assez tardifs le 12/4 à Granges-les-Beaumont (L. David), Pontaix et Eurre (E. Gonzalez), assez généralisés les jours suivants

Rougequeue noir : première construction de nid notée le 6/4 à Romans-sur-Isère (M. Sequier), jeunes notés au nid à partir du 6/5 à Espenel (O. Arnaud), hors du nid le 11/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Rougequeue à front blanc : premier le 25/3 à Villeperdrix (J. Traversier), construction de nid notée le 25/4 (S. Ceyte) et 2/5 (V. Chartrandault) ; premières becquées le 22/5 à Barsac (E. Gonzalez)

Tarier des prés : premier relativement précoce le 26/3 à Gigors-et-

chronique naturaliste - avifaune

Lozeron (R. Métais) ; les deux suivants le 11/4 à Romans-sur-Isère (L. David). Plus de migrateurs tardifs qu'à l'accoutumée, sur des secteurs où l'espèce ne niche pas comme le 26/5 à Génissieux (F. Lloret) et le 27/5 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais) et Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat)

Tarier pâtre : premières becquées notées le 4/5 à Ferrassières et premiers jeunes hors du nid le 8/5 à Saint-May (J. Traversier)

Traquet motteux - photo: Vincent Palomares



Traquet motteux : premier le 5/4 à Chabeuil (C.H. Traversier) et à Montclars-sur-Gervanne (L. Vuinée) et déjà un maximum de 20 le 6/4 dans un labour de Châteauneuf-du-Rhône (A. Fougeroux) ; derniers migrateurs en halte vers la mi-mai. Sur les sites de reproduction, premiers chanteurs notés le 12/5 à Treschenu-Creyers (A. Vernet)

Monticole de roche : retours tardifs cette année, pas avant début-mai ; belle série de 6 données en première quinzaine de mai (1-12/5) dans le secteur de Saint-May et Rémuzat (M. Diraison, D. Robin, G. Brouard et A. Hargreaves) ; probablement plutôt des migrateurs en halte que des nicheurs locaux

Monticole bleu : observations classiquement réalisées dans le défilé de Donzère et les Baronnies, avec des nicheurs possibles ou probables sur les communes suivantes : Saint-May (P. Vernet, A. Guegnard, J. Traversier), Cumier (A. Hargreaves), Rémuzat (G. Brouard, D. Robin, J. Traversier), Beauvoisin (A. Calonec, J. Traversier), La Roche-sur-le-Buis (R. de Coster, B. Gravelat) et Châteauneuf du Rhône (F. Veau)

Merle à plastron : les huit premiers le 20/3 à Saint-Julien-en-Quint ; chants uniquement notés dans le Vercors, à partir du 5/5 à Treschenu-Creyers (G. David) où un accouplement est noté le 27/5 (C.H. Traversier)

Merle noir : constructions de nid notées à partir du 7/3 à Lens-Lestang (S. Fayon), premières couvaisons le 3/4 au Poët-Laval (B. Besson) ; premières becquées notées le 6/4 à Romans-sur-Isère (M. Sequier) et premier jeune hors du nid le 10/4 à Aouste-sur-Sye (F. Savasta)

Grive litorne : en plaine, dernières le 24/3 à Eurre (A. Vernet) ; ensuite, unique donnée en provenance de Saint-Agnan-en-Vercors avec 2 le 7/5 (B. Labet), dans un secteur où la reproduction reste à prouver et à suivre !...

Grive mauvis : seulement 8 données en mars ; dernière le 1/4 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat)

Locustelle tachetée : unique donnée du 24/4 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret)

Phragmite des joncs : unique donnée du 24/4 à Granges-lès-Beaumont (A. Clavel)

Rousserolle effarvate : première le 19/4 à Chavannes (B. Delhome) ; certains migrateurs chantant lors de leur halte migratoire sont notés loin de sites potentiellement favorables : 1 le 9/5 à Nyons (T. Deana), 2 le 19/5 à Tulette (J.N. Heron) et 1 le 27/5 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais)

Rousserolle verderolle : seule donnée de 2 chanteurs le 22/5 à Saint-Agnan-en-Vercors (F. Arod)

Rousserolle turdoïde : première le 25/4 à Châteauneuf-du-Rhône (J.L. Bonis) ; ailleurs, des chanteurs sont notés à Romans-sur-Isère, Granges-lès-Beaumont (F. Lloret, L. Delaye), ainsi qu'à Loriol et Livron-sur-Drôme (A. Vernet)

Hypolaïs polyglotte : première le 24/4 à Anneyron (V. Palomares) puis le 1/5 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault) ; assez peu de données (37 en mai)...

Fauvette à tête noire : premières becquées le 15/5 à Tulette (J.N. Heron)

Fauvette des jardins : seulement 4 données ; une migratrice en halte le 5/5 à Livron-sur-Drôme (A. Vernet), 1 le 10/5 à Treschenu-Creyers (G. Le Duc), 1 le 14/5 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) et 1 le 17/5 à Nyons (B. Gravelat)

Fauvette babillarde : unique donnée d'un chanteur le 5/5 à Treschenu-Creyers (G. David)

Fauvette orphée : premières le 23/4 à Saint-May (A. Hargreaves) puis le 25/4 à Lesches-en-Diois (F. Deroussen) ; ailleurs, des chanteurs sont notés sur Plaisians (A. Calonec), Le Poët-en-Percip (S. Corre), Montbrun-les-Bains (A. Delhomme), Beauvoisin (A. Calonec), Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (C. Tessier), Mévouillon et Ferrassières (J. Traversier)

Fauvette grisette : première le 9/4 à Crozes-Hermitage (B. Laval) puis le 15/4 à Eurre (A. Vernet)

Fauvette passerinette : première le 25/3 à Buis-les-Baronnies (A. Delhomme), suivante le 1/4 à Gervans (B. Delhome) ; construction de nid notée le 24/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome)

Pouillot de Bonelli : premiers le 26/3 à La Touche (N. Parrain), puis le 31/3 à Montauban-sur-Ouvèze (S. Boucheré) ; nid occupé par 3 jeunes le 31/5 à Beaufort-sur-Gervanne (F. Varagnat)

Pouillot siffleur : aucune donnée ce printemps alors que le passage semble avoir été plus sensible que d'habitude en Camargue et en Ardèche voisine...

Pouillot fitis : moins de 20 données... Premier migrateur pré-nuptial le 3/4 à Donzère (S. Damian-Picollet) et dernier le 14/5 à Saint-Paul-Romans (J.C. Cordara)

Gobemouche gris : 5 données du 15/4 au 5/5... Premiers (précoces) le 15/4 à La Roche-de-Glun (B. Delhome, L. Delaye) et le 22/4 à Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupe)

Gobemouche noir : bon passage pré-nuptial, halte marquée, peut-être à la faveur des mauvaises conditions climatiques : près de 50 données contre 4 l'an passé ! Premier le 12/4 à Saint-Marcel-lès-Valence (V. Chartendault), max de 4 le 21/4 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet) et le 3/5 à Montélimar (A. Fougeroux) ; dernier le 17/5 à La Motte-Chalancon (E. Ruchon)

Mésange à longue queue : première construction de nid notée le 21/3 à Pierre-Aiguille (L. David, C. Lartigau, S. Moreno) ; premiers jeunes notés hors du nid le 6/5 à Pierrelatte (T. Deana)

Mésange alpestre (boréale) : un chanteur est noté le 19/5 à Izon-la-Bruisse dans les Baronnies (D. Ariagno), en dehors de l'aire de répartition habituellement connue pour cette espèce. Les cinq autres données sont en provenance du Vercors.



Mésange huppée - photo: Cédric Mroczko

Mésange huppée : construction de nid uniquement notée le 11/5 à Treschenu-Creyers (Y. Blanchon)

Mésange noire : première construction de nid le 1/4 à Glandage (F. Bichon)

Mésange bleue : première construction de nid le 31/3 à Saint-Jean-en-

chronique naturaliste - avifaune

Royans (F. Arod) ; des jeunes sont notés hors du nid à partir du 3/5 à Montélimar (A. Fougeroux)

Mésange charbonnière : première construction de nid le 19/3 à Beaumont-lès-Valence (M. Goury), couvaisons à partir du 30/3 à Beauvallon (A. Charbonneau) ; premières becquées le 1/5 à Colonzelle où les premiers jeunes hors du nid sont notés le 13/5 (S. Moreno)

Tichodrome échelette - photo : Jean-Louis Bonis



Tichodrome échelette : 9 données concernant des migrateurs puisque toutes hors période et secteur de nidification ; dernière en date du 12/4 à Saint-Ferréol-Trente-Pas (T. Deana)

Grimpereau des bois : 6 données en provenance de Boulc (F. Varagnat), Saint-Agnan-en-Vercors (B. Labet, S. Talhoet), Valdrôme et La Bâtiedes-Fonds (F. Deroussen),

Grimpereau des jardins : première construction de nid notée le 23/3 à Colonzelle (S. Moreno) ; premières becquées le 26/5 à Reihanette (A. Delhomme) ; premiers jeunes hors du nid le 27/5 à Colonzelle (S. Moreno)

Rémiz penduline : seulement 3 données : au moins 14 sur deux sites le 24/3 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares) et des cris entendus le 23/4 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret)

Loriot d'Europe : premier le 16/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome, L. Delaye) puis le 24/4 à Châtillon-Saint-Jean (J-C. Cordara)

Pie-grièche écordeur : retours bien plus précoces que les deux années précédentes avec déjà 8 données en avril, dont le premier mâle le 19/4 à Chante-merle-les-Blés (V. Pierron) et la première femelle le 23/4 à Gigors-et-Lozeron (F. Varagnat) ; en mai, autant de données que l'an passé

Pie-grièche grise : 1 le 18/3 à Combovin (T. Deana)

Pie-grièche méridionale : sur la période, uniquement observée sur la commune de Ferrassières, dont la densité ici pourrait constituer l'un des plus gros noyaux de population de Provence (info J-M. Desprez, LPO PACA). Le 10/3, un couple est observé sur un nouveau site (A. Delhomme). Présence confirmée le 4/5. Le même jour, sur 8 points d'écoute dédiés à la recherche de l'espèce, au moins 7 territoires sont occupés, soit par des individus chanteurs, soit par des couples (J. Traversier) ! La phénologie de reproduction cette année semble plus tardive, puisque des pontes sont possibles dès mi-avril chez espèce. Encore un autre couple le 22/5 (A. Hargreaves). Les observations des années précédentes, ainsi que la présence de secteurs favorables non prospectés, laissent espérer 8 à 12 couples sur la commune.

Pie-grièche à tête rousse : belle série de données en mai (7) avec 5-6 individus différents : 1 le 9/5 à Rochegude (V. Lallia), 2 le 9/5 à Pierrelatte (T. Deana) puis 1 le 18/5 (V. Fort), 1 le 19/5 à Tulette (J-N. Heron) et 1 les 25-26/5 à Chabeuil (L. David)

Geai des chênes : première construction de nid notée le 7/4 à La Roche-sur-le-Buis (B. Gravelat) et première becquée le 5/5 à Bouc (F. Varagnat)

Pie bavarde : nid occupé le 30/3 à Mirabelaux-Baronnies (R. de Coster) ; premiers jeunes à peine volants le 24/5 à Bourg-lès-Valence (L. David)

Cassenois moucheté : 8 données dont 5 début mars en provenance de Dié (C. Lartigau) ; ensuite, 1 le 26/4 à Menglon (E. Laurent), 1 le 7/5 à Saint-Agnan-en-Vercors (B. Labet) et le 29/5 à Val-Maravel (F. Deroussen)



Chocard à bec jaune - photo : Gérard Grassi

Chocard à bec jaune : construction de nid notée le 11/5 à Omblyze (P. Lloret)

Corbeau freux : constructions de nid notées en mars ; premiers nids occupés le 15/4 à Montélimar (N. Parrain), un poussin tombé d'un nid le 30/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret)

Grand Corbeau : couvaison notée dès le 16/3 à Montguers (A. Delhomme)

Moineau soulcie : construction de nid notée le 4/5 à Ferrassières (J. Traversier), nid occupé le 29/5 à Beaufort-sur-Gervanne (R. Métais) ; ailleurs uniquement signalé nicheur possible / probable sur Gigors-et-Lozeron (R. Métais) et Sainte-Jalle (A. Hargreaves)

Niverolle alpine : 2 en migration le 30/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome et R. Métais) ; seule donnée

Pinson du Nord : 85 données, témoignant d'un meilleur hivernage que l'an passé (aucun en mars) ; rarement plus de 10 individus ensemble ; dernier le 3/4 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp)

Serin cini : premier jeune nourri hors du nid le 19/5 à La Motte-Chalancon (E. Ruchon)

Venturon montagnard : des données en plaine jusqu'à la mi-avril, avec par exemple 3 le 13/4 à Pierre-Aiguille où 2 migrateurs avaient déjà été notés en mars (B. Laval, B. Delhome, C-H. Traversier, L. David) ; construction de nid notée le 9/5 à Treschenu-Creyers (S. Talhoet)

Verdier d'Europe : becquées notées le 28/5 à Gigors-et-Lozeron (C-H. Traversier)

Chardonneret élégant : construction de nid le 1/5 à Gigors-et-Lozeron (F. Varagnat) ; des jeunes hors du nid sont notés dès le 19/5 à Crest (C-H. Traversier)

Tarin des aulnes : derniers le 10/4 à Montélimar (J-L. Bonis) et le 24/4 à Chabrillan (C. Carton) ; aucune donnée en montagne en avril-mai...

Bec-croisé des sapins : peu de preuves de reproduction (précoce en saison chez cette espèce) : unique donnée de 2 jeunes nourris au sol le 2/4 à Arnayon (J. Traversier)

Grosbec casse-noyaux : 134 données avec 112 en mars (autant qu'en février) et 22 en avril ; un passage sensible a succédé à un bon hivernage, avec des effectifs relativement faibles mais tout de même un beau groupe de 68 le 29/3, dans des chênes, à Châtillon-Saint-Jean (J-C. Cordara). Dernière donnée le 17/4 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), où 159 migrateurs ont été comptabilisés depuis début mars. Comme l'an passé, il semble qu'il n'y ait aucun nicheur en Drôme ce printemps ?

Bruant ortolan : premier le 13/4 à Albon (V. Palomares), premiers chanteurs le 18/4 à Rémuzat (J. Traversier) puis le 24/4 à Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares) ; la plupart des données proviennent de ces derniers secteurs, notamment des Baronnies

Bruant des roseaux : à peine 15 données ; moins de 3 individus en mars ; derniers le 1/4 à Granges-lès-Beaumont (R. Métais), le 2/4 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet) et le 9/4 à Eurre (A. Vemet)

Bruant proyer : 91 données (200 en 2012 et 41 en 2011 sur la même période) dont seulement 3 en mars, indiquant un retour des nicheurs drômois au cours du mois d'avril. ■

chronique naturaliste - herpétofaune

Tout d'abord, petit retour sur les observations de décembre 2012 à février 2013 (où il n'y avait pas eu de chronique herpétologique).

Le lézard des murailles est le seul reptile qui a été vu durant tout l'hiver (27 données) avec une augmentation des données à la fin février.

A noter : la découverte d'un lézard vert dérangé en hivernage, et celles d'une couleuvre verte et jaune et d'une coronelle girondine écrasées sur la route, probablement suite à des déplacements pour fuir le froid.

Pour les amphibiens, 16 données, principalement de salamandre tachetée et de crapaud commun.

A noter : les premiers chants de crapaud calamite le 19 février à Tulette.

Ce printemps, moins d'espèces de reptiles contactées et beaucoup moins de données ont été collectées que l'an dernier (423 contre 716 pour le printemps 2012), la météo ne motivant ni les reptiles, ni les naturalistes ! Par contre, baisse moins sensible pour les amphibiens : 558 contre 576 pour le printemps 2012. Loïc David

Amphibiens

Alyte accoucheur : 47 données et 1^{ers} chants entendus à Bourg-lès-Valence (L. David)

Sonneur à ventre jaune : 25 données : seulement 4 en avril, le reste en mai ; 1^{er} obs le 24 avril à Geyssans (M. Pansiot), toutes les autres données proviennent de la Motte Chalancon et de Die

Crapaud commun : 152 données

Crapaud calamite : 38 données, et les 1^{ers} obs. le 19 février à Tulette (J-N. Heron)

Rainette méridionale : 3 données en sud drome, le 27 mars à Pierrelatte (N. Bazin), et le 25 avril à Tulette (F. Begou) et Pierrelatte (T. Deana)

Pélobate cultripède : 5 données entre le 10 mars et le 30 avril à Suze la Rousse, avec un max de 7 (A. Ville et F. Begou)

Pélodyte ponctué : 22 données dont les 1^{ers} obs. le 23 mars à Rémuzat (F. Begou). Max de 50 le 15 avril à St Sauveur Gouvernet (F. Begou)

Grenouille taureau : 1^{er} donnée transmise sur faune-drome pour cette échappée de captivité, d'une vingtaine d'individus, le 11 avril à St Roman (O. Gallois)

Grenouille rieuse : 65 observations dont la 1^{er} le 10 mars à Anneyron (F. Légglise)

Grenouille agile : seulement 12 données dont la 1^{er} obs le 7 mars à Châteauneuf de Galaure (S. Favan)

Grenouille rousse : 30 données dont 20 en mars et 1^{er} obs. le 10 mars à Moras-en-Valloire (F. Légglise)

Triton alpestre : 9 données dont la 1^{er} obs. le 24 mars à Moras en Valloire (F. Légglise)

Triton palmé : 22 données dont la 1^{er} obs. le 9 mars à Upie (J. Cornut)

Triton crêté : 2 données avec 16 individus le 20 avril à Livron-sur-Drôme (F. Begou) et 11 individus le 25 avril à Grâne (J. Armand)

Salamandre tachetée : 49 données dont 8 écrasées ; max d'une cinquantaine de larves le 25 mai à Saoû (Y. Masse)

Reptiles

Tortue à tempes rouges : 9 données avec un max de 20 le 5 mai à Saulce-sur-Rhône (A. Vernet)

Orvet fragile : 2 données d'un individu le 29 avril et 4 mai sur 2 communes voisines du Sud Drôme, Mollans-sur-Ouvèze et Pierrelongue (B. Grzemeski)

Couleuvre d'Esculape : 4 données dont 1 écrasée, 1^{er} obs. le 18 avril à Crozes-Hermitage (L. Delaye et B. Delhome)

Coronelle lisse : unique donnée le 23 mai à Lus-la-Croix Haute (anonyme)

Coronelle girondine : 7 données dont 2 écrasées, 1^{er} obs. le 29 mars au Poët-Laval (B. Besson)

Couleuvre vipérine : 14 données dont 5 écrasées, 1^{er} obs le 14 avril à Montbrun-les-Bains avec 4 individus sur une petite mare (A. Delhomme)

Couleuvre de Montpellier : 2 données en sud Drôme, le 22 mai à Bouchet (J-N. Heron) et une écrasée le 26 mai à Vinsobres

(S. Moreno)

Couleuvre à collier : 10 données (aucune écrasée !) dont la 1^{er} le 2 avril à Treschenu-Creyers (O. Gallois)

Couleuvre verte et jaune : 26 données dont 3 écrasées, 1^{er} obs. le 10 avril à St-Paul-les-Romans (R. Métais, B. Delhome et L. Delaye)

Lézard vert occidental : 127 données et 1^{er} obs le 9 mars à Montchenu (A. Traversaz)

Lézard vivipare : 2 observations en zone montagnaise, le 8 mai à Omblèze (P. Lloret) et le 9 mai à Treschenu-Creyers (S. Talhoet)

Lézard des murailles : 182 données
Lézard ocellé : 3 données sur des sites connus, le 16 avril à Crozes-Hermitage (B. Delhome) et les 3 et 20 mai à Villeperdrix (C. Tessier et J. Traversier)



Vipère aspic - photo: Gopal Billy

Vipère aspic : 22 données dont 3 écrasées et 1^{er} obs. le 31 mars à Die (G. Billy).

Ayez le déclic : « J'observe, je clique ! »

Saisissez vos observations sur www.faune-drome.org !
850 observateurs inscrits pour un peu plus de 228 000 données naturalistes à ce jour

