

Fiche recherche

②

Le Blongios nain



Carte d'identité

Famille : Ardéidés
 Taille : 33 à 38 cm
 Poids : 100 à 150g
 Longévité : 5 ans
 Couleur : Noir et blanc chez l'adulte

empreinte



cri

Ixobrychus minutus




Le saviez-vous ?

En déclin en France, la population nicheuse de Blongios nain est située entre 500 et 1000 couples (INPN)
 L'espèce est considéré comme menacée par l'UICN

Plus petit héron d'Europe, Le Blongios nain n'est pas facile à observer en raison de sa discrétion et des milieux qu'il fréquente dans lesquels il se fond parfaitement. Après un hivernage au sud du Sahara, il revient en France à partir de la fin avril. La reproduction dure de mai à août. Le nid, constitué de roseaux, de brindilles et d'herbes, se situe en général au-dessus de l'eau dans les phragmitaies, mais on en trouve également dans les saules, les aubépines et dans les ronciers. Avec son long bec, il chasse les petits poissons, les amphibiens et les invertébrés aquatiques.

Période de présence :



Zoom sur... la roselière

Habitat typique du Blongios nain, la roselière est une zone humide en bordure de lacs, d'étangs ou de marais, où poussent principalement les **roseaux communs**, les **massettes**, les **baldingères** **faux-roseaux** et les **scirpes**. Cet écosystème riche abritant de nombreuses espèces (foulque macroule, héron pourpré, busard des roseaux...) est en **forte régression partout en France**.



Quoi ?

De petite taille, le Blongios nain est aussi gros qu'un pigeon.

♂ Calotte et dos noir, grande plage beige orangé très pâle sur les ailes, ventre et poitrine beige striée de brun orangé. Joues gris bleu, bec jaune à pointe noire.

♀ Même motif que le mâle mais beaucoup plus terne.


Les juvéniles sont assez semblables aux femelles adultes mais avec un dessous plus fortement rayé de noir et de jaune.

Quand ?


Avec un retour relativement tardif de ses quartiers d'hiver africains, il ne s'installe sur son lieu de nidification qu'au cours de la seconde quinzaine de mai, en Europe Centrale. Les individus repartent hiverner dès les mois d'août ou septembre.

Où ?

Le Blongios fréquente les roselières des plans d'eau (étangs, gravières) même de petites tailles, les stations d'épurations, les marais, les bordures de rivières, etc. Il apprécie les roselières où l'eau pénètre à l'intérieur. En Drôme, il faut le chercher sur les rivières (Drôme, Isère...) mais aussi le long du Rhône et surtout dans les nombreuses carrières et petits étangs avec présence de roselière.



www.faune-drome.fr



Comment ?

- Heure de prospection : De préférence très tôt le matin ou le soir
- Matériel à utiliser : Jumelles et repasse (**attention à ne pas abuser de cette méthode très intrusive**)
- Contraintes : Très discret, le chant rauque s'entend lorsque l'oiseau est proche
- Endroits à éviter : Eviter de prospecter les endroits privés ainsi que les roselières où l'eau n'est pas présente.
- Conseils : Se poser le long d'une berge et attendre un éventuel chant ou déplacement d'individu. Lorsqu'un couple est présent, l'activité est assez continue.

Carte de données des individus nicheurs de 2000 à 2019

J'observe, je clique!



Pour aider la LPO à protéger le Blongios nain, signalez la présence de l'espèce sur www.faune-drome.org ou via l'application Naturalist afin de compléter les connaissances sur la répartition de l'espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d'informations : remi.metais@lpo.fr

