

Fiche recherche

③

# Le Bruant fou

*Emberiza cia*



## Carte d'identité

Famille : Emberizidae  
 Taille : 15 à 17 cm  
 Poids : 25 à 29g  
 Envergure : 24 cm  
 Couleur : Plumage brun et gris

empreinte



chant


### Le saviez-vous ?

Il a été nommé ainsi par les oiseleurs, qui le capturaient très facilement et le jugeaient donc comme stupide.



Le Bruant fou est un oiseau discret, jamais abondant, et qui ne se signale souvent que par l'émission d'un cri aigu perceptible à faible distance. Une partie de la population est sédentaire, en dessous de 1 000 m d'altitude, notamment celle du sud de l'aire de répartition. Dès la mi-octobre des oiseaux en provenance de Suisse et d'Allemagne arrivent en France. En migration et en hivernage, en dessous de 600 m d'altitude, de petits dortoirs nocturnes de 10 à 20 individus se forment. L'espèce se regroupe alors dans de petites roselières au sein de ripisylves ouvertes.

### Période de présence :



Zoom sur



### Zoom sur l'état de la population

L'espèce ayant subi un déclin important entre 1970 et 1990, son statut de conservation est aujourd'hui défavorable en Europe. On dispose de peu d'indications sur la tendance évolutive des effectifs au cours des 20 dernières années, malgré tout, la tendance nationale est indiquée comme légèrement en hausse par l'ONG BIRDLIFE INTERNATIONAL.





## Quoi ?

♂ Tête contrastée grise cendrée avec des raies noires soulignées de blanc sur les côtés de la calotte, à travers l'œil et entourant la joue. Le ventre est de couleur brun-roux et les bords de la queue sont blancs.

♀ La femelle est semblable au mâle mais avec des teintes plus pâles et les parties grises moins « pures ». La tête est plus brunâtre avec des raies sombres moins nettes.


Les deux sexes sont souvent indiscernables sur le terrain

## Quand ?

L'espèce est présente toute l'année en Drôme. En automne, des familles se groupent et vagabondent dans les champs et les broussailles. En Hiver, les individus descendent en altitude pour rejoindre la plaine et éviter la neige.


## Où ?

Le Bruant fou affectionne les milieux secs et rocaillieux à végétation rase et bien exposés. Nicheur entre 400 et 1 800m, quoique rare au-dessus de 1 500 m, on le retrouve surtout dans les massifs chauds et secs du sud de la Drôme. Une attirance particulière pour les landes à Genêts purgatifs a été notée dans plusieurs régions. Il est à rechercher particulièrement dans les secteurs du Diois, dans les contreforts ou au sud du Vercors et dans les Baronnies.



Lande à Genêts purgatifs (*Cytisus oromediterraneus*)

www.faune-drome.fr



Carte de données des individus nicheurs de 2010 à 2019

## Comment ?

- Heure de prospection : Le matin (période active)
- Matériel à utiliser : Jumelles et repasse (**attention à ne pas abuser de cette méthode très intrusive**)
- Contraintes : Bonne connaissance du cri de contact car l'espèce est très discrète
- Endroits à éviter : Les milieux trop fermés et humides
- Conseil : Faire des points d'écoutes de 10-15 minutes permet de repérer plus facilement les individus et de les observer

## J'observe, je clique !



Pour aider la LPO à protéger le Bruant fou, signalez la présence de l'espèce sur [www.faune-drome.org](http://www.faune-drome.org) ou via l'application Naturalist afin de compléter les connaissances sur la répartition de l'espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d'informations : [remi.metais@lpo.fr](mailto:remi.metais@lpo.fr)

