

Fiche recherche

4

La pie-grièche écorcheur



Carte d'identité

Famille : Laniidea
 Taille : 16 à 18 cm
 Poids : 23 à 40 g
 Envergure : 24 à 27 cm
 Couleur : Ventre crème et dos brun

empreinte



chant




Lanius collurio

Le saviez-vous ?

Surnommé oiseau-boucher, il se constitue des garde-manger en emplant ses proies sur des épines ou des barbelés ! 

L'espèce niche dans une grande partie du paléarctique occidental, depuis le nord du Portugal, à travers toute l'Europe et vers l'est jusqu'en Sibérie. Voyageur nocturne, la pie grièche écorcheur regagne ses lieux d'hivernages, qui s'étendent de l'Afrique Tropicale à l'Afrique du Sud, à partir du mois de septembre . Le chant, gazouillis comprenant de nombreuses imitations et relativement peu audible, ne permet guère de repérer l'espèce. En revanche, les cris territoriaux du mâle, au printemps, sont très typiques et s'entendent de loin.

Période de présence :



Zoom sur

Zoom sur l'état de la population

La population a chuté de 50% au cours des trente dernières années en Europe. Les principales menaces sont la disparition de son habitat et des haies, l'usage d'insecticides, le reboisement. La modification et l'intensification des pratiques agricoles sont aussi des facteurs importants de sa disparition.



Quoi ?

→ Les femelles et les juvéniles sont difficiles à différencier

♂ Vivement coloré, il arbore un manteau brun roux, une tête grise cendrée, une queue noire bordée de blanc et un ventre d'une couleur rose pâle. Le « masque de bandit » noir est typique de la famille des Laniidés.

♀ Beaucoup plus terne, un peu couleur moineau avec un dessus plus ou moins brun-gris, parfois roussâtre. Son masque facial est moins net que chez le mâle et son dessous d'un blanc jaunâtre sale est fortement strié de noir.

Quand ?


Le départ des zones d'hivernage sub-sahariens a lieu entre mi-mars et mi-avril. Au printemps, les premiers oiseaux arrivent en France à la fin avril ou au début de mai. Les observations se raréfient progressivement à partir du mois de septembre.

Où ?

Les milieux les mieux pourvus en pies-grièches écorcheurs se caractérisent par la présence de prairies de fauche et/ou de pâtures extensives, parfois traversées par des haies, mais toujours plus ou moins ponctués de buissons, d'arbres isolés, d'arbustes épineux et de clôtures (barbelés). L'espèce est à rechercher particulièrement dans les secteurs de la Drôme des collines, de la plaine de Valence et de Montélimar.



Prairie de fauche clôturée, habitat typique de la pie-grièche écorcheur



www.faune-drome.fr

Comment ?

- Heure de prospection : matin ou soir, surtout avec la chaleur estivale
- Matériel : Une paire de jumelle et son guide ornitho pour identifier les jeunes ou les femelles
- Endroits à éviter : Zones sans haies/poteaux/arbustes et éviter les zones rases
- Conseils : rester vigilant par rapports aux autres espèces possibles comme la Pie-grièche à tête tousse et la Pie-grièche méridionale/grise qui fréquentent les mêmes milieux

Carte de données des individus nicheurs de 2015 à 2019

J'observe, je clique!

Pour aider la LPO à protéger la pie-grièche écorcheur, signalez la présence de l'espèce sur www.faune-drome.org ou via l'application Naturalist afin de compléter les connaissances sur la répartition de l'espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d'informations : remi.metais@lpo.fr

