

# Liste des espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale

(version mise à jour au 12 avril 2023)

Le CHN traite des espèces occasionnelles sur le territoire de la France métropolitaine. Les espèces inscrites sur cette liste ont une fréquence moyenne d'apparition inférieure à dix nouveaux individus vus par an en France au cours de la dernière décennie. Si cette moyenne est supérieure à dix mais que la médiane de leur fréquence annuelle est inférieure à cinq, elles restent également soumises à homologation nationale. Le CHN se penche sur le cas d'espèces rares à l'échelon national et non pas sur celui d'espèces difficiles à identifier dans la nature. C'est pourquoi le Courvite isabelle *Cursorius cursor* est inscrit sur la liste des espèces soumises à homologation en France, mais pas la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*.

La liste des espèces soumises à homologation nationale comprend donc l'ensemble des espèces et sous-espèces remplissant ce critère. Bien entendu, les observations se rapportant à des taxons non inscrits sur la Liste des Oiseaux de France sont également soumis à homologation nationale. Concernant les espèces susceptibles de s'être échappé de captivité, le CHN souhaite par ailleurs recevoir les descriptions de toutes les espèces inscrites en catégorie D de la Liste des oiseaux de France, et également d'une partie des espèces inscrites en catégorie E (c'est-à-dire celles pour lesquelles une origine naturelle est possible en France).

## 1°/ Espèces (catégories CAF-A et -B)

Les observations des espèces (et de toutes leurs sous-espèces) ci-dessous sont soumises à homologation nationale, de même que les observations d'espèces et de sous-espèces ne figurant pas sur la Liste des Oiseaux de France (LOF).

Bernache à cou roux ( <i>Branta ruficollis</i> )	Coulicou à bec jaune ( <i>Coccyzus americanus</i> )
Oie des neiges ( <i>Anser caerulescens</i> )	Coulicou à bec noir ( <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> )
Oie de taïga ( <i>Anser fabalis</i> ) AVEC PHOTOS	Syrhapte paradoxal ( <i>Syrhaptus paradoxus</i> )
Oie à bec court ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )	Tourterelle orientale ( <i>Streptopelia orientalis</i> )
Oie naine ( <i>Anser erythropus</i> )	Marouette de Caroline ( <i>Porzana carolina</i> )
Sarcelle élégante ( <i>Sibirionetta formosa</i> )	Foulque caronculée ( <i>Fulica cristata</i> )
Sarcelle à ailes bleues ( <i>Spatula discors</i> )	Talève d'Allen ( <i>Porphyrio alleni</i> )
Canard à front blanc ( <i>Mareca americana</i> )	Marouette de Baillon ( <i>Zapornia pusilla</i> )
Canard noir ( <i>Anas rubripes</i> )	Grue du Canada ( <i>Antigone canadensis</i> )
Sarcelle à ailes vertes ( <i>Anas carolinensis</i> )	Grue demoiselle ( <i>Grus virgo</i> )
Sarcelle marbrée ( <i>Marmaronetta angustirostris</i> )	Grèbe à bec bigarré ( <i>Podilymbus podiceps</i> )
Fuligule à tête noire ( <i>Aythya affinis</i> )	Flamant nain ( <i>Phoeniconaias minor</i> )
Eider de Steller ( <i>Polysticta stelleri</i> )	Vanneau sociable ( <i>Vanellus gregarius</i> )
Eider à tête grise ( <i>Somateria spectabilis</i> )	Vanneau à queue blanche ( <i>Vanellus leucurus</i> )
Macreuse à front blanc ( <i>Melanitta perspicillata</i> )	Pluvier fauve ( <i>Pluvialis fulva</i> )
Macreuse de Sibérie ( <i>Melanitta stejnegeri</i> )	Pluvier bronzé ( <i>Pluvialis dominica</i> )
Macreuse à bec jaune ( <i>Melanitta americana</i> )	Gravelot kildir ( <i>Charadrius vociferus</i> )
Garrot albéole ( <i>Bucephala albeola</i> )	Gravelot pâtre ( <i>Charadrius pecuarius</i> )
Érismature à tête blanche ( <i>Oxyura leucocephala</i> )	Gravelot mongol ( <i>Charadrius mongolus</i> )
Engoulevent d'Amérique ( <i>Chordeiles minor</i> )	Gravelot de Leschenault ( <i>Charadrius leschenaultii</i> )
Engoulevent à collier roux ( <i>Caprimulgus ruficollis</i> )	Gravelot asiatique ( <i>Charadrius asiaticus</i> )
Martinet ramoneur ( <i>Chaetura pelagica</i> )	Bartramie des champs ( <i>Bartramia longicauda</i> )
Martinet des maisons ( <i>Apus affinis</i> )	Courlis hudsonien ( <i>Numenius hudsonicus</i> )
Martinet cafre ( <i>Apus caffer</i> )	Courlis à bec grêle ( <i>Numenius tenuirostris</i> )
Outarde barbue ( <i>Otis tarda</i> )	Bécasseau à queue pointue ( <i>Calidris acuminata</i> )
Outarde de Macqueen ( <i>Chlamydotis macqueenii</i> )	Bécasseau à échasses ( <i>Calidris himantopus</i> )

Bécasseau à longs doigts (*Calidris subminuta*)  
Bécasseau à cou roux (*Calidris ruficollis*)  
Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*)  
Bécasseau minuscule (*Calidris minutilla*)  
Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*)  
Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)  
Bécasseau semipalmé (*Calidris pusilla*)  
Bécasseau d'Alaska (*Calidris mauri*)  
Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*)  
Bécassin à bec court (*Limnodromus griseus*)  
Bécasse d'Amérique (*Scolopax minor*)  
Bécassine double (*Gallinago media*)  
Bécassine de Wilson (*Gallinago delicata*)  
Chevalier bargette (*Xenus cinereus*)  
Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)  
Chevalier grivelé (*Actitis macularius*)  
Chevalier solitaire (*Tringa solitaria*)  
Chevalier de Sibérie (*Tringa brevipes*)  
Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*)  
Chevalier semipalmé (*Tringa semipalmata*)  
Chevalier criard (*Tringa melanoleuca*)  
Courvite isabelle (*Cursorius cursor*)  
Glaréole orientale (*Glareola maldivarum*)  
Glaréole à ailes noires (*Glareola nordmanni*)  
Mouette blanche (*Pagophila eburnea*)  
Mouette de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*)  
Mouette de Ross (*Rhodostethia rosea*)  
Mouette atricille (*Leucophaeus atricilla*)  
Mouette de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*)  
Goéland ichthyaète (*Ichthyaeus ichthyaeus*)  
Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*)  
Goéland dominicain (*Larus dominicanus*)  
Goéland de Kumlien (*Larus glaucooides kumlieni*)  
Goéland d'Amérique (*Larus smithsonianus*)  
Goéland de la Véga (*Larus vegae*)  
Sterne royale (*Thalasseus maximus*)  
Sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*)  
Sterne élégante (*Thalasseus elegans*)  
Sterne bridée (*Onychoprion anaethetus*)  
Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscatus*)  
Sterne de Forster (*Sterna forsteri*)  
Guillemot de Brünnich (*Uria lomvia*)  
Guillemot à miroir (*Cephus grylle*)  
Plongeon à bec blanc (*Gavia adamsii*)  
Océanite de Wilson (*Oceanites oceanicus*)  
Albatros à sourcils noirs (*Thalassarche melanophris*)  
Albatros à bec jaune (*Thalassarche chlororhynchos*)  
Océanite de Swinhoe (*Oceanodroma monorhis*)  
Puffin à bec grêle (*Ardenna tenuirostris*)  
Frégate superbe (*Fregata magnificens*)  
Fou masqué (*Sula dactylatra*)  
Fou à pieds rouges (*Sula sula*)  
Fou brun (*Sula leucogaster*)  
Cormoran pygmée (*Microcarbo pygmeus*)  
Cormoran à aigrettes (*Phalacrocorax auritus*)  
Blongios de Sturm (*Ixobrychus sturmi*)  
Héron vert (*Butorides virescens*)  
Grand Héron (*Ardea herodias*)  
Héron mélanocéphale (*Ardea melanocephala*)  
Aigrette des récifs (*Egretta gularis*)  
Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)  
Pélican frisé (*Pelecanus crispus*)  
Vautour de Rüppell (*Gyps rueppelli*)

Vautour oricou (*Torgos tracheliotus*)  
Aigle pomarin (*Clanga pomarina*)  
Aigle criard (*Clanga clanga*)  
Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*)  
Aigle ibérique (*Aquila adalberti*)  
Aigle impérial (*Aquila heliaca*)  
Busard d'Amérique (*Circus hudsonius*)  
Buse féroce (*Buteo rufinus*)  
Chouette épervière (*Surnia ulula*)  
Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*)  
Guêpier de Perse (*Merops persicus*)  
Faucon concolore (*Falco concolor*)  
Faucon lanier (*Falco biarmicus*)  
Faucon sacre (*Falco cherrug*)  
Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*)  
Pie-grièche brune (*Lanius cristatus*)  
Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*)  
Pie-grièche du Turkestan (*Lanius phoenicuroides*)  
Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*)  
Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*)  
Viréo à œil rouge (*Vireo olivaceus*)  
Choucas de Daourie (*Corvus dauuricus*)  
Mésange azurée (*Cyanistes cyanus*)  
Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura*)  
Alouette monticole (*Melanocorypha bimaculata*)  
Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*)  
Hirondelle paludicole (*Riparia paludicola*)  
Hirondelle à front blanc (*Petrochelidon pyrrhonota*)  
Pouillot oriental (*Phylloscopus orientalis*)  
Pouillot de Hume (*Phylloscopus humei*)  
Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*)  
Pouillot de Schwarz (*Phylloscopus schwarzi*)  
Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*)  
Pouillot de Temminck (*Phylloscopus coronatus*)  
Pouillot à pattes sombres (*Phylloscopus plumbeitarsus*)  
Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*)  
Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*)  
Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*)  
Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*)  
Hypolaïs bottée (*Iduna caligata*)  
Hypolaïs rama (*Iduna rama*)  
Hypolaïs pâle (*Iduna pallida*)  
Hypolaïs obscure (*Iduna opaca*)  
Locustelle fasciée (*Helopsaltes fasciolatus*)  
Locustelle de Pallas (*Helopsaltes certhiola*)  
Locustelle lancéolée (*Locustella lanceolata*)  
Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*)  
Fauvette épervière (*Curruca nisoria*)  
Fauvette naine (*Curruca nana*)  
Fauvette de l'Atlas (*Curruca deserticola*)  
Fauvette de Rüppell (*Curruca ruppelli*)  
Fauvette des Balkans (*Curruca cantillans*)  
Fauvette sarde (*Curruca sarda*) HORS CORSE  
Grive de Sibérie (*Geokichla sibirica*)  
Grive dorée (*Zoothera aurea*)  
Grive à joues grises (*Catharus minimus*)  
Grive à dos olive (*Catharus ustulatus*)  
Grive obscure (*Turdus obscurus*)  
Grive à gorge noire (*Turdus atrogularis*)  
Grive à gorge rousse (*Turdus ruficollis*)  
Grive de Naumann (*Turdus naumanni*)  
Grive à ailes rousses (*Turdus eunomus*)  
Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*)

Rossignol progré (*Luscinia luscinia*)  
Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*)  
Gobemouche à demi-collier (*Ficedula semitorquata*)  
Rougequeue de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)  
Tariet de Sibérie (*Saxicola maurus*)  
Traquet de Seebohm (*Oenanthe seebohmi*)  
Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)  
Traquet du désert (*Oenanthe deserti*)  
Traquet noir et blanc (*Oenanthe melanoleuca*)  
Traquet pie (*Oenanthe pleschanka*)  
Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*)  
Traquet kurde (*Oenanthe xanthopygma*)  
Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
Accenteur à gorge noire (*Prunella atrogularis*)  
Bergeronnette orientale (*Motacilla tschutschensis*)  
Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)  
Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*)  
Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*)  
Pipit de la Petchora (*Anthus gustavi*)  
Pipit farlousane (*Anthus rubescens*)  
Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)  
Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*)  
Roselin cramoiis (*Carpodacus erythrinus*)  
Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)  
Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*)  
Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)

Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)  
Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)  
Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)  
Bruant à sourcils jaunes (*Emberiza chrysophrys*)  
Bruant rustique (*Emberiza rustica*)  
Bruant auréole (*Emberiza aureola*)  
Bruant roux (*Emberiza rutila*)  
Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)  
Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)  
Bruant masqué (*Emberiza spodocephala*)  
Bruant à couronne blanche (*Zonotrichia leucophrys*)  
Bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*)  
Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)  
Oriole de Baltimore (*Icterus galbula*)  
Vacher à tête brune (*Molothrus ater*)  
Paruline couronnée (*Seiurus aurocapilla*)  
Paruline noir et blanc (*Mniotilta varia*)  
Paruline des ruisseaux (*Parkesia noveboracensis*)  
Paruline flamboyante (*Setophaga ruticilla*)  
Paruline à collier (*Setophaga americana*)  
Paruline à gorge orangée (*Setophaga fusca*)  
Paruline jaune (*Setophaga aestiva*)  
Paruline à flancs marron (*Setophaga pensylvanica*)  
Paruline rayée (*Setophaga striata*)  
Tangara écarlate (*Piranga olivacea*)  
Cardinal à poitrine rose (*Pheucticus ludovicianus*)

## Sous-espèces

Cette liste détaille les sous-espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale. Toutes appartiennent à des espèces par ailleurs régulières en France.

Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*)  
Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) OISEAUX BAGUES  
ET NES DANS DES COLONIES PURES SANS *L. fuscus intermedius*  
Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*) AVEC BIOMETRIE  
DISPONIBLE OU FORME ROUSSE (QUEUE NON BARREE) PHOTOGRAPHIEE  
Pic à dos blanc (*Dendrocopos leucotos leucotos*)  
Pie-grièche grise (*Lanius excubitor homeyeri*)  
Pie-grièche des steppes (*Lanius excubitor pallidirostris*)  
Fauvette babillarde de Sibérie (*Sylvia curruca blythi*) AVEC  
ANALYSES GENETIQUES  
Fauvette babillarde orientale (*Sylvia c. minula*/ *S. c.*  
*halimodendri*) AVEC ANALYSES GENETIQUES

Gorgebleue à miroir roux (*Luscinia svecica svecica*)  
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs gr.*  
*spodiogenys/africana/harterti*)  
Rossignol philomèle oriental (*Luscinia megarhynchos*  
*golzii*)  
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*)  
Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*  
*samamisicus*)  
Bergeronnette des Balkans (*Motacilla flava feldegg*)  
Bergeronnette grise du Maroc (*Motacilla alba*  
*subpersonata*)

## 2°/ Espèces de la catégorie CAF-D

Il s'agit d'espèces susceptibles d'être échappées de captivité ou dont l'arrivée a pu être aidée volontairement par l'Homme. Cette catégorie comprend des espèces pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir davantage d'éléments afin de les classer en A ou en E à terme. Aussi le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant ces espèces.

Canard à faucilles (*Anas falcata*)  
Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*)  
Harle couronné (*Lophodytes cucullatus*)  
Spatule d'Afrique (*Platalea alba*)  
Vanneau éperonné (*Vanellus spinosus*)

Buse de Swainson (*Buteo swainsoni*)  
Talève d'Afrique (*Porphyrio madagascariensis*)  
Talève à tête grise (*Porphyrio p. gr. poliocephalus*)  
Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
Carouge à tête jaune (*Xanthocephalus xanthocephalus*)

### 3°/ Espèces de la catégorie CAF-E

Il s'agit d'espèces vraisemblablement échappées de captivité ou dont l'arrivée en France n'est probablement pas naturelle. Toutefois, de nouvelles observations pourraient être à même de faire évoluer leur statut. Aussi, le CHN souhaite-t-il recevoir toutes descriptions concernant les espèces ci-dessous, ainsi que celles concernant les espèces manifestement échappées de captivité qui n'ont pas encore été signalées en France. A contrario, la CHN ne souhaite pas examiner les données concernant les autres espèces classées en catégorie E (en cas de doute, contacter le secrétariat du CHN).

Sarcelle cannelle ( <i>Anas cyanoptera</i> )	Corbeau familier ( <i>Corvus splendens</i> )
Fuligule à dos blanc ( <i>Aythya valisineria</i> )	Etourneau soyeux ( <i>Sturnus sericeus</i> )
Pluvier fluviatile ( <i>Pluvianus aegyptius</i> )	Calliope sibérienne ( <i>Luscinia calliope</i> )
Albatros hurleur ( <i>Diomedea exulans</i> )	Gobemouche narcisse ( <i>Ficedula narcissina</i> )
Damier du Cap ( <i>Daption capense</i> )	Astrild ondulé ( <i>Estrilda astrild</i> )
Pélican gris ( <i>Pelecanus rufescens</i> )	Tisserin gendarme ( <i>Ploceus cucullatus</i> )
Faucon de l'Amour ( <i>Falco amurensis</i> )	Roselin de Lichtenstein ( <i>Rhodopechys obsoleta</i> )
Faucon de Barbarie ( <i>Falco peregrinoides</i> )	Roselin pourpre ( <i>Carpodacus purpureus</i> )
Pie bleue ( <i>Cyanopica cyana</i> )	Bruant élégant ( <i>Emberiza elegans</i> )

### 4°/ Binômes / Trinômes et autres complexes d'espèces

Dans quelques cas particuliers de binômes et trinômes d'espèces difficiles à séparer *in natura*, le CHN souhaite recevoir des descriptions, y compris lorsqu'elles ne permettent pas une identification au niveau spécifique. Elles seront homologuées et figureront dans la base de données du CHN sous cette dénomination.

Océanite de Castro (*Oceanodroma castro*) / du Cap Vert (O. jabejabe) / de Monteiro (O. monteiroi)  
Fulmar géant (*Macronectes giganteus*) / F. de Hall (M. halli)  
Pétrel gongon (*Pterodroma feae*) / Pétrel des Desertas (P. deserta)  
Pétrel gongon (*Pterodroma feae*) / Pétrel des Desertas (P. deserta) / Pétrel de Madère (P. madeira)  
Puffin de Macaronésie (*Puffinus baroli*) / Puffin de Boyd (P. boydi)  
Frégate sp. (*Fregata* sp.)  
Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*) / Pie-grièche du Turkestan (L. phoenicuroides)  
Alouette piskolette (*Calandrella rufescens*) / Alouette du Turkestan (C. henei)

D'autres binômes d'espèces utilisés historiquement par le CHN ont été délaissés et ne sont plus utilisés :

Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) / Érismature rousse (O. jamaicensis)  
Pluvier fauve (*Pluvialis fluva*) / Pluvier bronzé (P. dominica)  
Bécassin à long bec (*Limnodromus griseus*) / Bécassin à bec court (L. scolopaceus)  
Sternes à becs oranges (*Thalasseus elegans* / T. bengalensis et hybrides éventuels)  
Sterne fuligineuse (*Onychoprion fuscata*) / Sterne bridée (O. anaethetus)  
Pélican sp. (*Pelecanus crispus* / P. onocrotalus / P. rufescens)  
Aigle criard (*Clanga clanga*) / Aigle pomarin (C. pomarina)  
Faucon sacre (*Falco cherrug*) / Faucon lanier (F. biarmicus)  
Marouette poussin (*Porzana parva*) / Marouette de Baillon (P. pusilla)

Enfin, l'hybridation naturelle observée dans l'aire de répartition de l'Aigle criard et de l'Aigle pomarin couplée aux conditions d'observations souvent difficiles pour ces deux espèces (distance, manque de luminosité et difficultés pour prendre des photos de qualité) a poussé le CHN à adopter deux catégories supplémentaires pour les individus dont l'appartenance spécifique n'est pas assurée avec une absolue certitude, mais aussi une catégorie pour les oiseaux de type hybride :

Aigle type pomarin (Clanga cf pomarina)  
Aigle type criard (Clanga cf clanga)

Aigle type hybride (*Clanga cf clanga x pomarina*)

## 5°/ Hybrides

Les cas d'hybridation sont fréquents au sein de certains ordres comme les ansériformes. Le CHN ne traite que des hybrides impliquant deux espèces soumises à homologation nationale (par exemple Aigle criard x Aigle pomarin). Ainsi les hybrides au sens large, y compris ceux incluant une espèce soumise à homologation dans leur parenté, ne sont pas examinés (exemple : Bergeronnettes printanières des formes '*xanthophrys*' et '*superciliaris*' ou Bruant à gorge blanche X Bruant jaune) à l'exception de l'hybride suivant :

Mésange de Pleske (*Cyanistes caeruleus x C. cyanus*)

## 6°/ Evolution de la liste au cours du temps :

L'amélioration des connaissances sur l'identification des espèces est l'une des causes de modification de la présente liste, à cela s'ajoute l'évolution des populations de certaines espèces, ainsi des ajouts et retraits d'espèces se sont produits :

### 1er janvier 2021 :

- Réintégration du Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*.

### 1er janvier 2020 :

- Ajout de la Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor*.

### 1er janvier 2018 :

- Retrait du Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* et du Bruant nain *Emberiza pusilla*.

### 1er janvier 2013 :

- Retrait du Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* de la sous-espèce nominale, du Busard pâle *Circus macrourus*, de la Buse pattue *Buteo lagopus*, de l'Etourneau roselin *Pastor roseus*, de la Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* de la sous-espèce *caudatus*.

### 1er janvier 2012 :

- Ajout de la Linotte à bec jaune *Linaria flavirostris*.

### 1er janvier 2010 :

- Retrait de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus*.

### 1er janvier 2006 :

- Ajout de l'Oie de taïga *Anser fabalis*.
- Retrait de la Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, du Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, du Faucon crécerellette *Falco naumanni*, du Faucon d'Eleonore *Falco eleonora*, de la Marouette poussin *Porzana parva*, de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio*, du Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, du Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, du Goéland railleur *Larus genei*, du Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, du Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, du Pipit de Richard *Anthus richardi*, du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, du Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita*, du Gobemouche nain *Ficedula parva* et de l'Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*.

### 1er janvier 2005 :

- Ajout du Traquet rieur *Oenanthe leucura*.
- Retrait de l'Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* et du Vautour moine *Aegypius monachus*.

### 1er janvier 1998 :

- Retrait de l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, du Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* et du Mergule nain *Alle alle*.

**1er janvier 1991 :**

- Retrait du Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*, du Goéland railleur *Chroicocephalus genei*, de l'Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, du Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*.

**1er janvier 1989 :**

- Ajout du Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*.
- Retrait de la Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota*.

**1er janvier 1988 :**

- Retrait de l'Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca*.

**1er janvier 1987 :**

- Ajout de l'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*.

**1er janvier 1986 :**

- Retrait de la Grande Aigrette *Ardea alba*.