



Synthèse ornithologique
du bassin de Saulx-Les-Chartreux :

**Les nicheurs, hivernants et migrants du printemps 2024 à
l'hiver 2024/2025**



coucher de soleil sur la grande prairie inondée © R.Panvert


Rédaction : Robin Panvert (mai 2025)

1. Contexte météorologique

On assiste à une année particulièrement pluvieuse et avec des températures assez chaudes. L'automne/ hiver 2024-2025 connaîtra plusieurs épisodes de crues, inondant la grande prairie durant 52 jours cumulés.

2. Modifications/ Entretien des milieux

La fauche habituelle annuelle s'est effectuée début septembre. Cette fauche de la grande prairie par rotation de 3 zones participe à la préservation d'un milieu ouvert riche pour la faune et la flore. La zone très dense de buissons vers le centre de l'île a été broyée en épargnant les arbres de grandes tailles.



3. Prospections

Les observations de cette synthèse sont tirées de données opportunistes dont les principaux observateurs sont Christophe Alexandre, Cédric Jouve, Bruno Lebrun, Yves Massin et Robin Panvert.

4. Résultats par espèces

Classées par grandes familles, seules les observations notables¹ sont mentionnées ici.

Phalacrocoracidae

Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Retour de la femelle hollandaise porteuse de sa bague rouge, durant l'hiver (à partir du 16 novembre). L'oiseau est désormais âgé de 6 ans et demi.

Ardeidae

Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)


Un groupe de 15 oiseaux vu en vol le 10 novembre

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Un rassemblement en dortoir de 7 oiseaux observé sur l'île le 13 septembre

Grande aigrette (*Casmerodius albus*)

7 oiseaux comptabilisés en même temps le 26 octobre sur la mare de la grande prairie



© R.Panvert

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

1 couple occupe une aire de reproduction en avril (couvaision) sur l'île mais aucun jeune ne semble être né



© R.Panvert

Ciconiidae

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

6 oiseaux trouvés en halte migratoire sur le site le 8 septembre



© R.Panvert

Threskiornithidae

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)

4 oiseaux en survol observés en fin de matinée le 03 mars

Podicipedidae

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

Présence de l'espèce durant toute l'année sans preuve de reproduction

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

Un couple couve des œufs début juin mais les poussins n'arriveront pas à terme

Accipitridae

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

1 jeune de l'année pas farouche le 23 août



© R.Panvert

¹ Espèce peu commune pour le site ou dont l'effectif ou le comportement sont remarquables

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

1 jeune de l'année est observé chasser sur l'île le 20 septembre.

Rallidae

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

Chant d'un male cantonné durant tout le mois de mai dans la grande prairie, sa reproduction est forte probable



© R.Panvert

Scolopacidae

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

Présence régulière durant l'hiver d'une dizaine d'oiseaux



© R.Panvert

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*)

Oiseau à l'unité contacté sur l'hiver

Motacillidae

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

103 oiseaux en dortoir le 14 novembre

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

Dortoir hivernal 2024-2025 peu fourni

Muscicapidae

Tarier pâtre (*Saxicola rubicola*)

3 à 4 couples nicheurs sur l'ensemble du site

Turdidae

Grive litorne (*Turdus pilaris*)

Création d'un dortoir d'une trentaine d'oiseaux sur l'ensemble du mois de février

Acrocephalidae

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

Probabilité de reproduction d'1 à 2 couple(s)

Présence de 8 oiseaux le 15 septembre (jeunes ?)

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Un nourrissage d'une nichée est découvert en juin dans la grande prairie. 1 à 2 couple(s) nicheur(s). Il s'agit de la troisième année consécutive de reproduction de l'espèce.

Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)

Effectif record de 15 oiseaux chanteurs le 23 mai sur l'ensemble du site

12 couples estimés reproducteurs



© R.Panvert

Locustellidae

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

4 à 5 couples nicheurs

Cettiidae

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)

10 males chanteurs cantonnés en période de reproduction (effectif x2 en 2 ans)

Laniidae

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

Observation d'un male durant le mois de mai avec un comportement d'installation : offrande d'une proie à une femelle le 23 mai. Les oiseaux ne seront ensuite plus revus.

Emberizidae

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

10 couples recensés

5. Liste des espèces recensées au cours de l'année

Du 1er mars 2024 au 1er mars 2025

Accenteur mouchet (NR)	Fuligule morillon (MR)	Phragmite des joncs (NR)
Aigrette garzette (MR)	Gallinule poule-d'eau (NR)	Pic épeiche (NR)
Alouette des champs (MR)	Geai des chênes (NO)	Pic épeichette (NR)
Bécassine des marais (HR)	Gobemouche noir (MO)	Pic noir (NO)
Bécassine sourde (HR)	Goéland leucopnée (HR)	Pic vert (NR)
Bergeronnette grise (NR)	Grand cormoran (HR)	Pie bavarde (NR)
Berg. printanière (MR)	Grande aigrette (MR)	Pie-grièche écorcheur (MO)
Berg. des ruisseaux (NR)	Grèbe castagneux (NP)	Pigeon biset domestique (MR)
Bernache du Canada (MR)	Grèbe huppé (NR)	Pigeon colombin (NR)
Bouscarle de Cetti (NR)	Grimpereau des jardins (NR)	Pigeon ramier (NR)
Bruant des roseaux (NR)	Grive draine (NO)	Pinson des arbres (MR)
Busard des roseaux (MO)	Grive litorne (HR)	Pipit des arbres (MR)
Buse variable (NP)	Grive mauvis (HR)	Pipit farlouse (HR)
Canard chipeau (MR)	Grive musicienne (NR)	Pipit spioncelle (HR)
Canard colvert (NR)	Grosbec casse-noyaux (MR)	Pouillot de Sibérie (MO)
Canard souchet (HR)	Guifette noire (MO)	Pouillot fitis (MR)
Chardonneret élégant (NP)	Héron cendré (NO)	Pouillot véloce (NR)
Chevalier aboyeur (MO)	Héron garde-bœufs (MO)	Râle d'eau (NO)
Chevalier culblanc (MR)	Héron pourpré (MO)	Rossignol philomèle (NR)
Chevalier guignette (MR)	Hirondelle de fenêtre (MR)	Rougegorge familier (NR)
Choucas des tours (NO)	Hirondelle de rivage (MR)	Rougequeue noir (MR)
Cigogne blanche (MO)	Hirondelle rustique (MR)	Rousserolle effarvatte (NR)
Cisticole des joncs (NP)	Hypolaïs polyglotte (NR)	Rousserolle verderolle (NR)
Corbeau freux (HR)	Linotte mélodieuse (NR)	Sarcelle d'été (MO)
Corneille noire (NR)	Locustelle tachetée (NR)	Sarcelle d'hiver (HR)
Coucou gris (NO)	Loriot d'Europe (MO)	Serin cini (NO)
Cygne tuberculé (NP)	Martin-pêcheur d'Europe (NP)	Sittelle torchepot (NO)
Epervier d'Europe (NP)	Martinet noir (MR)	Spatule blanche (MO)
Etourneau sansonnet (NR)	Merle noir (NR)	Sterne pierregarin (MR)
Faisan de Colchide (NR)	Mésange à longue queue (NR)	Tarier des prés (MR)
Faucon crécerelle (NR)	Mésange bleue (NR)	Tarier pâtre (NR)
Faucon hobereau (MR)	Mésange charbonnière (NR)	Tarin des aulnes (HR)
Fauvette à tête noire (NR)	Milan noir (MO)	Tourterelle des bois (NR)
Fauvette babillarde (MO)	Moineau domestique (NO)	Tourterelle turque (MR)
Fauvette des jardins (NR)	Mouette mélanocéphale (MR)	Troglodyte mignon (NR)
Fauvette grisette (NR)	Mouette rieuse (HR)	Vanneau huppé (MR)
Foulque macroule (NR)	Perruche à collier (NR)	Verdier d'Europe (NP)
Fuligule milouin (MR)	Perruche Alexandre (NP)	

Légende :

NR : Nicheur régulier

NP : Nicheur probable

NO : Nicheur occasionnel

MR : Migrateur régulier


MO : Migrateur occasionnel

HR : Hivernant régulier

HO : Hivernant occasionnel

6. Bilan de la saison 2024

Ce sont **113** espèces au total qui ont été recensées sur l'année.



Selon la moyenne annuelle régionale faite sur cinq ans (mise à jour récente déclassant plusieurs espèces) :

- 0 sont classées en « **très rares** » ou « **rares** »
- 26 sont classées en « **peu fréquentes** »
- les 87 restantes sont classées en « **communes** », « **très communes** » ou « **introduites, échappées** »

NB : « très rares » : ≤ 20 individus par an, « rares » : ≤ 200 individus par an, « peu fréquentes » : $\leq 2\,000$ individus par an et « communes » ou « très communes » : $\leq 200\,000$ individus par an

Il n'y a pas eu de nouvelles espèces contactées cette année.

Le total est toujours de **191** espèces recensées sur le bassin depuis 2000.

On retiendra certainement de cette saison :

- La poursuite de nidification pour la troisième année du Phragmite des joncs (considéré en danger à l'échelle régionale) confortant son statut de nicheur sur le site après une absence de 10 ans sur le bassin.
- La tentative de reproduction du Héron cendré. Malgré qu'il n'y ait pas eu de jeune arrivé à l'envol (intempéries en cause ?), ceci constitue une observation remarquable pour le site sachant que la dernière reproduction avérée remonte à 2015 (1 jeune volant en juin).

Merci aux observateurs pour leurs échanges naturalistes

et

merci au SIAHVY pour leurs échanges et leurs collaborations