


SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE ÎLE D'YEU



Volume 18
Année 2024

Rédaction :
*Marie-Paule HINDERMEYER &
Xavier HINDERMEYER*
Collaboration :
Valérie AURIAUX & Jean-Marc GUILPAIN

Photo de couverture : Fuligule à bec cerclé © *Jean-Marc GUILPAIN*

Référence bibliographique du document :

HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X., 2025 - Synthèse ornithologique - Ile d'Yeu.
Vol. 18, Année 2024, 67 p.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES FAITES SUR L'ÎLE D'YEU AU COURS DE L'ANNÉE 2024

AVRIL 2025

RÉDACTION

Marie-Paule & Xavier HINDERMEYER (xavier.hindermeyer@gmail.com)

COLLABORATION

Valérie AURIAUX & Jean-Marc GUILPAIN

LISTE DES OBSERVATEURS

Philippe AYRAL (P.Ay.), Marie-Françoise AMIGUES (M.-F.A.), Valérie AURIAUX (V.A.), Jean BAILLY (J.B.), Luc BARDIN (L.Bar.), Sébastien BATARD (S.Ba.), Patrick BERNÉ (P.B.), Yannick BESSONNET (Y.B.), Yanis BONNARDEL (Y.Bo.), Daniel CASTEIGTS (D.Ca.), Nicolas CELLIER (N.Ce.), Chantal CHAIGNEAU (C.Ch.), Luc CHAILLOT (L.Ch.), Alain CHARDON (Al.Ch.), Béatrice CHASLE (B.C.), Olivier CHEVILLON (O.C.), Sabrina CLÉMENT (S.Cl.), Stéphanie COURDESSES (St.Co.), Rose DELACROIX (R.D.), Sandrine DESMAREST (S.D.), Didier DESMOTS (D.D.), Chloé DEYNA (C.De.), Marie DOUARRE (M.Do.), Mathieu DUFRANNE (M.Du.), Louis DUPONT (L.Du.), Matthieu FAVEYRIAL (M.F.), Bérénice FOREST (B.F.), Maxim FOURRIER (M.Fo.), Steve GANTIER (S.Ga.), Matthieu GASTINOIS (M.G.), Alexis GAUTIER (A.Ga.), Sylvain GAYOT (Se.Ga.), Tobie GETTI (T.G.), Gaëlle GILET (G.G.), Martin GIRAULT (M.G.), Rémi GIROD (R.Gi.), Arnaud GONZALEZ (A.Go.), Laurence GOURDEL (L.G.), Sixtine GRAVIER (S.Gr.), Anne GROISARD (A.G.), Daniel GUBLER (D.Gu.), Alain-Gilbert GUÉGUEN (A.-G.G.), Quentin GUIBERT (Q.G.), Jean-Marc GUILPAIN (J.-M.G.), Clara HAUTBOUT (C.H.), Sébastien HEINERICH (S.H.), Alix HINDERMEYER (A.H.), Marie-Paule HINDERMEYER (M.-P.H.), Xavier HINDERMEYER (X.H.), Bertrand ISAAC (B.I.), Théophile ISAAC (T.I.), Jean JACQUEMONT (J.J.), Valère JACQUEMOUD (V.J.), Marie-Hélène JANDET (M.-H.J.), Bastien JEANNIN (B.J.), Malo KIPMAN (M.K.), Sylvie KOLP (S.K.), Franck LATRAUBE (F.L.), Jérôme de LINARES (J.D.L.), Hervé LUCAS (H.L.), Ewen MARTIN (E.Ma.), Adrien MARTINEAU (A.Ma.), Jonathan MARTINEZ (J.Ma.), Bernard MÉCHIN (B.M.), Justin MÉCHIN (J.M.), Sylvie MÉRAND (S.Me.), Nathan MOUTARDIER (N.Mo.), Adrien MUGUET (A.Mu.), Annie NOUVELOT (A.No.), Bertrand NOUVELOT (B.No.), Damien PAGÈS (D.P.), Lilian PAPIN (L.Pa.), Paolo PARSY (P.Pa.), Christian PATRIMONIO (C.Pa.), Olivier PENARD (O.Pe.), Benoît PERROTIN (B.P.), Jean-Baptiste PERROTIN (J.-B.P.), Nicolas PIETRENKO (N.P.), Maxime PIRIO (M.P.), Anne de PITRAY (A.D.P.), Frédéric PORTIER (F.P.), Marion RABOURDIN (M.Ra.), Alain ROCHETTE (A.Ro.), Sylvain ROUILLÉ (S.Ro.), Gérard SAGE (G.S.), Marie-Laure SCHOLLER (M.-L.S.), Louis SOURNIA (L.So.), Frantz STORCK (F.St.), Julien SUDRAUD (J.S.), Laëtitia VIBERT (L.V.), Jérémy VINCENT (J.V.), Antoine VRIGNAUD (A.Vr.) & Théophile YOU (T.Y.).

REMERCIEMENTS

Un grand merci, tout d'abord, à Valérie AURIAUX & Jean-Marc GUILPAIN qui assurent désormais le suivi des oiseaux de l'île au quotidien, ont fait une relecture critique de cette synthèse et le choix des photographies qui l'illustrent.

Merci, ensuite, à Bertrand ISAAC et au petit groupe d'ornithologues qui viennent passer tous les ans quelques jours sur l'île à l'automne (la semaine 40 !), en particulier cette année Luc CHAILLOT, Matthieu FAVEYRIAL, Maxime PIRIO, Alain TROFFIGUÉ et Laëtitia VIBERT.

Merci, enfin, à Frédéric PORTIER qui a initié, avec nous, ce suivi et cette synthèse ornithologique il y a déjà plus de vingt ans.

Nous tenons également, comme chaque année, à remercier Claude BUGEON pour les observations inédites et les précieuses informations qu'il nous a communiquées, la famille SAGE, Fernand VOISIN, Loïc DARRAS, Pascal DUPONT et Rémi GIROD qui nous ont autorisés à observer sur leur terrain et avec qui nous avons eu, comme toujours, des échanges très fructueux. Un grand merci aussi à Sandrine DESMAREST, Marie-Françoise AMIGUES, Jean JACQUEMONT et Didier SIMON, observateurs locaux particulièrement actifs et qui relaient aussi des observations réalisées par d'autres personnes.

Enfin, merci aux Islais et aux résidences secondaires qui, de plus en plus, nous font part de leurs observations ou les transmettent directement sur la base.

Toute notre gratitude va ensuite aux observateurs qui se sont succédés sur l'île au cours de l'année 2024 et qui nous ont transmis leurs données cette année, en particulier Luc BARDIN, Sébastien BATARD, Patrick BERNE, Nicolas CELLIER, Luc CHAILLOT, Olivier CHEVILLON, Stéphanie COURDESSES, Sandrine DESMAREST, Didier DESMOTS, Marie DOUARRE, Matthieu FAVEYRIAL, Maxim FOURRIER, Steve GANTIER, Alexis GAUTIER, Sylvain GAYOT, Tobie GETTI, Gaëlle GILET, Arnaud GONZALEZ, Laurence GOURDEL, Daniel GUBLER, Alain-Gilbert GUÉGUEN, Quentin GUIBERT, Sébastien HEINERICH, Bertrand ISAAC, Bastien JEANNIN, Malo KIPMAN, Sylvie KOLP, Franck LATRAUBE, Jérôme de LINARES, Adrien MARTINEAU, Jonathan MARTINEZ, Justin MÉCHIN, Sylvie MÉRAND, Annie & Bertrand NOUVELOT, Damien PAGÈS, Lilian PAPIN, Paolo PARSY, Olivier PENARD, Benoît PERROTIN, Nicolas PIETRENKO, Frédéric PORTIER, Marion RABOURDIN, Alain ROCHETTE, Sylvain ROUILLÉ, Louis SOURNIA, Frantz STORCK, Julien SUDRAUD, Jérémy VINCENT, Antoine VRIGNAUD & Théophane YOU.

Un très grand merci à ceux qui nous ont permis d'illustrer cette synthèse grâce à leurs photographies mises gracieusement à notre disposition.

Cette synthèse est la dix-huitième édition. Toutes vos remarques/observations pour l'améliorer dans les années qui viennent restent les bienvenues.

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2024

Encore une **très belle année ornithologique** pour l'île d'Yeu qui s'affirme, d'année en année, comme une destination ornithologique incontournable (Hindermeyer *et al.*, 2017).

Le printemps réserve encore son lot de surprises, comme par exemple ce Goéland d'Audouin *Ichthyæetus audouinii* posé sur la plage de la Tourette. Cette période s'avère de plus en plus intéressante pour observer sur l'île.

La bonne nouvelle de cette saison de reproduction est la nidification réussie, attendue depuis longtemps, d'au moins un couple de Cormoran huppé *Gulosus aristotelis* sur la côte sauvage. En revanche, la petite population reproductrice de Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* de l'île, seule de la région Pays de la Loire, est désormais éteinte (aucun jeune à l'envol cette année).

L'automne n'est pas en reste avec notamment l'observation de ces Fuligules à bec cerclé *Aythya collaris* puis la découverte d'une Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* sur la dune de la Grande Conche.


Enfin, à noter également cette année, des séances de sea-watch remarquables notamment pour les grands puffins (Puffin cendré/de Scopoli *Calonectris borealis/diomedea* et Puffin majeur *Ardenna gravis*) et la Mouette de Sabine *Xema sabini* avec des chiffres tout à fait exceptionnels pendant plusieurs semaines. Et pour la première fois, une petite sortie en mer en bateau (2 heures) au large de la pointe des Corbeaux a été organisée en septembre afin de mieux profiter du phénomène.

Le nombre de données collectées en 2024 (22 592) est stable (+0,03%) par rapport à 2023. Il s'agit du second chiffre annuel le plus élevé depuis le début du suivi. Le nombre d'espèces observées (204) est aussi en légère augmentation (+3,0%) par rapport à 2023 (Fig. 1).

L'essentiel de ces données a été saisi sur la base de données en ligne mise à disposition par la LPO Vendée depuis 2009 (www.faune-vendee.org) mais quelques données nous ont encore été transmises directement.

Le nombre total de données figurant dans notre base au 31 décembre 2024 était de 301 010.

Fig. 1 : Nombre annuel d'espèces et de données




Le nombre d'observateurs est en forte augmentation (+14,8%) avec un chiffre de 93 (en réalité beaucoup plus si nous comptons tous les membres des groupes qui ont fréquenté l'île). L'île d'Yeu continue d'attirer de nouveaux ornithologues et les Islais s'intéressent de plus en plus aux oiseaux.

Le nombre de jours d'observation est en diminution cette année avec un chiffre de 307 (-7,3%) par rapport à 2023. Cela signifie que pendant près de 80% des jours de l'année une personne a observé sur l'île d'Yeu et a transmis ses données.

Les observations sont toujours assez bien réparties sur l'année. Ainsi, elles sont faites tous les mois de l'année. Le mois d'octobre est, comme souvent, le plus riche en données (3 968) avec plus de 17% des données sur ce seul mois. Il est suivi de très près par septembre (3 698), puis avril (2 618), novembre (2 418) et août (2 334) qui en fournissent également un nombre important. Viennent ensuite les mois de janvier (1 437) et juillet (1 343). La répartition sur l'année de ces jours d'observation ainsi que le nombre de données collectées associées sont illustrés ci-dessous (Fig. 2).

Fig. 2 - Importance et répartition journalière des données en 2024



Les nouvelles espèces

L'année 2024 est, encore une fois, marquée par l'observation de trois nouvelles espèces. La liste islandaise (qui est disponible sur <https://www.faune-vendee.org/>) compte désormais 339 espèces (et quelques espèces échappées de captivité ou d'origine suspecte). Il sera maintenant de plus en plus difficile d'observer de nouvelles espèces sur l'île.

Il s'agit, tout d'abord, d'un Goéland d'Audouin *Ichthyæetus audouinii* observé le 23/04 sur la plage de la Tourette. Même si l'espèce était attendue sur l'île depuis plusieurs années, cette observation constitue une première pour l'île et seulement une quatrième mention pour la Vendée.

C'est ensuite l'observation de deux puis un Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* respectivement le 11/10 depuis la dune de la Grande Conche et les 12 et 13/10 sur la mare des Broches.

Enfin, une Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* est observée et enregistrée le 16/10 dans le petit bois derrière la plage de la Grande Conche.

Il faut également signaler l'observation exceptionnelle d'un Pipit farlousane *Anthus rubescens* le 23/10 depuis le phare des Corbeaux. L'oiseau a crié lorsqu'il a décollé, cri typique entendu par quelqu'un qui connaît très bien l'espèce. L'oiseau n'ayant pas été photographié, ni enregistré, cette donnée ne sera pas soumise au comité d'homologation national (CHN).

Les autres observations marquantes

Parmi les espèces et sous-espèces très rares sur l'île, on note cette année :

- une donnée d'Océanite de Wilson (*Oceanites oceanicus*), en août (2^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*), en août (3^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Fauvette passerinette (*Curruca iberiae*), en avril (4^{ème} mention pour l'île) ;
- trois données de Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*), en octobre et novembre (4 à 6^{ème} mentions pour l'île)
- deux données de Canard chipeau (*Mareca strepera*), en novembre (6 et 7^{ème} mentions pour l'île) ;
- deux données de Petit Gravelot (*Charadrius dubius*), en mars et juin (7 et 8^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée d'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*), en juin (8^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Sterne de Dougall (*Sterna dougallii*), en août (8^{ème} mention pour l'île) ;
- deux données de Grue cendrée (*Grus grus*), en octobre (8 et 9^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée de Chevalier sylvain (*Tringa glareola*), en avril (9^{ème} mention pour l'île) ;
- deux données d'Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*), en décembre (9 et 10^{ème} mentions pour l'île) ;
- cinq données de Fuligule milouin (*Aythya ferina*), en décembre (9 à 13^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée d'Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*), en avril (10^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*), en avril (10^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), en août (10^{ème} mention pour l'île).

LISTE SYSTÉMATIQUE

Dans la liste ci-dessous, chaque nom d'espèce est suivi de deux chiffres entre parenthèses. Le premier chiffre représente, pour l'espèce considérée, le nombre de données islaïses enregistrées dans la base de données jusqu'au 31 décembre 2024 (statistique obtenue sur un total de 301 010 données). Le deuxième chiffre représente le nombre de données du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024, soit 22 592 au total.

Les espèces **en rouge** suivies d'un astérisque (*) sont soumises à homologation nationale et celles **en bleu** suivies de deux astérisques (**) sont soumises à homologation départementale.

L'ordre systématique utilisé est celui de la dernière version de la Liste des Oiseaux de France (2020).

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa* (603/28)


L'espèce est observée en petit nombre presque toute l'année. Elle semble se maintenir sur l'île grâce aux lâchers d'oiseaux d'élevage. Pas d'indice de reproduction cette année.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus* (1933/182)

L'espèce est bien présente sur l'île où elle est observée toute l'année. Plusieurs preuves de nidification sont rapportées cette année notamment 1 femelle avec 3 poussins le 17/06 près des Petits Fradets (M.-P.H.), 1 femelle avec 3 poussins le 24/06 près du Grand Phare (M.-P.H.), 1 femelle et 4 poussins le 13/07 pointe de la Gournaise (M.-P. & X.H.) puis 1 femelle et 4 juvéniles le 28/07 sur la dune de la Grande Conche (J.M.). Comme pour la Perdrix rouge, des lâchers réguliers d'oiseaux d'élevage sont effectués pour la chasse.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (224/50)

La sous-espèce type *Branta bernicla bernicla*, de plus en plus régulière sur l'île en petit nombre, est observée cette année de janvier à mars - encore 7 individus le 02/03 plage de la Tourette (V.A. & J.-M.G.) - puis en septembre et de novembre à décembre. Comme l'année dernière, il ne s'agit pas, le plus souvent, d'oiseaux qui passent en vol mais bien d'oiseaux (jusqu'à une dizaine) qui stationnent sur les plages de la côte nord de l'île - maximum 10 individus dénombrés le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Pour la première fois l'hivernage de quelques individus sur les plages de la côte nord est confirmé avec au moins 7 individus (3 adultes et 4 1^{ère} année), déjà présents en novembre et décembre 2023, observés de janvier à mars. Après quelques oiseaux de passage - par exemple 18 individus en vol depuis la Galiote le 01/11 (J.D.L.), on note le retour de quelques oiseaux hivernants en novembre et décembre - par exemple 3 individus (adultes) le 15/12 sur la plage de la Tourette (M.-P. & X.H.).



OIE CENDRÉE *Anser anser* (77/5)

Assez peu d'observations de nouveau cette année. Au printemps, plus de 40 individus sont notés en vol au-dessus des Nates le 22/03 (R.Gi.). À l'automne, 2 individus sont observés en vol depuis la mare des Broches le 12/10 (M.-P. & X.H.), 7 individus au-dessus de l'aérodrome (M.-P. & X.H.) puis de la plage de Ker Daniau (A.Ro.) le 08/11 et 2 individus depuis la pointe du But le 11/11 (V.A. & J.-M.G.).

CYGNE TUBERCULÉ *Cygnus olor* (13/1)

Une nouvelle observation de Cygne tuberculé pour l'île avec 13 individus en vol depuis la dune de la Grande Conche le 25/05 (M.-P. & X.H.). Il s'agit du plus grand groupe jamais observé. L'espèce semble devenir de plus en plus régulière.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna* (1719/139)

L'espèce est observée de janvier à juillet sur l'île où elle se reproduit, puis en août et novembre. Les véritables arrivées ont lieu en mars et avril avec par exemple plus de 45 individus le 17/03 (M.-P. & X.H.) et 29 individus le 13/04 (X.H.) sur l'aérodrome. L'essentiel des couples reproducteurs est classiquement noté entre Port-Joinville et la pointe du But et sur la côte sauvage mais sans décompte précis. Plusieurs indices certains de nidification sur l'île cette année : 1 couple avec 1 poussin dans la carrière le 01/06 (V.A. & J.-M.G.) et 1 adulte avec 11 poussins près du Caillou Blanc le 09/06 (S.D.). Enfin, en dehors de la période de reproduction 1 individu est observé pointe de la Père le 25/08 (J.M.) et 1 individu dans la mare des Broches le 20/11 (V.A. & J.-M.G.).

**CANARD SOUCHET *Spatula clypeata* (52/7)**

Le Canard souchet est observé cette année aux deux passages et en hiver. Lors du passage prénuptial, 4 individus (3 mâles et 1 femelle) sont observés posés du 11 au 14/02 au Marais Salé (V.A. & J.-M.G.) puis 21 individus sont notés en vol depuis le phare des Corbeaux le 06/03 (B.I.). Lors du passage postnuptial, 17 individus sont notés depuis les Chiens Perrins (L.V. & M.P.) et plus de 80 individus depuis le phare des Corbeaux (M.F., J.V. & X.H.) le 29/09 puis un mâle depuis le phare des Corbeaux le 02/11 (M.-P. & X.H.). Enfin, en hiver un mâle est observé posé au Marais Salé le 30/12 (M.-P. & X.H.).



CANARD CHIPEAU *Mareca strepera* (5/2)

Deux nouvelles données de Canard chipeau sur l'île avec 1 mâle observé les 09 et 10/11 au Marais Salé (M.-P. & X.H.). L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 6 et 7^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celles de 2 mâles en vol et posés plage de Ker Châlon le 29/12/1996 (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'un mâle posé plage des Sapins le 20/03/2004 (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'une femelle en vol pointe des Corbeaux le 02/03/2013 (M.-P., A. & X. Hindermeyer), celle d'un mâle en vol au dessus de la pointe de la Gournaise le 04/01/2017 (X. Hindermeyer, D. Couzin & C. Nordez) et celle d'un couple posé au Marais Salé le 31/01/2022 (V. Auriaux & J.-M. Guilpain).

CANARD SIFFLEUR *Mareca penelope* (59/3)

L'espèce est peu observée cette année et uniquement lors du passage postnuptial et en hiver. A l'automne, 4 individus de 1^{ère} année sont notés en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). En hiver, 1 mâle de 1^{ère} année est découvert le 28/12 posé dans les marais de la Guerche et est retrouvé le 29/12 au Marais Salé (M.-P. & X.H.).

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos* (1007/168)

Comme les années précédentes, l'espèce est désormais observée toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Il est difficile de connaître exactement le nombre de couples nicheurs mais on peut estimer que près de 10 couples se sont reproduits cette année, principalement dans les marais de la Guerche, de la Croix et au Marais Salé. L'espèce doit également se reproduire dans d'autres sites (cours d'eau, petites mares, etc.) au centre et sur les côtes de l'île. Les premiers poussins sont notés début avril avec 1 femelle et 12 poussins dans les marais de la Croix le 03/04 (V.A. & J.-M.G.). Un petit passage est noté à l'automne avec par exemple 29 individus au passage pointe du But le 14/10 (M.-P.H. & O.Pe.).

CANARD PILET *Anas acuta* (52/8)

Le Canard pilet n'est observé cette année que lors du passage postnuptial et en hiver. A l'automne, plusieurs groupes sont notés avec par exemple plus de 20 individus le 29/09 depuis le phare des Corbeaux (M.F., J.V. & X.H.), 30 individus le 11/10 (M.-P. & X.H., S.Ro.) et 44 individus le 16/10 (V.A. & J.-M.G.) depuis la pointe des Corbeaux et plus de 20 individus le 27/10 depuis la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H., J.-M.G.). En hiver une femelle est observée posée en mer devant la plage de la Tourette le 29/12 (M.-P. & X.H.) et un cadavre de femelle (la même ?) est découvert le 31/12 sur la plage des Sapins (A.Vr. & B.J.).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (71/3)

Après une année blanche, retour de l'espèce sur l'île aux deux passages. Au printemps, 1 mâle et 1 femelle sont découverts le 13/03 au Marais Salé (M.-P.H.) et encore 1 femelle au même endroit le 16/03 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.). A l'automne, 1 seul individu en vol devant la plage de la Grande Conche le 01/09 (J.-M.G. & X.H.).


FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina* (8/5)

Belle série d'observations en fin d'hiver : 1 femelle est observée les 28 et 29/12 au Marais Salé (M.-P. & X.H.) puis 4 mâles dans les marais de la Guerche et 1 mâle (un des oiseaux du marais de la Guerche ?) au Marais Salé le 30/12 (M.-P. & X.H.) et, enfin, 2 mâles au Marais Salé le 31/12 (M.-P. & X.H.). Le Fuligule milouin reste rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 9 à 13^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celle d'un mâle posé le 08/02/2006 dans les marais de la Guerche (X. Hindermeyer), d'un autre posé sur la mare des Broches le 08/01/2013 (A. Mousnier fide S. Desmarest), d'une femelle posée pointe Gauthier le 31/12/2018 (N. Biron), revue pointe des Corbeaux le 01/01/2019 (M.-P. & X. Hindermeyer) et de 1 à 3 individus (2 mâles, 1 femelle) au Marais Salé du 01 au 04/02/2022 (V. Auriaux & J.-M. Guilpain).

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (0/3)**

La belle surprise de l'automne avec l'observation de 2 mâles en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 11/10 (J.-M.G.). Les oiseaux, recherchés dans les marais de l'île ne sont pas retrouvés dans la journée. Toutefois, un des deux mâles est retrouvé posé en début de matinée (8h20-9h50) sur la mare des Broches le 12/10 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G., S.D. & S.Ro.) mais également en début de matinée le 13/10 (M.-P. & X.H.). Il s'agit des premières mentions de Fuligule à bec cerclé sur l'île. Ces données ont été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85).

**EIDER À DUVET *Somateria mollissima* (15/2)**

Deux nouvelles observations d'Eider à duvet dans les eaux de l'île : 1 jeune oiseau est noté en vol le 11/06 depuis le Trou d'Enfer (M.-P.H.) et 2 individus (1 mâle et 1 type femelle) le 14/12 depuis la plage des Iliaux (J.-M.G.). L'augmentation du nombre d'observations est sans doute à mettre en relation avec l'explosion du nombre de couples nicheurs sur l'île Dumet en Loire-Atlantique. Elle devrait donc se poursuivre dans les années qui viennent.



MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (512/39)

L'espèce est assez commune dans les eaux de l'île. Elle y est observée cette année en janvier, de mars à mai puis de juillet à décembre. La majorité des observations est faite depuis les deux pointes de l'île. Il s'agit le plus souvent d'oiseaux en vol - par exemple plus de 40 individus le 24/05 (M.-P. & X.H.) et 70 individus le 29/09 (M.Du.) depuis la pointe des Corbeaux et 29 individus depuis la pointe du But le 29/09 (L.V. & M.P.). Pas d'hivernage important d'oiseaux noté entre la pointe des Corbeaux et le continent.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (195/2)

Le Harle huppé n'est observé qu'à deux reprises cette année : 1 femelle posée plage de Ker Châlon le 08/11 (M.-P. & X.H.) et 1 femelle (la même ?) plage de la Pipe le 30/11 (J.-M.G.). L'espèce est devenue beaucoup plus rare dans les eaux de l'île.



ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus* (49/1)

Après une année 2023 tout à fait exceptionnelle pour cette espèce jusque là très rare sur l'île, une seule observation cette année : 2 individus près du Trou d'Enfer le 05/06, simultanément 1 individu en vol au-dessus de la lande côtière et 1 autre entendu dans le bois de cyprès un peu en retrait (V.A. & J.-M.G.). Il faudra donc suivre encore l'espèce dans les années qui viennent pour voir si l'Engoulevent d'Europe se réinstalle sur l'île.

MARTINET NOIR *Apus apus* (2017/164)

L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée du 14/04 - 1 individu au-dessus des marais de la Guerche (X.H.) - au 06/09 - 2 individus au-dessus de la mare des Broches (V.A. & J.-M.G.). Un petit passage est perceptible au printemps avec par exemple plus de 62 individus dans les marais de la Guerche le 20/05 (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.). L'espèce doit toujours faire face à la disparition de son principal site de reproduction (le bâtiment municipal près de l'école des pêches) détruit en 2019 mais on compte tout de même quelques indices de reproduction autour de Port-Joinville. La pose de nichoirs sur la façade de l'ancienne usine n'a pas encore permis l'installation de quelques couples. Enfin, on note un

petit passage en juillet avec par exemple plus de 65 individus en migration active depuis la pointe du But le 14/07 (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.). Les observations deviennent beaucoup plus rares à partir de début août.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus* (1185/84)

L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée à partir d'avril - premier individu le 04/04 posé près de l'aérodrome (M.-P.H.) - jusqu'en juin - 1 individu près de la Pierre des Amporelles le 14/06 (S.Ro.). Le maximum de contacts auditifs et visuels a lieu à partir du 15 avril et en mai. Aucune observation n'est faite à l'automne.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas* (303/17)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 4 individus sont notés en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 10/04 (V.A. & J.-M.G.). À l'automne, le passage débute le 01/10 avec 1 individu au-dessus de la plage de la Grande Conche (B.I.) et s'achève le 10/11 avec 2 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Ces observations ne concernent à chaque fois moins de 10 oiseaux excepté 10 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 27/10 (M.-P. & X.H., J.-M.G.). Pas d'observation en hiver.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus* (3968/332)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Le nombre d'oiseaux nicheurs semble en nette augmentation. Pas de passage marqué à l'automne. En hiver les marais de la Guerche accueillent un nombre important d'oiseaux depuis qu'ils ne sont plus chassés - par exemple plus de 90 individus le 08/01 (M.-P.H.) et plus de 120 individus le 15/12 (V.A. & J.-M.G.).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur* (928/54)

L'espèce, nicheuse de plus en plus rare sur l'île, est observée d'avril - 4 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) et 4 individus à la Bergerie (J.M.) le 21/04 - à octobre - 1 individu de 1^{ère} année tardif impasse de la Borgne à Port-Joinville le 06/10 (M.-P. & X.H.). Pas d'indice certain de nidification cette année même si l'espèce s'est très probablement reproduite près de la pointe du But. Le passage prénuptial, très peu marqué, a lieu en mai avec par exemple plus de 20 individus au passage au-dessus de la pointe des Corbeaux le 09/05 (J.M.). Le passage postnuptial est quasi-inexistant avec seulement quelques oiseaux isolés en août et septembre.



TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto* (2521/113)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Pas de passage net ni au printemps, ni à l'automne. Pas de rassemblement important d'oiseaux à l'automne.

RÂLE D'EAU *Rallus aquaticus* (825/93)

Le nombre de données de Râle d'eau est en nette augmentation cette année. L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit de manière certaine au moins dans les marais de la Croix (peut-être également dans les marais de l'Ilia et de la Gorelle). En dehors de ce site, de nombreuses observations sont faites, le plus souvent à l'automne et en hiver, dans les marais de la Guerche - 3 individus le 07/09 (M.-P. & X.H.), plus de 3 individus le 11/10 (M.-P. & X.H.) et plus de 3 individus le 15/12 (M.-P. & X.H.) - annonçant peut-être une reproduction future. Enfin, des oiseaux de passage sont notés dans des milieux beaucoup moins humides comme le terrain d'aéromodélisme, la dune de la Grande Conche ou la cueillette du Champ Rouit - 1 individu le 26/10 (M.-P. & X.H.).

GALLINULE POULE-D'EAU *Gallinula chloropus* (2219/221)

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit notamment dans les marais de la Croix, de l'Ilia, de la Guerche, au Marais Salé et dans la carrière. Le maximum d'oiseaux (faible) est noté en hiver au Marais Salé avec seulement plus de 16 individus le 05/01 (M.-P. & X.H.).

FOULQUE MACROULE *Fulica atra* (32/4)

Après trois années blanches, l'espèce est de nouveau contactée sur l'île cette année : 1 individu est découvert le 15/11 posé dans les marais de la Guerche (M.-P.H.). Discrète, elle y sera revue jusqu'au 19/11 au moins (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.). L'espèce reste peu commune sur l'île.

**GRUE CENDRÉE *Grus grus* (7/2)**

Deux nouvelles données de Grue cendrée sur l'île d'Yeu : plus de 15 individus le 04/10 (R.Gi.) et 2 individus le 18/10 (L.G. & O.C., S.Ga.) en vol au-dessus de plage des Ovaires. L'espèce reste rare sur l'île mais ce manque de données masque sans doute une réalité un peu différente.

Il s'agit seulement des 8 et 9^{ème} mentions connues de l'espèce sur l'île après celle d'un immature en vol depuis la plage du Cours du Moulin le 05/04/2007 (F. Portier), d'un adulte en vol depuis la chapelle de la Meule le 19/02/2009 (M.-P., A. & X. Hindermeyer), de 15 individus en migration active au-dessus des marais de la Croix le 26/11/2016 (X. Hindermeyer), de plus de 15 individus en migration active au-dessus du village des Marines à Ker Châlon, 19 individus (peut-être le même groupe) au-dessus des Tchinettes le 29/10/2018 (M.-P., A. & X. Hindermeyer), 3 individus en migration active au-dessus de la Pierre à Monsieur le 28/10/2019 (A. Le Guen) et 6 individus en vol au-dessus de Ker Chauvineau le 10/11/2021 (S. Rouillé). Des chasseurs de l'île et plusieurs autres

observateurs ont simplement mentionné l'espèce mais sans donner de date précise (C. Bugeon, comm. pers.).

GRÈBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis* (244/35)

Le Grèbe castagneux est présent dans les marais de l'île où il se reproduit. Aucune preuve de nidification certaine cette année même si l'espèce s'est très probablement reproduite, comme les années précédentes, dans les marais de la Croix - au moins 2 chanteurs le 16/03 (M.-P. & X.H.) - et de l'Ilia. Contrairement aux années précédentes l'espèce est désormais présente en hiver - par exemple 1 individu dans les marais de l'Ilia le 08/01 (M.-P.H.) et 2 individus dans les marais de la Guerche le 30/12 (M.-P. & X.H.). Le Grèbe castagneux est observé cette année à plusieurs reprises dans les marais de la Guerche en automne et en hiver ce qui est une nouveauté (sans doute à mettre en relation avec les travaux de restauration effectués dans ces marais).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (55/11)**

Après deux ans d'absence, retour du Grèbe jougris en hiver sur la côte nord de l'île : 1 individu le 14/12 plage des Ovaires (M.-P. & X.H.) revu ensuite régulièrement dans le secteur (plage de la Petite Conche-plage des Iliaux) jusqu'à la fin de l'année - et 1 individu le 21/12 devant la Galiote (J.-M.) revu ensuite régulièrement dans le secteur (plage de la Tourette-pointe de Gilberge) jusqu'à la fin de l'année. Ces données ont été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85).



GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus* (1484/56)

L'espèce, qui hiverne dans les eaux de l'île, y est observée cette année de janvier à mars - dernier oiseau le 20/03 plage du Marais Salé (V.A. & J.-M.G.) - puis à partir de novembre - 1 individu le 24/11 pointe Gauthier (V.A. & J.-M.G.). La totalité des observations est faite sur la côte nord. Le maximum, faible encore cette année, est noté le 07/01, lors du comptage Wetlands International, avec seulement 6 individus dénombrés le long de la côte nord (M.-P. & X.H.). À noter cette année une observation à une date atypique : 1 individu en vol depuis la pointe des Corbeaux le 12/07 (J.-M.G. & M.-P.H.).

ŒDICNÈME CRIARD *Burhinus oedicnemus* (16/2)


Après une année blanche, retour de cette espèce qui reste rare sur l'île mais semble tout de même plus régulière : 1 individu plage du Cours du Moulin le 30/03 (B.I.) et 1 individu en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 08/06 (V.A. & J.-M.G.).

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (657/143)

L'espèce est notée presque toute l'année autour de l'île (moins présente en hiver tout de même). Au moins 3 couples se sont reproduits sur l'île cette année, pointe du Château Maugarni - 2 adultes et 2 poussins le 23/06 (M.-P. & X.H.) - près de la Pierre Tremblante - 2 adultes et 2 poussins le 05/07 (D.Gu.) - et près du Vieux Château - 2 adultes et 2 1^{ère} année le 18/07 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.). Pour la première fois, tous les couples ont produit 2 jeunes à l'envol. Pas de passage net, ni au printemps, ni à l'automne. Quelques données en hiver - par exemple 1 individu plage de la Tourette le 22/12 (V.A. & J.-M.G.).

**ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (29/5)**

Après une année blanche, retour de l'espèce au printemps avec 1 individu le 31/03 à Port-Joinville (arrive dans le port, se pose sur l'eau et est attaqué par un Goéland marin, puis file vers le nord de l'île), retrouvé ensuite posé dans les prairies des Perdrettes (M.-P. & X.H.). Ensuite 3 individus sont découverts posés dans les prairies des Perdrettes le 14/05 (V.A. & J.-M.G.) puis retrouvés dans les marais de la Guerche les 17 et 18/05 (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.).

**AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta* (8/2)**

Deux nouvelles observations hivernales (du même individu) d'Avocette élégante sur l'île. Ainsi, un oiseau est découvert le 28/12, en début de matinée, posé sur la plage de la Tourette puis est retrouvé, quelques heures plus tard, posé plage du Marais Salé (M.-P. & X.H.). L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 9 et 10^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après les 6 oiseaux observés le 18/08/1907 (L. Magaud d'Aubusson), la vingtaine d'oiseaux en vol depuis la côte sauvage le 03/08/1987 (J. Feffer), l'individu également en vol devant la plage de Ker Châlon le 18/10/1994 (M.-P. & X. Hindermeyer), les 3 individus en vol depuis le centre nautique de la Pipe le 23/04/2007 (D. Etienney), les 19 individus en vol depuis les Trupailles le 20/03/2011 (V. Auriaux), les 50 individus (en trois groupes) en vol depuis la pointe des Corbeaux le 03/03/2014 (M.-P. & X. Hindermeyer), les 25 individus en vol lors de la traversée Fromentine-Yeu le 25/11/2016 (X. Hindermeyer) et les 11 individus en vol depuis la pointe du But le 09/12/2022 (M.-P. & X. Hindermeyer).

VANNEAU HUPPÉ *Vanellus vanellus* (1076/69)

La petite population nicheuse de cette espèce se maintient sur l'île avec des effectifs qui varient peu d'une année sur l'autre. Cette année de nouveau au moins 10 couples nicheurs sont dénombrés sur l'aérodrome (et autour) et les premiers poussins y sont découverts dès le 12/04 (X.H.). L'espèce semble toujours vouloir s'installer dans les prairies des Perdrettes mais sans succès pour l'instant. Les autres observations (nombreuses cette année) sont effectuées en automne - par exemple 2 individus posés sur la dune de la Grande Conche le 17/09 (V.A. & J.-M.G.) et 8 individus posés sur la plage de la Tourette le 11/11 (M.-P. & X.H.) - et en hiver - par exemple 8 individus le 14/12 et 6 individus le 29/12 sur l'aérodrome (M.-P. & X.H.).

**PLUVIER DORÉ *Pluvialis apricaria* (346/30)**

L'espèce est observée d'avril à juin puis d'août à décembre. Au printemps, quelques individus isolés sont observés en avril et mai - par exemple 1 individu dans le vallon de l'aérodrome le 26/04 (J.M.) et 1 individu près de la Pierre des Amporelles le 19/05 (M.Fo.) - et 1 individu tardif posé plage des Vieilles le 04/06 (P.Pa.). Le passage postnuptial, beaucoup plus marqué, débute le 17/08 avec 1 individu sur l'aérodrome (J.M.) et se poursuit de septembre à novembre - par exemple 7 individus posés près de la carrière (M.-P. & X.H.) et 8 individus sur la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) le 11/10 puis 9 individus posés sur l'aérodrome le 08/11 (M.-P. & X.H.). Enfin, quelques observations sont faites en hiver avec 1 individu en vol depuis la pointe de la Pèrre le (M.-P.H.) et 1 individu plage de la Petite Conche le 30/12 (A.Vr. & B.J.).

**PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (424/60)**

L'espèce est observée de janvier à mai puis d'octobre à décembre. Il s'agit de 1 à 6 individus seulement, observés uniquement sur les plages de la côte nord - 5 individus posés plage de la Tourette

le 05/01 (J.M.) et 6 individus plage de la Pipe le 28/12 (M.-P. & X.H.). Un tout petit passage est noté au printemps avec 2 individus en vol le 09/05 (J.M.) et 1 individu en vol le 18/05 (M.-P. & X.H.) au-dessus de la dune de la Grande Conche.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula* (3337/243)

L'espèce est observée de janvier à juin puis de juillet à décembre. Plus de 100 individus sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Les oiseaux quittent l'île progressivement à partir de fin février. Les derniers oiseaux sont observés en juin - dernier individu le 02/06 en vol au-dessus de la Pierre des Amporelles (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial qui commence dès juillet - 4 individus le 20/07 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.) - est net à partir d'août - déjà plus de 105 individus le 20/08 plage des Bossilles/de la Borgne (Q.G. & J.D.L.) - et se poursuit en septembre et octobre. Les maxima sont classiquement notés à l'automne avec par exemple plus de 140 individus les 27/09 (L.V. & M.P.) et 29/09 (M.-P. & X.H.) plage des Bossilles/de la Borgne. Deux oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année sur la côte nord. Il s'agit, tout d'abord, de la femelle hivernante pour la sixième année consécutive sur l'île et baguée à Dazendorf (Schleswig-Holstein) en Allemagne (M. Altemüller, comm. pers.). Elle est notée jusque fin janvier puis revient le 22/08 plage des Bossilles/de la Borgne (Q.G. & M.-P.H.) et est ensuite observée jusqu'en décembre. Il s'agit, ensuite, d'un nouvel oiseau qui avait été bagué à Borssele aux Pays Bas le 18/07/2024 (S. Lilipaly, comm. pers.).

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius* (6/2)

Deux nouvelles données de Petit Gravelot sur l'île : 1 individu est observé posé sur l'aérodrome le 31/03 (M.-P. & X.H.) et 1 individu passe en vol en criant au-dessus de la carrière le 09/06 (V.A. & J.-M.G.). L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 7 et 8^{ème} mentions certaines de l'espèce sur l'île après celles de 2 individus pointe de Gilberge le 29/08/1989 (D. Vendromme & V. Cornuaille), d'un individu les 09 et 12/04/2007 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu les 24 et 25/05/2019 sur la plage de la Tourette (X. Hindermeyer & J.-M. Guilpain) et d'un individu le 25/04/2022 sur la plage de la Grande Conche (V. Auriaux & J.-M. Guilpain). Deux autres données d'août 1992 sont incertaines.

GUIGNARD D'EURASIE *Charadrius morinellus* (64/4)**

Le Guignard d'Eurasie est régulier, en petit nombre, à l'automne, principalement sur la côte sauvage de l'île. Il est de nouveau observé cette année lors du passage postnuptial : 1 individu en vol depuis la dune de la Grande Conche le 01/09 (J.-M.G. & X.H.), 1 individu en vol depuis la pointe de la Père le 10/09 (M.-P. & X.H., O.Pe.), 1 individu en vol depuis la pointe du Châtelet le 14/09 (B.I.) et 1 individu (le même que la veille ?) en vol depuis la carrière le 15/09 (M.-P. & X.H.). Ces données ont été soumises à homologation départementale. Aucune observation au printemps.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (2612/194)

L'individu qui avait été observé en décembre 2023 a poursuivi son hivernage sur l'île - il est noté par exemple le 06/01 pointe de Gilberge (M.-P. & X.H.). Classiquement, l'espèce est ensuite observée aux deux passages prénuptial (du 03/04 au 25/05) et postnuptial (du 09/07 au 09/10). A noter 1 individu précoce noté dès le 22/06 sur la plage du But (M.-P. & X.H.) et, sans doute le même, le 25/06 pointe de la Gournaise (M.-P.H.). Le nombre d'individus au passage, posés principalement sur les plages de l'île ou en vol, reste modeste depuis plusieurs années avec aujourd'hui le plus souvent moins de 15 individus ensemble - maxima 16 individus posés sur la plage des Sapins le 28/04 (M.Do.) et 17 individus en vol depuis le phare des Corbeaux le 06/08 (V.A. & J.-M.G.).



a

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata* (91/2)

Le Courlis cendré, régulier mais peu commun sur l'île, est observé seulement deux fois cette année : 1 individu en vol le 03/11 depuis la digue de Port-Joinville (M.-P. & X.H.) et 1 individu le 30/12 depuis la plage des Sapins (M.-P. & X.H.).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (220/9)

L'espèce est observée en petit nombre cette année et principalement lors du passage prénuptial. Au printemps, quelques oiseaux sont notés sur les plages de l'île du 21/04 - 2 individus posés plage de la Tourette (A. & B.N., L.Pa.) - au 08/05 - 1 individu (sans doute le même) plage des Broches (J.M.) puis plage du Loubinou (S.D.) le 08/05. À l'automne, un seul oiseau est noté en vol depuis la pointe des Corbeaux le 08/09 (M.-P. & X.H., J.-M.G.).



b

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (26/1)

Une nouvelle donnée cette année pour cette espèce qui reste peu commune sur l'île : 1 individu posé avec 2 Barges roses sur la plage de la Tourette le 21/04 (A. & B.N.)

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (5711/530)

L'espèce, commune, est observée presque toute l'année. Seulement 120 individus sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Un petit passage est noté au printemps - plus 230 individus le 27/04 plage des Broches (M.-P. & X.H.). Des oiseaux sont présents au moins jusqu'au 28/06 - 5 individus plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, a lieu dès juillet - déjà plus de 38 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 20/07 (M.-P. & X.H.) - mais est surtout perceptible de septembre à novembre avec par exemple plus de 200 individus les 29/09 et 04/10 et plus de 210 individus le 01/11 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.).

**BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (196/5)**

L'espèce est observée cette année en petit nombre aux deux passages. Au printemps, après 1 individu précoce le 13/03 pointe de la Gournaise (M.P. & X.H.), 1 individu est observé pointe des Corbeaux les 10 et 11/05 (J.M.) puis 2 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 20/05 (M.P. & X.H.). À l'automne, 1 seul individu est noté plage de la Grande Conche le 17/09 (V.A. & J.-M.G.). Pas de donnée en hiver.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (2/1)

Enfin une nouvelle donnée de Bécasseau de Temminck sur l'île : 1 individu est observé en vol (criant) au dessus de la carrière le 22/08 (J.M.).

Il s'agit seulement de la 3^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un individu le 23/08/2006 dans le marais de la Croix (X. Hindermeyer) et d'un individu en vol au-dessus de la pointe des Corbeaux le 03/09/2011 (F. Portier).

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (3583/318)

L'espèce, qui est en augmentation régulière depuis plusieurs années sur les rivages de l'île, est observée de janvier à juin puis de juillet à décembre. Un peu moins d'oiseaux hivernants sur la côte nord de l'île - plus de 120 individus sont dénombrés le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Un petit passage prénuptial est observé en avril avec par exemple 150 individus le 14/04 plage de la Tourette (V.A. & J.-M.G.). Les 2 derniers oiseaux sont observés le 19/06 plage de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial est noté dès juillet - déjà plus de 31 individus le 24/07 pointe de la Gournaise (J.M.) - et se poursuit jusqu'en novembre. Les maxima sont comptés en novembre avec plus de 170 individus plage de la Tourette le 10/11 (M.-P. & X.H.). Un seul individu bagué "couleur" a été observé cette année sur les plages de la côte nord. Il s'agit d'un oiseau bagué sur l'archipel des Orcades en Ecosse, observé sur l'île depuis 2021 (C. Corse, comm. pers.).



BÉCASSEAU VARIABLE *Calidris alpina* (1014/57)

Le Bécasseau variable est observé cette année lors du passage prénuptial puis de juillet à novembre. Au printemps, quelques oiseaux sont observés en avril et mai avec par exemple 6 individus pointe des Corbeaux le 11/05 (J.M.). Le passage postnuptial, plus marqué, débute en juillet avec 1 individu pointe du But le 22/07 (J.M.) et se poursuit jusqu'en novembre - dernier oiseau le 19/11 plage de la Tourette (M.-P.H.). Le maximum est noté en juillet avec 10 individus en vol le 23/07 depuis la pointe du But (J.M.). Une seule observation hivernale avec 1 individu pointe des Corbeaux le 06/01 (M.-P. & X.H.).

BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* (1441/132)

L'espèce, bien présente sur l'île, y est notée de janvier à mai puis de juillet à décembre. Le nombre exact d'hivernants est difficile à estimer de manière exacte mais plus de 44 individus sont dénombrés le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Un petit passage prénuptial est noté cette année avec plus de 33 individus le 02/04 plage de la Tourette (M.-P.H.). Les premiers retours sont observés dès le 25/07 (date la plus précoce de la base) avec 1 individu posé pointe de la Gournaise (J.M.). Le passage postnuptial, tardif, est surtout perceptible en novembre avec par exemple plus de 40 individus le 17/11 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.).

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (70/5)

Après deux années blanches, le Bécasseau minute est de nouveau observé sur l'île lors du passage postnuptial. Un oiseau est découvert le 02/09 plage de la Pulante et y sera observé jusqu'au 05/09 (M.P. & X.H.). Il sera remplacé par un autre individu de 1^{ère} année (plumage différent) le 07/09 au même endroit (M.-P. & X.H.).



c

BÉCASSE DES BOIS *Scolopax rusticola* (34/1)

Une seule donnée cette année, classiquement en hiver : 1 individu en vol à la tombée de la nuit au bout du terrain d'aéromodélisme le 14/12 (M.-P. & X.H.). Cette seule donnée ne reflète pas la réelle présence de l'espèce sur l'île.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (31/9)

Neuf données cette année (ce qui constitue un record), toutes en novembre et décembre et uniquement dans les marais de la Guerche - premier oiseau le 07/11 (M.-P. & X.H.) - et au Marais Salé (très favorables cet automne). Il s'agit le plus souvent d'un seul individu, excepté 2 individus le 29/12 puis 3 individus le 30/12 au Marais Salé (M.-P. & X.H.). Aucune donnée au printemps. La Bécassine sourde, bien que toujours peu commune, semble plus régulière sur l'île.

BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago* (297/38)

L'espèce est beaucoup observée cette année en janvier, mars et avril puis d'août à décembre. Les marais de la Guerche, très favorables à l'espèce après les travaux, cumulent à eux seuls plus de la moitié des données, suivis du Marais Salé. Le nombre d'oiseaux concernés est également plus important cette année avec par exemple 6 individus au Marais Salé le 27/01 (M.-P. X.H.), plus de 6 individus dans les marais de la Guerche le 23/12 (J.M.), 8 individus au Marais Salé le 29/12 et 9 individus dans les marais de la Guerche le 30/12 (M.-P. & X.H.). La Bécassine des marais fréquente aussi d'autres lieux comme la carrière, la pointe du Châtelet, la plage de la Pulante, les mares sur la côte sauvage mais aussi la dune de la Grande Conche.

PHALAROPE À BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (36/4)

Le Phalarope à bec large, toujours assez rare dans les eaux de l'île, est noté à plusieurs reprises cet automne : 1 individu de 1^{ère} année posé plage des Bossilles/de la Borgne le 27/09 (L.V. & M.P.), 1 individu de 1^{ère} année posé plage du Cours du Moulin (S.D.) puis plage des Bossilles/de la Borgne le 01/10 (M.-P.H. & A.-G.G., V.A. & J.-M.G.) et 3 individus posés en mer lors de la traversée Fromentine-Yeu le 04/10 (X.H.).



CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos* (2103/140)

L'espèce est observée sur les côtes de l'île et dans les marais presque toute l'année. Comme l'année dernière, pas d'oiseau hivernant sur l'île cette année. Le passage prénuptial a lieu en avril - 7 individus à la pointe des Corbeaux le 13/04 (V.A. & J.-M.G., X.H.) - et en mai - encore 3 individus plage des Broches le 20/05 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, débute le 09/07 avec 1 individu plage du Loubinou et 1 individu pointe de Gilberge (M.-P.H.) et s'achève le 09/11 avec 1 individu pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.). Quelques groupes importants sont notés cet automne - 12 individus ensemble le 28/08 pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.) et plus de 12 individus ensemble le 02/09 plage des Bossilles/de la Borgne (X.H.).

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus* (454/34)

L'espèce est observée cette année aux deux passages en petit nombre. Au printemps, le passage débute le 12/04 avec 6 individus posés dans les marais de la Guerche (X.H.) et se poursuit jusqu'au 24/04 avec 1 individu dans la mare des Broches (V.A. & J.-M.G.). Ensuite, 1 individu est noté dans les marais de la Guerche les 20/05 (M.-P. & X.H.) et 25/06 (M.-P.H.). Le passage postnuptial débute le 28/07 avec 1 individu en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche et 1 individu dans les marais de la Guerche (J.M.) et se poursuit jusqu'au 28/09 avec 1 individu à Ker Bossy (B.I. & L.Ch.). Pas d'observation en hiver.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus* (277/20)

L'espèce, régulière sur l'île en petit nombre, est notée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial, peu marqué, est noté en avril et mai - par exemple 1 individu dans les marais de la Guerche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.) et 2 individus en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 10/05 (J.M.). Le passage postnuptial, plus net, a lieu du 02/07 - 2 individus en vol pointe du Châtelet (J.M.) - au 05/11 avec 1 individu plage de la Tourette (J.D.L.). Toutes ces observations ne concernent à chaque fois qu'un ou deux individus, excepté 10 individus en vol depuis la pointe des Chancrelles le 01/09 (V.A. & J.-M.G.).

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola* (8/1)

Enfin une nouvelle donnée printanière de Chevalier sylvain sur l'île (la dernière datait déjà de 10 ans !) : 1 individu posé dans les marais de la Guerche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.). L'espèce reste très rare sur l'île mais les travaux effectués dans les marais de la Guerche permettront probablement de multiplier le nombre d'observations.

Il s'agit seulement de la 9^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un individu le 03/09/2003 pointe de la Gournaise (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 19/04/2008 sur l'aérodrome (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 19/05/2009 dans les marais de la Guerche (F. Portier), d'un individu le 17/04/2010 à la Bergerie (M.-P., A. & X. Hindermeyer), d'un individu le 18/05/2011 dans les marais de la Guerche (F. Portier), d'un individu les 17 et 18/05/2012 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer) et d'un individu le 18/05/2014 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer).



A : Chevalier sylvain ; B : Chevalier culblanc ; C : Chevalier gambette ; D : Chevalier guignette

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia* (242/12)

Le Chevalier aboyeur, régulier sur l'île en petit nombre, est observé cette année aux passages pré et postnuptial. Au printemps, l'espèce est notée en avril avec par exemple 1 individu dans les marais de la Guerche le 21/04 et 2 individus dans les marais des Broches le 22/04 (A. & B.N.). Le passage postnuptial commence dès juillet - 29 individus ensemble (un record) en vol au-dessus de la pointe des Corbeaux le 09/07 (J.-M.G., M.-P.H. & B.I.) - et se poursuit jusqu'en septembre - 4 individus au-dessus de la pointe des Chancrelles (V.A. & J.-M.G.) et 3 individus au-dessus de la pointe des Corbeaux (X.H. & J.-M.G.) le 01/09.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (1312/62)

L'espèce est observée principalement en janvier, mars et avril puis en septembre et en novembre et décembre. Un petit passage est noté en janvier avec plus de 50 individus en 30 minutes devant la pointe du But le 04/01 (J.M.). Plus de 60 individus sont dénombrés autour de l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). À l'automne, les premiers oiseaux sont notés en septembre - 1 adulte et 1 1^{ère} année au large de la pointe des Corbeaux le 05/09 (M.-P. & X.H.) - et le passage, très peu marqué, se poursuit en novembre - plus 18 individus devant la pointe du But le 17/11 (M.-P. & X.H.). Comme tous les ans, des oiseaux sont notés autour de l'île en hiver - plus de 100 individus le 22/12 devant la pointe du But (J.M.).



MOUETTE DE SABINE *Xema sabini* (80/36)

Nouvel automne tout à fait exceptionnel pour la Mouette de Sabine, peu commune mais régulière dans les eaux de l'île, avec un afflux très marqué (et sur la durée) de l'espèce autour de l'île et des chiffres record. Après quelques observations au mois d'août - par exemple 1 adulte au passage en 55

minutes devant la pointe du But le 23/08 et 1 adulte au passage en 1h30 devant la pointe du Châtelet le 26/08 (M.-P.H.) - le passage s'accroît nettement en septembre avec déjà plus de 90 individus au passage en 1h45 devant la pointe des Corbeaux le 14/09 (M.-P. & X.H.). Le maximum est noté le 21/09 avec plus de 560 individus en 1h20 au passage devant la côte sauvage entre la carrière et le Trou d'Enfer (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.), un record pour l'île ! Le passage se poursuit encore à la fin du mois avec par exemple plus de 70 individus devant la pointe des Corbeaux le 28/09 (M.-P. & X.H.) et 106 individus au passage depuis la pointe du But le 30/09 (L.V. & M.P., M.-P.H. & B.I.). Les derniers oiseaux sont observés début octobre avec par exemple 3 individus au passage devant la pointe du But le 08/10 (F.P.).

MOUETTE RIEUSE *Chroicocephalus ridibundus* (4432/428)

L'espèce est observée presque toute l'année sur l'île. 110 individus y sont dénombrés le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). La majorité des oiseaux quitte l'île en février-mars même si quelques individus sont encore observés jusqu'en juin. Les premiers retours ont lieu dès fin juin avec déjà 19 individus (18 adultes et 1 1^{ère} année) le 26/06 plage du Marais Salé (M.-P.H.). Pas de passage très marqué à l'automne - maximum plus de 90 individus plage de la Pulante le 02/09 (X.H.). Avec une régularité de métronome, l'oiseau bagué "couleur" observé depuis six ans, et bagué poussin à Kizskowo en Pologne le 10/06/2017, est revu à partir du 12/07 plage de la Tourette (M.-P. & A.H.) et jusqu'au 16/09 plage de la Pulante (X.H.). Un autre oiseau bagué "couleur" déjà observé l'année dernière, et bagué poussin à Januszkowice, également en Pologne, le 31/05/2022 (Polring : <http://ring.stornit.gda.pl>) est noté à partir du 26/08 plage des Bossilles/de la Borgne (X.H.) et jusqu'au 09/11 plage de la Tourette (X.H.). Cette année deux oiseaux bagués "métal" sont également observés le 15/12 près de la gare maritime à Port-Joinville (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G., S.D.). Le premier avait été bagué poussin à Hobšovice en Tchéquie le 24/05/2024 (Bird Ringing Centre of Czechia, comm. pers.) et le second à Malmö en Suède le 15/07/2003 (Bird Ringing Center of Sweden, comm. pers.) - elle a donc plus de 21 ans.



MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (260/8)

Quelques observations de Mouette pygmée cette année lors du passage postnuptial et en hiver. Un petit passage postnuptial est noté à partir de septembre - 1 1^{ère} année au passage devant la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.), puis en octobre - par exemple 1 adulte au passage devant la pointe du But le 25/10 (M.-P. & X.H.) - et novembre. Quelques observations sont également faites en hiver -

par exemple 3 individus en vol devant le phare des Corbeaux le 06/01 (V.A. & J.-M.G.) et 1 individu de 1^{ère} année posé sur la plage de la Tourette le 29/12 (M.-P. & X.H.).

GOÉLAND D'AUDOUIN *Ichthyæetus audouinii* (0/1)**

La belle surprise du printemps : 1 individu de 2^{ème} année est découvert posé sur la plage de la Tourette le 23/04 (J.M.). D'abord confondu avec un Goéland pontique, il sera finalement identifié le jour même, sur la base des photographies prises, comme un Goéland d'Audouin par Thomas Dagonet. L'oiseau, qui s'est envolé rapidement, ne sera malheureusement pas retrouvé. Il s'agit de la première mention sur l'île et seulement de la 4^{ème} mention vendéenne. Cette donnée a été homologuée



par le comité d'homologation vendéen (CH85). Un individu très semblable sera observé 3 jours plus tard à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) par Geoffroy Chabot. Au vu des photographies, il est très probable qu'il s'agisse du même oiseau.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Ichthyæetus melanocephalus* (1337/92)

La Mouette mélanocéphale est observée presque toute l'année sur l'île mais semble moins commune ces dernières années. L'espèce est observée en petit nombre de janvier à mai - maximum 5 individus ensemble plage de la Tourette le 20/03 (V.A. & J.-M.G.). En hiver, 1 seul individu est dénombré sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Comme les années précédentes, on note un petit mouvement en juin et juillet avec par exemple plus de 36 individus le 28/06 (M.-P.H.) et 24 individus (12 adultes et 12 1^{ère} année) le 22/07 (M.-P. & X.H.) devant la pointe des Corbeaux. Pas de passage marqué à l'automne.

b



Adulte

c



Immature

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus* (853/94)

L'espèce, qui hiverne sur l'île, est observée de janvier à avril - encore 1 individu le 14/04 pointe des Corbeaux (X.H.) - puis de septembre - 1 individu de 1^{ère} année pointe des Corbeaux le 01/09 (X.H. & J.-M.G.) - à décembre. Plus de 20 individus sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Pas de passage net noté au printemps.

GOÉLAND MARIN *Larus marinus* (4917/385)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 420 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, pas de dénombrement des goélands nicheurs cette année. Les maxima sont notés à l'automne et en hiver sur le port ou sur le port de plaisance à Port-Joinville avec par exemple plus de 440 individus (ce qui doit constituer un record) le 03/01 (M.-P. & X.H.) et plus de 230 individus le 22/09 (M.-P. & X.H.). De nombreux oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (134 lectures concernant 43 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE, sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.), sur l'îlot du Ratier en Seine-Maritime (G. Le Guillou, comm. pers.), sur l'archipel de Chausey dans la Manche (F. Gallien, comm. pers.), sur l'île Portland (Dorset) en Angleterre (T. Coombs, comm. pers.) et à Getaria (Pays basque) en Espagne (A. Herrero, comm. pers.).

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (4105/443)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 210 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, pas de dénombrement des goélands nicheurs cette année. À noter de nouveau cette année un second cas de reproduction à Port-Joinville (sur le toit de la gare maritime) avec par exemple 1 adulte et 3 poussins le 25/06 (M.-P.H.). Pas de passage net au printemps et à l'automne. Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (164 lectures concernant 49 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE, sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.) et à Guernesey (P. Veron, comm. pers.).



GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (48/9)**

Neuf nouvelles observations de Goéland pontique cette année : 1 2^{ème} année plage du Marais Salé le 14/02 (V.A. & J.-M.G.), 1 1^{ère} année (bagué en Allemagne) le 23/08 (M.-P.H.) et 1 adulte le 24/08 (M.-P. & X.H.) pointe de la Gournaise, 1 3^{ème} année (bagué aux Pays-Bas) le 09/09 (M.-P. & X.H., O.Pe. & J.-M.G.) et 1 1^{ère} année (bagué en Allemagne) le 21/09 (M.-P. & X.H.) pointe des Corbeaux, 1 3^{ème} année (bagué en Allemagne) le 09/11 (M.-P. & X.H.) et 1 2^{ème} année le 30/11 (V.A. & J.-M.G.), 1 1^{ère} année le 04/12 pointe de la Pèrre (V.A. & J.-M.G.) et 1 adulte le 28/12 dans le port de plaisance à Port-Joinville (M.-P. & X.H.). Plusieurs de ces données ont déjà été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85). L'espèce est désormais très régulière sur l'île.

**GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahellis* (331/28)**

Le Goéland leucopnée est observé en petit nombre presque toute l'année sur l'île. Pas de preuve certaine de reproduction cette année sur la côte sauvage. Ces observations ne concernent le plus souvent qu'un à quatre individus à chaque fois - excepté 5 individus de 1^{ère} année posés pointe des Corbeaux le 22/07 (M.-P. & X.H.). L'espèce doit souvent passer inaperçue dans les grands groupes de laridés. Cinq oiseaux bagués "couleur" ont été observés le 22/07 (M.-P. & X.H.), les 28/08 (M.-P.H., V.A. & J.-M.G.) et 05/09 (M.-P. & X.H.) pointe des Corbeaux et le 08/09 plage du Marais Salé (M.-P. & X.H.). Le premier (1^{ère} année) avait été bagué sur l'île de Planasse dans l'Aude, le second (1^{ère} année), le quatrième (2^{ème} année) et le cinquième (1^{ère} année) à Port-Saint-Louis-du-Rhône dans les Bouches-du-Rhône et le troisième (1^{ère} année) sur l'archipel du Frioul dans les Bouches-du-Rhône (C. Leray, comm. pers.).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (2882/224)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 40 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, pas de dénombrement des goélands nicheurs cette année. Pas de passage net au printemps et à l'automne. Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (125 lectures concernant 83 individus différents). Il s'agit d'oiseaux du programme PERISCOPE mais aussi d'oiseaux bagués sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.), sur l'île d'Aurigny à Guernesey (P. Veron, comm. pers.), sur l'île d'Havergate (Suffolk) en Angleterre (M. Marsh, comm. pers.), à Langli (Varde) au Danemark (K. T. Pedersen, comm. pers.), à Fedje (Hordaland) en Norvège (M. Helberg, comm. pers.), à Zeebrugge (West-Vlaanderen) en Belgique (J. Talloen, comm. pers.), à Den Haag (Zuid-Holland), à Moerdijk (Noord-Brabant) et à Rotterdam (Zuid-Holland) aux Pays-Bas (R.-J. Buis, comm. pers.) et sur l'archipel d'Heligoland en Allemagne (S. Martens, comm. pers.).

La sous-espèce *Larus fuscus intermedius* est de nouveau observée cette année : 1 individu adulte posé plage de la Grande Conche le 13/03 (V.A. & J.-M.G.) et 2 individus bagués "couleur" le 29/09 plage des Bossilles/de la Borgne (L.V. & M.P.) et le 30/09 plage des Broches (L.V. & M.P., M.-P.H.). Ils avaient été bagués respectivement en juillet 2010 et en 2024 dans le comté de Vest-Agder en Norvège (M. Helberg, comm. pers.).

De même, un très bon candidat pour un Goéland de la Baltique *Larus fuscus fuscus* est observé et photographié pointe des Corbeaux le 11/10 (M.-P. & X.H.) mais l'oiseau n'étant pas bagué, il est malheureusement impossible de confirmer de manière certaine cette donnée.



a

STERNE CAUGEK *Thalasseus sandvicensis* (5191/519)

L'espèce, commune sur l'île, peut y être observée toute l'année. Le passage prénuptial est perceptible en avril avec par exemple 139 individus au passage en 30 minutes devant la pointe des Corbeaux le 01/04 et plus de 120 individus devant la pointe de la Gournaise le 12/04 (X.H.). Comme les quatre années précédentes, un nombre d'oiseaux assez important est observé plus tard - plus de 230 individus le 28/06 devant la pointe des Corbeaux (M.-P.H.) - sans qu'il soit possible de dire exactement d'où viennent ces oiseaux (nicheurs sur le polder de Sébastopol à Noirmoutier ?). Le passage postnuptial débute en juillet avec déjà plus de 104 individus (quelques 1^{ère} année) pointe des Corbeaux le 05/07 (J.M.) et se poursuit en août - 190 individus le 14/08 (J.M.) et plus de 200 individus le 28/08 (M.-P.H.) posés pointe du Cantin - et septembre - plus de 200 individus au passage devant la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.). Enfin, l'espèce hiverne, en petit nombre de nouveau cette année, dans les eaux de l'île - plus de 50 individus sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (15 lectures concernant 11 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués aux Pays-Bas, en Belgique (R. Finj, comm. pers.), en Irlande (T. Murray, comm. pers.), en Allemagne (U. Knief, comm. pers.), en Suède (Å. Steinholtz, comm. pers.) et au Danemark (J. Sterup, comm. pers.).

b



STERNE NAINE *Sternula albifrons* (42/4)

La Sterne naine, qui reste peu commune dans les eaux de l'île, est observée cette année aux deux passages et en juillet. Au printemps, 1 individu est noté au passage devant la pointe du But le 06/04 (V.A. & J.-M.G.). Ensuite, deux observations sont faites début juillet : 1 individu le 02/07 (J.M. & B.I.) et 1 individu le 03/07 (V.A. & J.-M.G., J.M. & B.I.) devant la pointe des Corbeaux (non nicheur, oiseau ayant échoué dans sa reproduction ?). Enfin, le passage postnuptial, peu marqué, a lieu en août avec 5 individus devant la pointe du But le 24/08 (Q.G.).

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii* (7/1)**

Nouvelle observation de cette espèce très rare sur l'île (la dernière mention datait de 2020) : 1 adulte posé pointe du Cantin le 29/08 (M.-P.H.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 8^{ème} mention de l'espèce sur l'île après la série d'observations de 1992 : 1 juvénile le 10/08 plage de Ker Châlon, 1 adulte le 14/08 pointe du But, 1 adulte les 12/08 et 17/08 pointe des Corbeaux (M. Bouron et S. Gautreau), celle d'un adulte posé le 16/08/2008 pointe des Corbeaux (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'un adulte au passage le 18/08/2013 pointe du But (M.-P., A. & X. Hindermeyer) et celle d'un 1^{ère} année posé pointe des Corbeaux le 23/08/2020 (M.-P., A. et X. Hindermeyer).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (674/62)

L'espèce est observée cette année d'avril à octobre. Au printemps, on note quelques oiseaux en avril - par exemple 6 adultes posés pointe de la Gournaise le 12/04 (X.H.). Des oiseaux sont ensuite notés dès juin avec par exemple 10 adultes devant la pointe des Corbeaux le 27/06 (M.-P.H.) mais le passage postnuptial est surtout noté en août et septembre - 16 individus pointe du But le 24/08 (Q.G.) et 15 individus pointe des Corbeaux le 12/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.). Quelques individus sont encore observés en octobre - dernier oiseau le 10/11 pointe des Corbeaux (P.Ay.). Enfin, plus étonnant, une observation hivernale avec 1 individu en vol au-dessus de la plage de la Raie profonde le 31/12 (A.V. & B.J.).

**STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (126/8)**

L'espèce n'est observée, en petit nombre, que lors du passage postnuptial du 24/08 - 1 individu de 1^{ère} année au passage devant la pointe du But (Q.G. & J.M.) - au 25/10 - 1 individu de 1^{ère} année au passage en 45 minutes devant la pointe du But (M.-P. & X.H.). Le maximum est noté le 08/10 avec 11 individus au passage devant la pointe du But (F.P.). Aucune donnée au printemps.

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger* (70/3)

La Guifette noire n'est observée cette année que lors du passage postnuptial : 5 individus pêchant au large de la pointe des Corbeaux le 31/08 (X.H.), 1 individu le 02/09 (X.H.) et 1 individu le 12/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) au passage devant la pointe des Corbeaux.

GRAND LABBE *Stercorarius skua* (840/35)

Un peu plus d'observations cette année mais cela reste encore très modeste pour ce labbe autrefois le plus commun dans les eaux de l'île. Il faudra plusieurs années pour que l'espèce se remette de la grippe aviaire. On note seulement quelques oiseaux en avril - par exemple 1 individu au passage devant la pointe des Corbeaux le 13/04 (X.H.) - puis de juin à octobre - par exemple 2 individus au passage devant la pointe du Châtelet le 29/09 (B.I.) - et en décembre.

**LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (202/31)**

L'espèce, peu abondante mais très régulière, est observée cette année presque uniquement lors du passage postnuptial du 24/08 - 1 individu depuis la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) - au 16/10 - 1 individu depuis la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Il ne s'agit presque à chaque fois que d'un à quatre individus excepté 5 individus le 14/09 (M.-P. & X.H.) et 6 individus le 08/09 (M.-P. & X.H., J.-M.G.) au passage devant la pointe des Corbeaux. Une seule donnée au printemps avec 1 individu au passage devant la pointe des Corbeaux le 01/04 (M.-P. & X.H.). Aucune donnée en hiver.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (489/70)

L'espèce est observée en nombre cette année aux deux passages. Au printemps, le passage, peu marqué, débute fin mars - 2 individus au passage pointe des Corbeaux le 31/03 (M.-P. & X.H.) - mais a lieu principalement en avril - par exemple 1 posé devant l'anse des Soux le 13/04 (X.H.) - et se termine en mai - 2 individus au passage pointe des Corbeaux le 11/05 (J.M.). Au contraire, à l'automne le passage (du 13/07 au 01/11) est marqué. Il concerne de 1 à 10 individus par exemple plus de 8 individus au large de la pointe des Corbeaux le 05/09 (M.-P. & X.H.), 8 individus au passage les 08/09 (M.-P. & X.H., J.-M.G.) et 16/10 (V.A. & J.-M.G.), 9 individus les 27/09 (M.-P.H.) et 15/10 (O. Pe.) depuis la pointe des Corbeaux et 10 individus au passage depuis la pointe du But le 30/09 (L.V. & M.P., M.-P.H. & B.I.). Une observation, plus rare, en hiver avec 1 individu depuis la plage de la Tourette le 29/12 (M.-P. & X.H.).

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge* (853/82)

Le Guillemot de Troïl, qui se tient plus au large que le Pingouin torda, est noté cette année de janvier à avril, en juillet puis d'octobre à décembre. Pas de passage noté au printemps. À l'automne, le passage est plus net avec par exemple plus de 65 individus le 20/11 au passage devant la pointe du But (V.A. & J.-M.G.). En hiver, quelques oiseaux sont présents dans les eaux de l'île, par exemple 4 individus posés plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.).



PINGOUIN TORDA *Alca torda* (1618/50)

Le Pingouin torda est présent dans les eaux de l'île en petit nombre de janvier à avril - 3 derniers oiseaux au passage pointe des Corbeaux le 23/04 (M.-P.H.) - puis de septembre à décembre. À l'automne, le passage, presque inexistant, débute en septembre - premier individu devant la pointe de la Gournaise le 22/09 (M.-P. & X.H.) - mais est surtout perceptible en novembre avec par exemple plus de 17 individus au passage devant la pointe du But le 17/11 (M.-P. & X.H.).

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (418/19)


Le Plongeon catmarin était autrefois le plongeon le plus commun en hiver autour de l'île. Toutefois, comme les années précédentes, très peu d'oiseaux sont notés cette année en janvier, mars et avril puis en décembre. Les oiseaux sont observés uniquement sur la côte nord et il s'agit à chaque fois d'un ou deux individus, excepté 6 individus posés en face de la pointe de la Gournaise le 28/01 (M.-P. & X.H.).

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (118/4)

Le Plongeon arctique est régulier mais reste peu commun autour de l'île. Quelques observations cette année en automne et en hiver : 1 individu plage de la Pipe le 27/11 (M.-P.H.) et 1 individu (sans doute le même) en face de la Galiote le 28/11 (M.-P.H.) puis 1 individu plage de la Tourette le 15/12 (M.-P. & X.H.) et 1 individu en vol devant la plage du Marais Salé le 18/12 (J.-M.G.).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (717/132)

L'espèce, commune en petit nombre, est notée de janvier à mai - dernier oiseau en vol depuis la plage des Ovaies le 01/05 (M.-P. & X.H.) - puis à partir de novembre avec un premier oiseau en vol le 09/11 depuis la plage de la Pipe (M.-P. & X.H.) et jusqu'à fin décembre. Le nombre d'hivernants, très important en 2023-2024 - plus de 12 individus sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.) - semble très faible au début de l'hiver 2024-2025.



A : Plongeon catmarin ; B : Plongeon imbrin ; C : Plongeon arctique

OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (1/1)*

Deuxième observation d'Océanite de Wilson dans les eaux de l'île en deux ans : 1 individu est observé lors d'une séance de sea-watch depuis le phare des Corbeaux le 20/08 (Q.G.). L'espèce doit facilement passer inaperçue parmi les autres Océanites et, recherchée plus activement, elle devrait donc être observée de nouveau dans les années qui viennent. Cette donnée a été soumise au comité d'homologation national (CHN).

Il s'agit seulement de la 2^{ème} mention de l'espèce dans les eaux de l'île après celle d'un individu le 05/08/2023 devant la pointe des Corbeaux (J.-M. Guilpain & J. Méchin).

OCÉANITE TEMPÊTE *Hydrobates pelagicus* (301/26)

L'espèce est observée de nouveau cette année en janvier - par exemple 2 individus depuis la digue de Port-Joinville le 03/01 (J.M.) et 1 individu depuis la plage des Iliaux le 05/01 (M.-P. & X.H.) - puis d'août à octobre dans les eaux de l'île. Le maximum est noté le 27/09 avec plus de 80 individus au passage en 1h30 devant la pointe des Corbeaux (M.-P.H. & M.P.).

On note, cette année, plusieurs observations d'Océanite sp. (tempête/culblanc/de Wilson) en août et septembre avec notamment plus de 100 individus au passage devant la pointe du But le 30/09 (L.V. & M.P., M.-P.H. & B.I.).

FULMAR BORÉAL *Fulmarus glacialis* (191/13)

Le Fulmar boréal est observé cette année à de nombreuses reprises au printemps (en avril, mai et juin) longeant les falaises de la côte sauvage, par exemple 1 individu près de la carrière les 07/04, 16 et 17/04, 05 et 06/06 (V.A. & J.-M.G.). À noter aussi 2 individus au passage devant le phare des Corbeaux le 28/04 (J.-M.G. & X.H.). Ensuite, 1 individu est observé pointe du But les 22/06 (M.-P. & X.H.) et 21/07 (M.-P. & X.H., J.-M.G.) puis 1 individu devant la pointe des Corbeaux le 22/07 (M.-P. & X.H.). Enfin, 1 individu est noté devant la pointe du But le 24/08 correspondant probablement au passage postnuptial (Q.G. & J.M.).



PUFFIN CENDRÉ/DE SCOPOLI *Calonectris borealis/diomedea* (256/110)

Nouvelle année exceptionnelle pour le Puffin cendré/de Scopoli dans les eaux de l'île. Les premiers oiseaux sont notés le 21/07 avec 2 individus depuis la pointe du But et plus de 11 individus devant la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H., J.-M.G.). Ensuite, l'espèce est très régulièrement observée jusqu'à la fin du mois d'août où le nombre d'oiseaux augmente avec par exemple plus de 54 individus le 24/08 au passage devant la pointe du But (J.-M., M.-P. & X.H.). Mais c'est en septembre que les chiffres explosent avec par exemple plus de 500 individus au passage devant la pointe des Corbeaux le 12/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) et surtout plus de 3 300 individus (un nouveau record) en 1h20 le 13/09 (M.-P. & X.H.) et plus de 1 000 individus le 14/09 (B.I.) devant la pointe du Châtelet et encore plus de 1 200 individus le 21/09 devant la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Les observations se poursuivent en octobre avec par exemple plus de 273 individus devant la pointe du But le 08/10 (F.P.) et 100 individus au passage en 1h30 devant la pointe des Corbeaux le 16/10 (V.A. & J.-M.G. & O.Pe.).



a

PUFFIN FULIGINEUX *Ardenna grisea* (210/26)

L'espèce est observée cette année du 07/07 - 1 individu au passage devant la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.) - au 25/10 - 1 individu au passage en 45 minutes devant la pointe du But et 1 individu devant la pointe des Corbeaux (F.P.). Ces observations ne concernent qu'un à trois individus à chaque fois, excepté 4 individus au passage en 1h20 devant la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.) et devant la pointe du But le 29/09 (L.V. & M.P.) et le 08/10 (F.P.).

PUFFIN MAJEUR *Ardenna gravis* (48/28)**

Nouvelle année exceptionnelle également pour le Puffin majeur dans les eaux de l'île. Le premier oiseau, précoce, est observé dès le 07/07 au passage devant la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). L'espèce est ensuite régulièrement observée jusqu'au 16/10 - encore plus de 20 individus au passage devant la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Les maxima, très importants cette année, sont observés en septembre avec par exemple plus de 80 individus devant la pointe des Corbeaux le 12/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) mais surtout plus 470 individus en 1h20 depuis la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.). Toutes ces données ont été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85).

b



Puffin majeur & Puffin cendré

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* (430/48)

Le Puffin des Anglais est beaucoup observé cette année de mars - 10 premiers oiseaux le 31/03 devant la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H., B.I.) - à octobre - dernier oiseau le 25/10 au passage en 45 minutes devant la pointe du But (M.-P. & X.H.). Il s'agit le plus souvent de 1 à 15 individus. Les maxima sont notés en avril - par exemple 118 individus au passage en 40 minutes le 01/04 (M.-P. & X.H., B.I.) - et en octobre - par exemple 26 individus devant la pointe du But le 08/10 (F.P.).

**PUFFIN DES BALÉARES *Puffinus mauretanicus* (1809/173)**

Le Puffin des Baléares reste le puffin le plus commun dans les eaux de l'île, même si cette année il est largement devancé en nombre par le Puffin cendré/de Scopoli. L'espèce y est observée à partir d'avril - 1 individu au passage devant la pointe des Corbeaux le 23/04 (M.-P.H.). Le nombre d'oiseaux augmente ensuite progressivement pour atteindre un maximum en juin et juillet avec par exemple plus de 1 530 individus au passage en 1h40 devant la pointe des Corbeaux le 22/07 (M.-P. & X.H.) et plus de 526 individus au passage depuis le phare des Corbeaux le 23/07 (J.M.). Les observations se poursuivent d'août à octobre avec encore de beaux passages - plus de 165 individus au passage en 1h20 devant la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.) et plus de 150 individus devant la pointe des Corbeaux le 16/10 (V.A. & J.-M.G.). Une seule observation en hiver avec 1 individu devant la pointe du Châtelet le 24/12 (J.M.).

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (5532/454)

L'espèce, commune, est observée toute l'année autour de l'île. Les maxima sont notés lors du passage postnuptial avec par exemple plus de 345 individus au passage en 1h20 devant la pointe du Châtelet le 13/09 (M.-P. & X.H.), plus de 420 individus le 08/10 (F.P.), plus de 200 individus en 40 minutes le 13/10 (M.-P. & X.H.) et plus de 370 individus en 45 minutes le 25/10 (M.-P. & X.H.) au passage devant la pointe du But. À noter cette année un nombre important d'oiseaux dans les eaux de l'île en début d'été : plus de 230 individus devant la pointe du But le 10/07 (B.I.), plus de 200 individus le 11/07 (M.-P.H. & B.I.) et plus de 210 individus le 12/07 (M.-P.H. & J.-M.G.) devant la pointe des Corbeaux.

CORMORAN HUPPÉ *Phalacrocorax aristotelis* (1864/242)

Le Cormoran huppé est observé tout au long de l'année autour de l'île et le nombre d'observations est en augmentation. Le Cormoran huppé s'est reproduit cette année sur la côte sauvage avec au moins 1 couple, mais sans doute 2, produisant chacun 3 jeunes à l'envol (Hindermeyer & Hindermeyer, 2024). Les maxima sont notés au printemps et après la reproduction sur la côte sauvage avec 15 individus ensemble le 16/03 (M.-P. & X.H.) et 22 individus le 27/06 (M.-P.H.) entre les Soux et la pointe de la Tranche. L'espèce est également présente en hiver avec au moins 14 individus dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.).




GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* (7132/690)

L'espèce est observée toute l'année autour de l'île où elle est commune. Au moins 65 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Les groupes les plus importants sont notés en automne - maximum 32 individus en vol devant la pointe des Chancelles le 04/10 (B.I.). Le Grand Cormoran ne niche pas sur l'île mais est bien présent en période de reproduction. Ainsi, cette année 2 individus (un couple ?) sont observés en période de reproduction entre les Soux et la pointe de la Tranche (dans le même secteur que le couple de Cormoran huppé nicheur). L'espèce est donc à surveiller dans les années qui viennent.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (41/13)

Plusieurs données cette année, uniquement à l'automne, pour cette espèce de plus en plus régulière sur l'île. Le 08/09 1 individu de 1^{ère} année, qui semble épuisé, est découvert posé sur la plage du Marais Salé le matin (M.-H.J.) et est encore présent en fin de journée (M.-P. & X.H., J.-M.G.). Après un rapide passage sur la plage de la Tourette (M.-P. & X.H.), l'oiseau est retrouvé dans les marais de la Guerche le 09/09 (S.K.) et y restera jusqu'au 13/09 (M.-P. & X.H., O.Pe.). Ensuite, plusieurs observations d'oiseaux en vol se sont succédées de septembre à novembre : 2 adultes arrivent en vol et se posent sur les rochers de la pointe des Corbeaux le 21/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.), 9 individus en vol au-dessus de la saulaie des Poupounes (M.-P. & X.H.) puis du phare des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.) le 13/10, 3 individus au-dessus de la plage du Loubinou le 18/10 (A.-G.G.) et 2 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 08/11 (M.-P. & X.H.).



BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax* (9/1)

Après une année blanche, une nouvelle donnée de Bihoreau gris qui reste encore rare sur l'île d'Yeu : 1 individu posé au Marais Salé le 25/04 (A. & B.N.). L'espèce est sans doute plus commune que ces quelques observations ne le laissent penser.

Il s'agit seulement de la 10^{ème} mention connue de l'espèce sur l'île après la mention de mars 1925 de G. Guérin (1930), celle de 1970 de P. Paulian, rapportée par C. Bugeon (2013), dans les marais de la Croix, celle du 04/05/2012 dans les marais de la Guerche (F. Portier), celles d'un individu de 2^{ème} année les 14, 20 et 23/04/2015 dans les marais de la Guerche (S. Desmarest, V. Auriaux, M.-P. & X. Hindermeyer), celle de 2 adultes en vol à Port-Joinville le 27/08/2021 (J.-M. Guilpain), celle d'un individu enregistré en migration nocturne au-dessus de la rue Jean Yole le 09/10/2021 (M. Faveyrial) et celle d'un individu en vol et posé le 25/03/2022 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer, S. Rouillé, V. Auriaux & J.-M. Guilpain).

HÉRON GARDEBŒUFS *Bubulcus ibis* (125/9)

Le Héron gardebœufs est observé cette année aux deux passages. Au printemps, l'espèce est notée en avril et mai - par exemple 4 individus en vol à Ker Viroux le 06/04 (M.-P.H.) et 1 individu en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 25/05 (M.-P. & X.H.). A l'automne, les observations ont lieu en septembre et octobre - par exemple 1 individu dans les marais de la Guerche le 15/09 (M.-P. & X.H.) et 1 individu posé sur un cyprès à Ker Châlon le 15/10 (M.-P.H. & O.Pe.). Le maximum est noté le 18/05 avec plus de 15 individus en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Pas d'observation en hiver. L'espèce, de plus en plus régulière sur l'île, pourrait peut-être un jour prochain s'y installer.

HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea* (3463/309)

L'espèce est présente en petit nombre toute l'année sur les plages et dans les marais de la côte nord de l'île. Pour la sixième année consécutive la reproduction du Héron cendré sur l'île, qui était annuelle, n'a pas pu être confirmée même si des oiseaux sont présents pendant toute la période de reproduction. On note un petit passage à l'automne avec par exemple 8 individus en migration active au-dessus de la pointe des Corbeaux le 21/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) et au moins 8 individus en migration active au-dessus de la plage des Iliaux le 29/09 (M.F.).

**HÉRON POURPRÉ *Ardea purpurea* (58/2)**

Deux observations de Héron pourpré cette année au printemps et à l'automne : 1 individu de 2^{ème} année le 28/04 (X.H. & J.-M.G.) et 1 individu de 1^{ère} année le 09/10 (F.P.) dans les marais de la Croix.

GRANDE AIGRETTE *Ardea alba* (29/6)

Après une année blanche, retour de l'espèce sur l'île au printemps (mai) et en automne (octobre) : 1 individu en vol puis posé dans les prairies des Perdrettes le 11/05 (J.M.), 1 individu en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 18/05 (M.-P. & X.H.) et 1 individu posé dans les marais de la Guerche le 21/05 (M.-P.H.) puis 3 individus en vol au-dessus du terrain d'aéromodélisme le 03/10 (M.-P.H.), 1 individu en vol au-dessus de la saulaie des Poupounes le 13/10 (M.-P. & X.H.) et 3 individus en vol depuis le phare des Corbeaux le 23/10 (J.Ma. & J.-M.G.).

**AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta* (5186/519)**

L'espèce est présente quasiment toute l'année sur les plages et dans les marais de la côte nord de l'île (principalement ceux de la Guerche), plus rarement sur la côte sauvage et à l'intérieur de l'île (dans les prairies). Pas d'indice de reproduction. Les oiseaux sont le plus souvent dispersés sur l'île et il est donc presque impossible d'avoir une idée exacte de l'effectif présent simultanément. Au moins 6 individus hivernants sont dénombrés sur l'île le 07/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Les plus gros groupes notés cette année sont seulement de 10 individus en vol au-dessus de Ker Aura le 07/03 (V.A. & J.-M.G.) et de 8 individus posés ensemble dans les marais de la Guerche le 08/11 (M.-P. & X.H.).



BALBUZARD PÊCHEUR *Pandion haliaetus* (23/11)

Beaucoup d'observations cette année aux deux passages. Au printemps, 1 individu est noté en vol depuis la dune de la Grande Conche puis de la pointe des Corbeaux le 14/04 (J.-M.G. & X.H.), 1 individu au-dessus du terrain de motocross le 20/04 et 1 individu au-dessus de la plage du Marais Salé le 04/05 (V.A. & J.-M.G.). A l'automne, le passage est encore plus marqué avec 1 individu immature en vol le 08/09 depuis la Pierre des Amporelles (V.A. & J.-M.G.) puis au-dessus des prairies des Perdrettes (M.-P. & X.H.), 1 individu depuis la dune de la Grande Conche le 10/09 (M.-P. & X.H., O.Pe.), 1 individu depuis la pointe du Châtelet le 14/09 (B.I.), 1 mâle adulte au-dessus des Chiens Perrins le 29/09 (L.V. & M.P.), 1 individu au-dessus de la pointe des Chancelles le 04/10 (B.I.) et 1 individu depuis la mare des Broches le 05/10 (M.-P. & X.H.). Le Balbuzard pêcheur, même s'il reste peu commun sur l'île, est désormais régulier aux deux passages.

**BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus* (224/20)**

L'espèce est principalement observée cette année lors du passage postnuptial du 28/07 - 1 individu au-dessus de la plage de la Grande Conche (V.A & J.-M. G.) au 26/09 - 1 individu au-dessus des marais de la Guerche (M.-P.H.). Le maximum d'oiseaux notés ensemble est seulement de 3 au-dessus des marais de la Guerche le 10/09 (M.-P. & X.H., O.Pe.). Toutes les observations concernent des oiseaux, adultes ou de 1^{ère} année, en migration active excepté 1 individu de 1^{ère} année posé et se nourrissant à Saint-Sauveur le 10/09 (H.L.). Enfin, une observation à une date atypique : 1 individu en vol au-dessus du complexe sportif le 07/06 (J.-M.G.)



Bondrée apivore



Buse variable

AIGLE BOTTÉ *Hieraaetus pennatus* (7/1)**

Nouvelle observation pour cette espèce qui reste très rare sur l'île mais à une date atypique: 1 individu de forme claire le 08/06 aperçu au niveau de la plage des Tchinettes depuis la pointe des Corbeaux, puis retrouvé au-dessus du village de la Croix (J.-M.G.). L'espèce n'avait plus été notée sur l'île depuis 5 ans. Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 8^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un individu de forme claire le 13/09/1992 au dessus du village de la Croix (X. Hindermeyer & Centre d'études biologiques de Chizé), d'un individu de forme claire le 31/08/2007 au dessus des marais de la Guerche, d'un autre de forme sombre le 16/09/2007 au dessus du Marais Salé (X. Hindermeyer), d'un individu de forme claire le 29/08/2011 au dessus des Violettes (A. Sournia), d'un individu de forme claire le 02/09/2013 au dessus du village de la Croix (F. Portier), d'un individu de forme claire posé sur un cyprès le 06/09/2014 dans les prairies des Perdrettes (M.-P. & X. Hindermeyer) et d'un individu de forme sombre le 03/09/2019 au-dessus de la lande des Sabias (F. Halligon).

**ÉPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus* (1943/150)**

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit (plusieurs indices de reproduction de nouveau cette année). Même s'il est souvent difficile de distinguer les migrants des oiseaux locaux, quelques oiseaux notés en septembre et octobre sont très probablement des oiseaux migrants. À noter, 1 individu capturant un Chevalier guignette le 13/04 près de la pointe des Corbeaux (X.H., V.A. & J.-M.G.).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (2940/167)

L'espèce peut être observée toute l'année sur l'île mais elle y est toutefois beaucoup moins fréquente en hiver. Au moins quatre couples ont tenté de se reproduire cette année sur l'île notamment dans les marais de la Guerche, de la Gorelle et sur la côte sauvage, près du Grand Phare. Le succès reproducteur a été très mauvais, probablement à cause des conditions climatiques (marais inondés), avec 0 ou 1 seul jeune à l'envol - par exemple 1 1^{ère} année le 13/07 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Quelques-uns des oiseaux notés à l'automne sont très probablement des migrants sans qu'il soit toujours possible de les distinguer.

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* (87/1)

Une seule observation de Busard Saint-Martin cette année à l'automne : 1 mâle au-dessus du vallon de l'aérodrome le 21/09 (M.-P., A. & X.H.).

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus* (20/1)

Une nouvelle observation cette année lors du passage prénuptial : un mâle adulte au-dessus des marais de la Croix le 13/04 (X.H.). L'espèce reste rare sur l'île.

MILAN NOIR *Milvus migrans* (51/1)

Le Milan noir, peu commun sur l'île mais de plus en plus régulier, est observé de nouveau cette année lors du passage prénuptial : 1 individu au-dessus du Grand Phare le 12/04 (X.H.).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (1216/203)

La Buse variable peut désormais être observée toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Beaucoup de données de nouveau cette année, y compris au printemps. Au moins 3 couples se sont reproduits sur l'île près des marais de la Croix, dans les prairies des Perdrettes, près du Grand Phare mais sans doute également un quatrième entre la Bergerie et les Loges. L'espèce est également observée au passage au printemps - 7 individus au-dessus de Ker Pissot le 03/03 (B.I.) - et à l'automne avec par exemple 3 individus au-dessus de Ker Châlon (Mayes) le 18/10 (M.-P.H.).

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba* (201/17)

L'Effraie des clochers, nicheuse sur l'île, est notée en janvier, de mars à juillet puis d'octobre à décembre - par exemple 1 individu près des Nates les 01/01 et 19/03 (R.Gi.), 1 individu à la Citadelle le 11/05 (J.M.), 1 individu plage des Sabias le 01/06 (S.D.) et 1 individu près de l'anse du Jars le 10/10 (J.-M.G.). Aucun indice certain de nidification cette année.


**PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (322/63)**

Le Petit-duc scops fait désormais partie de l'avifaune nicheuse de l'île d'Yeu (Hindermeyer & Hindermeyer, 2020). Il y est présent cette année d'avril à août. Les premiers chanteurs sont entendus le 06/04 avec 2 individus (1 mâle et 1 femelle) route de Ker Aura, 1 mâle près des Nates et 1 autre mâle près du marais Mottou et 1 mâle près du terrain d'aéromodélisme (M.-P. & X.H.). Il est difficile de dire exactement combien de couples se sont reproduits sur l'île cette année mais on peut l'estimer à 8 au moins notamment près de Saint-Sauveur, de la Bergerie et dans le secteur des Nates-marais Mottou. D'autres chanteurs - maximum 9 chanteurs comptés sur l'île le 17/05 (M.-P. & X.H., J.M.) - sont notés autour de Ker Bossy, près de la Citadelle, dans les marais de la Croix, rue Georges Clemenceau et près du Grand Phare, signe de la progression constante et sans doute de l'installation de nouveaux couples sur l'île. L'espèce est vue régulièrement jusqu'à la fin du mois d'août - dernier oiseau entendu le 23/08

près des Violettes (L.So.). Il est très probable que l'espèce progresse encore dans les années à venir mais le facteur limitant peut devenir le manque de sites de nidification favorables. De nouveaux nichoirs pourraient donc être installés même si ceux qui avaient été posés en 2016 n'ont jamais été occupés.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus* (130/21)

Beaucoup d'observations de Hibou moyen-duc cette année sur l'île. De nombreuses preuves de reproduction (au moins 7) sont apportées avec le plus souvent des cris de jeunes - par exemple 2 jeunes entendus le 24/05 entre le Grand Phare et Ker Chauvineau, 2 adultes et au moins 1 jeune entendu le 06/06 près de la carrière (V.A. & J.-M.G.). Il semble donc que le nombre de couples reproducteurs sur l'île soit revenu à la normale (à confirmer toutefois dans les années qui viennent). Une donnée en automne avec 1 individu posé sur une falaise près de la Pierre des Amporelles le 28/10 (N.P.) et une donnée en hiver (la seconde seulement depuis le début du suivi) avec 1 individu en vol à la tombée de la nuit près du terrain d'aéromodélisme le 14/12 (M.-P. & X.H.). Une prospection en hiver pour rechercher d'éventuels dortoirs serait peut-être à réaliser l'année prochaine.



HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (70/3)

Plusieurs observations cette année, classiquement lors du passage postnuptial : 1 individu sur la dune de la Grande Conche le 18/10 (L.G. & O.C., V.A. & J.-M.G.), 1 individu en vol sur la côte sauvage entre la Croix et les Tchinettes 01/11 (J.M.) et 2 individus en vol depuis le phare des Corbeaux le 10/11 (V.A. & J.-M.G.).

HUPPE FASCIÉE *Upupa epops* (272/21)

L'espèce est observée cette année aux deux passages pré (mars-avril) et postnuptial (août-septembre). Il s'agit le plus souvent d'oiseau isolé sauf 2 individus ensemble les 07 et 08/04 posés dans un jardin près du Caillou Blanc (M.-L.S.). Au printemps, le passage débute le 23/03 avec par exemple 1 individu au Marais Salé (R.Gi.) et se termine le 25/04 avec 1 individu au Marais Salé (J.M.). Pas de preuve de reproduction sur l'île cette année même si des observations ont lieu pendant la période de reproduction - par exemple 1 individu le 06/06 plage des Vieilles (P.Pa.). À l'automne, quelques observations en août et septembre - 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 07/08 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu près des Sabias le 21/08 (J.M.) et 1 individu à la Croix le 01/09 (A.G.) - témoignent d'un petit passage postnuptial.

**MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis* (1372/148)**

Le Martin-pêcheur d'Europe est observé cette année de janvier à avril - dernier individu dans les marais de la Guerche le 12/04 (X.H.). L'espèce réapparaît dès le 13/07 avec 1 individu plage des Ovaires (M.-P. & X.H.). La très grande majorité des observations, qui ne concernent le plus souvent qu'un seul individu (parfois deux), est réalisée sur la côte nord de l'île et dans les marais. Les observations sur la côte sauvage sont plus rares - 1 individu à la Meule le 21/09 (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.) et 1 individu plage des Vieilles le 17/10 (V.A. & J.-M.G.). Pas d'indice de reproduction.

GUÊPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (21/2)

Le Guêpier d'Europe, qui reste rare sur l'île, est observé de nouveau cette année : 1 individu en vol au-dessus des marais de la Croix le 24/05 (M.-P. & X.H.) et 2 individus posés sur un fil près de la mare des Broches le 31/05 (Y.B.).

**TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* (158/13)**

Le Torcol fourmilier est assez peu observé de nouveau cette année et uniquement lors du passage postnuptial. Ce dernier s'étale du 26/08 - 1 individu dans les prairies des Perdrettes (M.-P.H.) - au 23/09 - 1 individu au complexe sportif (V.A. & J.-M.G.).

PIC ÉPEICHE *Dendrocopos major* (203/22)

Le Pic épeiche est noté cette année uniquement d'août - 1 individu le 18, 21 et 22/08 dans les marais de la Croix (Q.G.) - à décembre. Il s'agit à chaque fois d'un seul individu observé principalement dans les marais de la Croix, de la Guerche - 1 individu les 20/08 (Q.G.), 02/11 (M.-P. & X.H.) et 15/12 (V.A. & J.-M.G.) - au Marais Salé, à la Bergerie et dans le vallon du Jars. Toujours pas de preuve de reproduction sur l'île.

**FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus* (5015/395)**

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Pas de preuve formelle de reproduction cette année. Pas de passage marqué, ni au printemps, ni à l'automne.

FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius* (314/24)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 individu est noté le 01/03 près du bois de la Citadelle (V.A. & J.-M.G.) et 1 mâle posé le 15/03 près du phare des Corbeaux (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, débute le 29/09 - 1 individu pointe des Corbeaux (M.F., J.V & X.H.) et 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) - et se poursuit jusqu'au 10/11 avec 1 femelle capturant un Pipit farlouse près de l'aérodrome (M.-P. & X.H.). Deux observations en hiver : 1 femelle entre l'anse des Fontaines et l'anse des Soux le 06/01 (M.-P. & X.H.) et 1 individu près de Caillou Blanc le 22/12 (J.M.). À noter l'observation remarquable de 2 individus se disputant une Océanite tempête le 07/10 depuis la pointe du But (F.P.).

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo* (1027/88)

Le Faucon hobereau est présent sur l'île à partir du mois d'avril - premiers individus le 21/04 notamment 2 entre le Grand Phare et Ker Chauvineau (V.A. & J.-M.G.) et 2 depuis la plage des Ovaires (L.Pa.) - jusqu'au mois d'octobre - dernier oiseau le 13/10 au-dessus de la dune de la Grande Conche (S.Ro.). Pas d'indice certain de reproduction noté même si au moins 2 couples se sont très probablement reproduits de nouveau sur l'île cette année, notamment dans les marais de la Croix et sur la côte sauvage - 3 individus dans les marais de la Croix le 25/08 (V.A. & J.-M.G.). Quelques-uns des oiseaux notés à l'automne sont très probablement des migrateurs sans qu'il soit toujours possible de les distinguer - par exemple 6 individus à Ker Viroux le 15/09 (M.-P. & X.H.) et 4 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 01/10 (B.I.).

FAUCON PÈLERIN *Falco peregrinus* (87/7)

Le Faucon pèlerin est observé cette année au printemps et à l'automne. Au printemps, 1 femelle adulte est découverte en vol depuis Chiron Moreau le 28/04 (M.-P. & X.H.) et 1 individu est noté depuis la plage de Ker Châlon le 28/05 (B.I.). À l'automne, 1 individu est noté dès le 21/08 depuis les prairies des Perdrettes (M.-P.H.), 1 1^{ère} année depuis la dune de la Grande Conche le 15/09 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu depuis la plage des Sapins le 14/10 (P.B.), 1 femelle au-dessus de Port-Joinville le 25/10 (M.-P. & X.H.) et 1 individu au-dessus de Ker Châlon (Mayes) le 18/11 (M.-P.H.).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR *Lanius collurio* (80/2)

La Pie-grièche écorcheur, qui ne niche plus sur l'île depuis plus de 20 ans, n'est observée cette année que lors du passage postnuptial : 1 individu de 1^{ère} année est découvert dans les prairies des Perdrettes (J.M. & M.-P.H.) et un second individu de 1^{ère} année près des Petits Fradets (M.-P.H.) le 27/08.

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (54/15)****

Après deux années d'absence, la Pie-grièche à tête rousse est observée de nouveau cette année au printemps. Un mâle *senator* est découvert le 06/04 dans les prairies des Perdrettes (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.). Il sera revu le lendemain (M.-P.H.) alors qu'un autre mâle *senator* est découvert près de la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Enfin, 1 femelle *senator* est découverte le 17/04 toujours dans les prairies des Perdrettes (X.H.). Elle y sera revue jusqu'au 22/05 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G., B.P. & T.Y., J.S. & J.M., S.Me.) soit le plus long séjour jamais noté de cette espèce sur l'île. Ces données ont été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus* (135/6)

L'espèce n'est observée cette année que lors du passage prénuptial du 30/04 - 1 individu au complexe sportif (J.-M.G.) - au 22/05 - 2 individus (1 mâle et 1 femelle) près de la décharge (M.-P.H. & J.-M.G.). Pas de passage marqué notamment d'individus en migration active. Aucun indice certain de nidification.

GEAI DES CHÊNES *Garrulus glandarius* (14/1)

Une nouvelle observation de Geai des chênes sur l'île à l'automne : 1 individu près du terrain d'aéromodélisme le 28/09 (M.F.). L'espèce reste rare sur l'île.

PIE BAVARDE *Pica pica* (2630/240)

L'espèce, nicheuse sur l'île, y est observée toute l'année. Le nombre maximum d'individus observés ensemble est de 12 dans les prairies des Perdrettes le 06/09 (M.-P. & X.H.). Le nombre de couples nicheurs, en nette diminution depuis quelques années, semble désormais stabilisé mais avec un effectif faible, autour de 12 à 15 couples.

CHOUCAS DES TOURS *Coloeus monedula* (12/2)

Après 8 années d'absence, deux nouvelles observations de Choucas des tours sont faites cette année : 1 individu posé près de la carrière le 06/11 et 1 individu (le même ?) en vol au-dessus du phare des Corbeaux le 13/11 (J.-M.G.). L'espèce reste rare sur l'île.



CORNEILLE NOIRE *Corvus corone* (4331/457)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les plus gros groupes sont observés en automne avec par exemple 24 individus dans les prairies des Perdrettes le 28/09 (M.-P. & X.H.) et 24 individus les 16 et 18/11 plage des Sapins (M.-P. & X.H.).

MÉSANGE BLEUE *Cyanistes caeruleus* (3191/195)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés dès le 19/05 à Ker Châlon (M.-P. & X.H.). À l'automne les observations concernent également des oiseaux migrants.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major* (3618/317)

L'espèce est commune (désormais plus encore que la Mésange bleue) et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés dès le 18/05 dans les prairies des Perdrettes (M.-P. & X.H.). À l'automne les observations concernent également des oiseaux migrants.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea* (109/5)

L'espèce est peu notée sur l'île cette année et uniquement lors du passage postnuptial du 11 au 27/10. Le maximum est noté le 23/10 avec plus de 15 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis* (1851/187)

L'espèce ne niche plus sur l'île depuis plusieurs années. L'Alouette des champs est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial est surtout noté en mars avec par exemple plus de 250 individus sur la dune de la Grande Conche le 07/03 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial, assez peu marqué, a lieu en octobre et novembre - plus de 100 individus le 23/10 et plus de 80 individus le 05/11 au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.M.). Quelques oiseaux sont présents en hiver avec par exemple 1 individu sur l'héliport à Port-Joinville le 15/12 (M.-P. & X.H.).

**ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (57/1)****

L'espèce n'est observée à nouveau cette année que lors du passage prénuptial : 1 individu sur la dune de la Grande Conche le 07/04 (J.-M.G.). Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation vendéen (CH85).



HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* (547/45)

L'espèce est notée en petit nombre aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - premiers oiseaux dans les marais de la Guerche (4) et au-dessus de la dune de la Grande Conche (2) le 07/03 (V.A. & J.-M.G.) - et se poursuit en avril et en mai - 10 individus dans les marais de la Guerche le 01/05 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial débute dès juillet - 4 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 28/07 (J.M.) - et se poursuit jusqu'en octobre - dernier individu au-dessus de la dune de la Grande Conche le 11/10 (V.A. & J.-M.G.).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica* (6310/459)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - première le 14/03 dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) - et se poursuit en avril et mai - 19 individus au-dessus de la plage des Ovaires le 15/05 (S.D.). Le passage postnuptial débute en juillet et se poursuit jusqu'en octobre - par exemple plus de 70 individus posés à Ker Chauvineau le 26/08 (M.-P.H.) et plus de 300 individus au passage en 2h30 au-dessus de la Grande Conche le 15/09 (V.A. & J.-M.G.). Le dernier oiseau est noté le 07/11 en migration active au-dessus du vallon du Jars (M.-P. & X.H.).



Juvénile



Adulte

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbicum* (1006/75)

L'espèce est nicheuse en très petit nombre sur l'île. Elle y est observée également aux deux passages. Le passage prénuptial est noté de mars à mai - premier oiseau le 27/03 dans les marais de la Guerche (V.A. & J.-M.G.). Il est surtout marqué en mai avec par exemple plus de 95 individus le 20/05 au passage en 45 minutes au-dessus des marais de la Guerche (V.A. & J.-M.G.) et plus de 70 individus le

22/05 au passage au dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P.H. & J.-M.G.). L'Hirondelle de fenêtre s'est reproduite de nouveau sur l'île avec deux sites de nidification différents à Port-Joinville (1 seul nid occupé le 12/06 (M.-P.H.)) et un autre près de la Galiote (1 nid occupé). Le passage postnuptial, presque inexistant, débute en août, se poursuit en septembre - 8 individus au-dessus de la rue Jean Yole le 21/09 (V.A. & J.-M.G.) - et s'achève en octobre - 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche le 10/10 (F.P.).

HIRONDELLE ROUSSELIN *Cecropis daurica* (9/1)**

Après une année blanche, une nouvelle observation d'Hirondelle rousseline sur l'île au printemps : 1 individu en migration avec des Hirondelles de fenêtre au-dessus du Marais Salé le 17/04 (J.-M.G.). L'oiseau sera revu quelques minutes plus tard dans les marais de la Guerche. Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation vendéen (CH85). L'espèce semble de plus en plus régulière au printemps.

Il s'agit seulement de la 10^{ème} mention de l'espèce sur l'île après l'observation d'un individu le 05/05/2012 au dessus des marais de la Guerche (X. Hindermeyer), d'un autre le 30/10/2012 au dessus de la dune de la Grande Conche (F. Portier), d'un individu le 19/04/2014 en vol autour du phare des Corbeaux (M. Faveyrial, L. Chaillot et al.), d'un individu en migration active le 22/04/2015 près du Chiron Moreau (M.-P., A. & X. Hindermeyer), d'un adulte le 19/05/2016 dans les marais de la Guerche (F. Portier), d'un individu au-dessus des marais de la Guerche le 05/06/2017 (M.-P. & X. Hindermeyer), de 2 individus le 01/05/2021 et d'un individu le 18/05/2021 au-dessus de la dune de la Grande Conche (V. Auriaux & J.-M. Guilpain) puis d'un individu le 20/04/2022 au-dessus de la pointe des Corbeaux (V. Auriaux & J.-M. Guilpain, S. Rouillé).



BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti* (6448/542)

La Bouscarle de Cetti est un des oiseaux les plus typiques de l'avifaune islaïse aussi bien en milieu humide qu'en milieu plus sec. Elle peut y être observée toute l'année (moins de données en hiver).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus* (2031/111)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés à partir du 18/05 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). À l'automne les observations concernent également des oiseaux migrateurs - plus de 20 individus sur la dune de la Grande Conche le 05/11 (V.A. & J.-M.G.).



a- Juvénile

b- Adulte

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli* (9/1)**

Une nouvelle observation de Pouillot de Bonelli, toujours lors du passage postnuptial : 1 individu dans les marais de la Croix le 31/08 (J.-M.G.). L'espèce reste rare sur l'île. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 10^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celles du 20/09/1987 (D. Desmots), du 19/04/2006 dans les marais de la Croix (M.-P. & X. Hindermeyer), du 30/08/2007 dans les marais de la Guerche (M.-P., A. & X. Hindermeyer), du 28/08/2010 en bordure du camping (M.-P., A. & X. Hindermeyer), celle du 28/08/2015 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P., A. & X. Hindermeyer), celle du 13/08/2017 dans le bois des Sapins (S.Reyt), celles des 29 et 31/08/2022 au complexe sportif (J.-M. Guilpain) et celle du 30/08/2022 dans les marais de la Guerche (X. Hindermeyer).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (363/18)

Après trois années avec un nombre très faible de données, retour à une année plus classique avec plus d'une dizaine d'oiseaux différents cet automne. Le premier oiseau est découvert le 01/10 dans la saulaie de Ker Châlon (M.-P.H.) et le passage se poursuit jusqu'au 01/11 avec 3 individus différents, 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.), 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche et 1 individu dans les jardins près de la pointe des Corbeaux (J.M.). À noter cette année l'observation d'un individu intrigant dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 13/10 (J.-M.G.) avec le plumage d'un Pouillot à grands sourcils mais entendu au même moment un cri de Pouillot de Hume. L'espèce n'est plus soumise à homologation sur l'île d'Yeu depuis le 1^{er} janvier 2018, excepté à partir du 1^{er} novembre.



POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (3/3)*

Année exceptionnelle pour le Pouillot brun, très rare sur l'île, avec 3 individus différents cet automne : 1 individu près du Grand Phare le 22/10 (J.Ma.), 1 individu près du phare des Corbeaux le 23/10 (J.Ma., V.A. & J.-M.G.) et 1 individu près de la pointe du But le 11/11 (J.-M.G., M.-P. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).

Il s'agit seulement des 4 à 6^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celle d'un individu les 23 et 25/10/2005 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F. Portier & X. Hindermeyer) et d'un individu le 23/10/2020) près du phare des Corbeaux (G. Centrais, M.-P. Hindermeyer, B. Isaac, V. Auriaux & J.-M. Guilpain).

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus* (2663/198)

L'espèce est classiquement observée aux deux passages. Le passage prénuptial, peu marqué, s'étale du 17/03 - 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) - au 01/05 avec 1 individu dans les marais de la Guerche (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial, plus net, débute le 19/08 avec plus de 2 individus dans les prairies des Perdrettes (J.M.) et se poursuit jusqu'au 04/10 avec 2 individus près de la mare des Broches et 2 individus au Marais Salé (M.-P. & X.H.). Les maxima sont notés début septembre avec par exemple plus de 30 individus autour de la pointe du But le 06/09 (V.A. & J.-M.G.). Enfin, 1 individu présentant les caractères de la sous-espèce *Phylloscopus trochilus acredula* a été observé cette année : 1 individu le 20/08 au complexe sportif (J.-M.G.).



Pouillot fitis



Pouillot véloce

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita* (8058/757)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Un petit passage prénuptial est noté en mars avec par exemple plus de 15 individus au complexe sportif le 09/03 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial, très peu marqué cette année, est surtout noté en octobre et novembre avec par exemple plus de 10 individus autour du phare des Corbeaux le 01/11 (J.M.). Enfin, deux individus présentant les caractères de la sous-espèce sibérienne *Phylloscopus collybita tristis* ont été observés cette année : 1 individu au Marais Salé le 30/03 (M.-P. & X.H.) et 1 individu dans les marais de la Guerche le 09/11 (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (117/5)

Très peu d'observations de nouveau cette année et uniquement lors du passage postnuptial : 1 à 3 individus dans les marais de la Croix du 18 au 23/08 (Q.G.).



ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus* (517/37)

L'espèce est observée sur l'île d'avril - 1 chanteur dans les marais de la Croix le 23/04 (J.M.) - à novembre - 1 individu très tardif le 16/11 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H., J.-M.G.). Quelques oiseaux sont observés en mai - par exemple 1 individu près du phare des Corbeaux le 10/05 (J.M.) et 1 individu au Marais Salé le 21/05 (M.-P.H.) - correspondant probablement encore à des migrateurs. Comme tous les ans, quelques oiseaux se sont reproduits dans les marais de la Croix (au moins 3 couples). Les migrateurs postnuptiaux sont notés dès le mois d'août - par exemple 2 individus dans les prairies des Perdrettes le 21/08 (J.M.). Le passage se prolonge ensuite en septembre - avec par exemple 3 individus sur la dune de la Grande Conche le 22/09 (V.A. & J.-M.G.) - puis en octobre.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (0/1)**

Enfin une première mention de Rousserolle verderolle sur l'île d'Yeu : 1 individu le 16/10 dans le petit bois derrière la plage de la Grande Conche (J.-M.G. & O.Pe.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



HYPOLAÏS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta* (60/3)

L'espèce est observée de nouveau cette année sur l'île uniquement lors du passage postnuptial : 1 individu de 1^{ère} année dans les prairies des Perdrettes le 02/09 (X.H.) puis 1 individu à Ker Bossy

(B.I.) et 1 individu de 1^{ère} année dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) le 14/09.

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina* (23/1)**

Une nouvelle donnée d'Hypolaïs icterine sur l'île cette année, classiquement lors du passage postnuptial : 1 individu de 1^{ère} année dans les prairies des Perdrettes le 31/08 (X.H.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla* (4432/297)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (un peu moins de données toutefois en hiver). Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer mais l'île doit sans doute en accueillir plusieurs centaines. Un petit passage est noté à l'automne avec par exemple 8 individus ensemble le 12/10 dans la saulaie de Saint-Sauveur (M.-P. & X.H.).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin* (528/49)

L'espèce est nicheuse assez peu commune sur l'île même si elle semble en augmentation ces dernières années. Ainsi, au moins 5 chanteurs sont observés le 08/05 dans la lande près du terrain de moto-cross (J.M.) et au moins 2 chanteurs dans les prairies des Perdrettes le 10/05 et à la Bergerie le 11/05 (J.M.). Le passage postnuptial est presque inexistant cette année avec par exemple 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 27/08 (M.-P.H.) et 1 individu à la Chèvrerie le 06/09 (M.-P. & X.H.).



FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis* (2534/159)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer de manière exacte et il est donc impossible de mesurer une véritable tendance toutefois l'espèce semble en diminution depuis quelques années. Le premier mâle chanteur est noté le 07/04 près de la plage de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). Un petit passage est noté à l'automne avec par exemple 13 individus entre les Loges et le vallon du Jars le 07/09 (M.-P. & X.H.). Le dernier individu est vu le 16/10 pointe de la Gournaise (L.Bar.).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1932/119)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données en hiver). Le nombre d'individus peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la rudesse de l'hiver notamment. Le nombre de couples nicheurs est en très forte baisse cette année (certainement moins d'une quarantaine) sur l'île qui accueillait environ une centaine de couples, soit la quasi-totalité de la population vendéenne (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014a). La Fauvette pitchou est donc à surveiller étroitement dans les années qui viennent, d'autant plus que l'île porte une responsabilité très importante pour la conservation de l'espèce qui est classée "vulnérable" dans la liste rouge régionale (Marchadour *et al.*, 2014).

**FAUVETTE PASSERINETTE *Curruca iberiae* (3/1)****

Enfin une nouvelle observation au printemps d'une Fauvette passerinette sur l'île : 1 mâle le 19/04 dans le vallon du Jars (J.-M.G.). L'oiseau traverse le chemin et se pose quelques secondes près de l'observateur dans un prunellier. Perdu pendant plusieurs minutes, il est retrouvé un peu plus loin dans le même secteur puis finit par sortir et s'alimente tranquillement de petites chenilles. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 4^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un mâle le 09/10/2013 dans les fougères de la dune de la Grande Conche (F. Portier), d'un mâle le 11/04/2016 à Ker Bossy (M.-P. & X. Hindermeyer, V. Auriaux) et d'un jeune mâle le 11/10/2018 pointe du Cantin (F. Portier).



ROITELET À TRIPLE BANDEAU *Regulus ignicapilla* (3926/260)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Pas de passage noté à l'automne.

ROITELET HUPPÉ *Regulus regulus* (499/38)

L'espèce n'est observée cette année en petit nombre que lors du passage postnuptial et en hiver. Les premiers oiseaux sont notés à partir du 26/10 avec 5 individus en migration rampante sur la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) et le passage se prolonge jusqu'en novembre - maximum plus de 10 individus les 02/11 (M.-P. & X.H.) et 05/11 (V.A. & J.-M.G.) sur la dune de la Grande Conche. Des oiseaux sont encore présents en hiver - 7 individus le 14/12 dans la pinède de la plage des Ovaires (J.-M.G.). Pas d'indice de reproduction.

**TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes* (3680/150)**

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle se porte très bien. Elle y est observée en nombre toute l'année.

ÉTOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris* (3672/282)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés le 22/05 plage de la Pipe (M.-P.H.). Les plus gros groupes sont observés en fin d'été - plus de 280 individus le 21/08 impasse de la Borgne (M.-P.H.).

MERLE À PLASTRON *Turdus torquatus* (371/17)

Le Merle à plastron est observé cette année en petit nombre aux deux passages. Ils ne concernent le plus souvent qu'un ou deux individus excepté 3 individus dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 07/04 (V.A. & J.-M.G.). Au printemps, les observations ont lieu du 31/03 - 1 mâle pointe du But (M.-P. & X.H., B.I.) - au 20/04 avec 1 individu sur le petit terrain de foot du complexe sportif (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial débute le 10/10 - 1 individu près de la carrière, 1 individu sur la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) et 1 femelle aux Tchinettes (F.P.) - et s'achève le 01/11 avec 1 individu chemin du Puits des Suisses et 1 individu dans le vallon de l'aérodrome (J.D.L.).

MERLE NOIR *Turdus merula* (5677/557)

L'espèce est très commune et nicheuse abondante sur l'île. Elle y est observée toute l'année avec une augmentation sensible du nombre d'individus à l'automne.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris* (474/11)

L'espèce est peu notée cette année aux deux passages et en hiver. Lors du passage prénuptial, 1 seul individu est noté posé sur la dune de la Grande Conche le 23/03 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial, plus marqué, a lieu en octobre et novembre - plus de 6 individus le 11/11 (M.-P. & X.H.) et 12 individus le 30/11 (V.A. & J.-M.G.) au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche. Enfin, une observation en hiver avec au moins 1 individu au Marais Salé le 27/01 (M.-P. & X.H.).

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus* (885/54)

L'espèce est notée cette année en janvier, mars et avril puis d'octobre à décembre. Le passage prénuptial est presque inexistant avec par exemple 5 individus posés pointe du But le 01/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial (octobre et novembre) est beaucoup plus marqué avec par exemple plusieurs centaines d'oiseaux le 27/10 (M.-P. & X.H., J.-M.G.) et plus de 513 individus le 11/11 (M.-P. & X.H.) au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche. Enfin, l'espèce est présente en petit nombre en hiver avec par exemple plus de 25 individus dans les marais de la Guerche le 15/12 et plus de 12 individus à la cueillette du Champ Rouit le 29/12 (M.-P. & X.H.).



Grive litorne



Grive mauvis

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos* (4224/218)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (un peu moins de données en hiver). Le passage prénuptial est inexistant cette année. Le passage postnuptial (octobre et novembre) est beaucoup plus marqué avec par exemple plus de 500 individus le 23/10 (V.A. & J.-M.G.) et plus de 361 individus le 08/11 (M.-P. & X.H.) au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus* (323/22)

L'espèce, nicheuse rare sur l'île, est observée cette année de mars à mai, en juillet puis en octobre et novembre. Pas d'indice certain de nidification même si l'espèce s'est très certainement reproduite sur l'île de nouveau cette année, notamment dans la pinède derrière la dépression de la dune de la Grande Conche. À l'automne le passage est peu marqué avec au maximum plus de 15 individus le 23/10 (V.A. & J.-M.G.) et 9 individus le 11/11 (M.-P. & X.H.) au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche. Pas d'observation en hiver.

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata* (916/69)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu en mai (du 09 au 24/05) avec, au maximum, plus de 10 individus dans les prairies des Perdrettes le 10/05 (J.M.). Le passage postnuptial, plus marqué, s'étale du 21/08 - 1 individu à Ker Bossy (M.-P.H.) - au 13/10 - 1 individu près de la plage de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). Il s'agit au maximum de plus de 8 oiseaux ensemble par exemple le 06/09 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Pas de preuve de reproduction sur l'île.



Gobemouche noir



Gobemouche gris

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula* (8405/868)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. On note toutefois une augmentation très nette du nombre d'oiseaux à l'automne.

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (24/1)

Après une année blanche, la Gorgebleue à miroir est de nouveau observée cette année lors du passage postnuptial : 1 individu de type femelle est découvert le 25/08 dans les marais de la Croix (J.-M.G.). L'espèce, qui reste assez rare sur l'île, doit très souvent passer inaperçue.



ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos* (78/5)

L'espèce, peu commune sur l'île, est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 individu est noté dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu dans les prairies des Perdrettes le 10/05 et 1 individu à Ker Viroux le 11/05 (J.M.). Le passage postnuptial est peu marqué avec 1 individu dans les marais de la Croix le 22/08 (Q.G.) et 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 17/09 (M.P. & X.H.). Pas d'indice certain de reproduction cette année.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca* (1166/115)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Une seule observation lors du passage prénuptial avec 1 mâle dans les prairies des Perdrettes le 10/05 (J.M.). Le passage postnuptial, beaucoup plus marqué, s'étale du 30/07 - au moins 1 individu au complexe sportif (J.-M.G.) - au 13/10 - 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Les maxima sont notés les 27/08 avec plus de 15 individus dans les prairies des Perdrettes (J.M. & M.-P.H.) et 09/09 avec plus de 12 individus au complexe sportif (J.-M.G.) et plus de 10 individus dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros* (3056/204)

L'espèce est commune et nicheuse en petit nombre sur l'île où elle peut être observée presque toute l'année. Le passage prénuptial a lieu en mars - par exemple plus de 16 individus autour du phare des Corbeaux le 17/03 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, est noté en octobre et début novembre avec par exemple plus de 80 individus autour de la pointe des Corbeaux le 23/10 (V.A. & J.-M.G.). Quelques oiseaux hivernent sur l'île - par exemple 2 individus à Port-Joinville sur le port de plaisance le 06/01 (M.-P. & X.H.) et 1 individu plage de la Tourette le 29/12 (M.-P. & X.H.).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* (747/38)**

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial, très peu marqué, a lieu en avril et mai avec par exemple 1 mâle dans les prairies des Perdrettes le 06/04 (M.-P.H.) et 1 femelle près de la mare du But le 12/05 (J.M.). Le passage postnuptial, beaucoup plus net, s'étale du 25/08 avec 1 individu dans les prairies des Perdrettes (J.M.) et s'achève le 04/10 avec 1 mâle à Ker Viroux (B.I. & J.V.) et 1 individu de type femelle dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Les maxima sont notés début septembre avec 11 individus le 07/09, notamment 3 individus près des Loges et 3 individus dans le vallon du Jars (M.-P. & X.H.).

TARIER DES PRÉS *Saxicola rubetra* (2177/153)

L'espèce est observée cette année aux deux passages pré et postnuptial. Au printemps, le premier oiseau (un mâle) est noté seulement le 21/04 près du Vieux Château (J.M.) et les 2 derniers le 11/05 dans les prairies des Perdrettes (J.M.). À l'automne, le passage débute le 19/08 avec 1 individu près de phare des Corbeaux (Q.G.) et s'achève en novembre - dernier oiseau, tardif, le 08/11 près de la pointe du But (M.-P. & X.H.). Les maxima sont classiquement notés en septembre avec plus de 140 individus comptés sur l'île le 06/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.).

TARIER PÂTRE *Saxicola rubicola* (3988/360)

L'espèce est assez commune sur l'île où elle est observée presque toute l'année. Plusieurs indices de nidification certaine cette année sur la côte sauvage - 1 mâle adulte et 2 juvéniles près de la pointe de la Pèrre le 23/06 (M.-P. & X.H.) - près des Loges, du vallon du Jars, du vallon de l'aérodrome, pointe des Chancelles, etc. Le nombre de couples nicheurs (près d'une vingtaine) est donc stable. À confirmer dans les années qui viennent. Les maxima sont classiquement notés lors du passage postnuptial (en octobre et novembre) avec par exemple plus de 34 notés sur l'île le 01/11 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G., J.M. & J.D.L., L.So. & N.P.).

**TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* (7066/479)**

L'espèce est commune et nicheuse en tout petit nombre sur l'île. Elle y est observée du mois de mars - 5 premiers oiseaux le 13/03 près du phare des Corbeaux (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.), de la Pierre des Amporelles (M.-P.H.) et à la pointe de la Pèrre (V.A. & J.-M.G.) - au mois de novembre - dernier oiseau le 09/11 près de la carrière

(V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.). Le passage prénuptial est surtout noté en avril avec 40 individus près des Tchinettes le 20/04 (V.A. & J.-M.G.) et plus 100 individus le 22/04 comptés en différents points de l'île (J.M.). La petite population reproductrice insulaire étant la dernière de la région Pays de la Loire (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014b) - l'espèce est classée "en danger critique" dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014) - elle fait donc l'objet d'un suivi attentif en période de reproduction. Malgré la présence de 2 ou 3 couples sur la côte sauvage en période de reproduction, cette dernière n'a pas pu être mise en évidence cette année pour la première fois (aucun jeune observé). Si cette situation se confirme dans les années qui viennent, la dernière population des Pays de la Loire pourra malheureusement être considérée comme éteinte. Le passage postnuptial est peu marqué de nouveau cette année avec seulement plus de 107 individus comptés en différents points de l'île le 06/09 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.).

Enfin, plusieurs individus présentant les caractères de la sous-espèce groenlandaise *Oenanthe oenanthe leucorhoa* ont été observés le 16/10 plage des Bossilles/de la Borgne (O.Pe.).



Femelle

Mâle

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus* (2749/133)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île où elle semble de plus en plus présente. Aucune observation particulière cette année.



ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis* (4616/389)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. On note classiquement une augmentation du nombre d'oiseaux à l'automne.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (1405/176)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial débute le 30/03 - 1 individu pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) - et se poursuit jusqu'en mai avec par exemple plus de 15 individus dans les marais de la Guerche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.) et 16 individus dans les prairies des Perdrettes le 28/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, s'étale du 19/08 - 1 individu en vol au-dessus des prairies des Perdrettes (J.M.) - au 17/10 - 1 individu pointe du But (O.C.). Les maxima sont notés classiquement en septembre avec par exemple plus de 100 individus sur une petite partie de la côte sauvage le 03/09 (V.A. & J.-M.G.) et plus de 80 individus sur la dune de la Grande Conche le 15/09 (V.A. & J.-M.G.).

La sous-espèce *Motacilla flava flavissima* (flavéole) est peu observée et à l'unité aux passages pré et postnuptial - par exemple 1 individu dans les prairies des Perdrettes le 12/04 (X.H.) et 2 individus dans le vallon de l'aérodrome le 08/09 (J.-M.G.).

Un individu, possiblement de la sous-espèce *Motacilla flava iberiae* (ibérique), est observé le 28/05 dans les marais de la Guerche (J.-M.G.). Enfin, un probable individu de la forme *dombrowski* (hybride stable de *feldegg/flava*) est observé dans les marais de la Guerche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.).

Bergeronnette printanière ssp *dombrowski*



Bergeronnette printanière ssp *flavissima*

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea* (583/21)

L'espèce est notée principalement cette année lors du passage d'automne (du 15/09 au 14/11) - par exemple 2 individus pointe du Châtelet le 28/09 (M.P.). Toutes les observations ne concernent qu'un à deux individus. Un tout petit passage est noté en mars avec 1 individu dans les marais de la Guerche le 07/03 (V.A. & J.-M.G.). Une seule observation de début d'hiver avec 1 individu près de la carrière le 04/12 (V.A. & J.-M.G.).

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba* (5754/485)

La sous-espèce type *Motacilla alba alba* est nicheuse et de plus en plus commune sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Un petit passage prénuptial est noté en mars avec par exemple plus de 12 individus dans les marais de la Guerche, 14 individus au Marais salé et 11 individus près du phare des Corbeaux le 07/03 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial est perceptible dès la fin du mois d'août - 18 individus pointe de la Gournaise le 16/08 (J.D.L.) - et se poursuit jusqu'en novembre. Il est assez marqué cette année avec par exemple plus de 70 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 11/10 (V.A. & J.-M.G.). De plus en plus d'individus semblent hiverner sur les plages de la côte nord de l'île - par exemple 5 individus à Port-Joinville le 05/01 (M.-P. & X.H.).

La sous-espèce *Motacilla alba yarrellii*, migratrice et hivernante, est observée jusqu'au 16/03 - 1 individu plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.) - et à partir du 28/09 avec 1 femelle adulte à Ker Bossy (B.I. & L.Ch.). Pas de passage marqué cet automne même si le nombre d'individus augmente en octobre et novembre.



Bergeronnette grise



Bergeronnette de Yarrell

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (159/17)

Le Pipit rousseline est noté cette année en période de reproduction et lors du passage postnuptial. Au printemps, 1 individu chanteur est observé sur la dune de la Grande Conche du 01/05 (V.A. & J.-M.G.) au 12/06 (V.A. & J.-M.G.) mais visiblement sans suite. L'espèce, qui a niché sur l'île sur ce site, est donc à surveiller dans les années qui viennent. Le passage postnuptial a lieu du 27/08 - 1 individu pointe de la Père (J.M.) - au 16/09 - 1 individu sur la dune de la Grande Conche (M.-P.H.) et ne concerne le plus souvent qu'un ou deux oiseaux excepté 3 individus posés sur la dune de la Grande Conche le 05/09 (M.-P. & X.H.).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis* (8522/572)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année, y compris en hiver. Pas de décompte précis des oiseaux nicheurs mais l'espèce est à surveiller dans les années qui viennent, même si elle semble encore bien présente sur l'île. En effet, elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Pas de passage noté au printemps. En revanche, comme tous les ans, un net passage postnuptial est observé avec par exemple plus de 1 000 individus en différents points de l'île le 28/09 (M.-P. & X.H., L.V. & M.P., L.Ch. & B.I., M.F. & J.V.) et plus de 750 individus le 11/10 au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis* (820/73)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 06/04 - 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) et 1 individu posé à Ker Viroux (M.-P.H.) - au 19/05 - 1 individu au-dessus des marais de la Croix (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial débute le 18/08 avec 1 individu à la Bergerie (J.M.) et se poursuit en septembre et début octobre - 2 derniers oiseaux le 04/10 à la Bergerie (J.D.L.). Il s'agit souvent d'oiseaux en vol en migration active mais également d'oiseaux posés - par exemple 4 individus le 28/04 près de la dépression de la dune de la Grande Conche (X.H. & J.-M.G.). Le maximum (très faible cette année) est noté lors du passage postnuptial avec 7 individus le 19/08 en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche (Q.G.).

**PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (17/1)****

Une nouvelle observation de cette espèce rare sur l'île avec 1 individu posé près du phare des Corbeaux (S.Ro.). Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation vendéen (CH85).

E

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (2895/167)

L'espèce est nicheuse sur l'île et y est observée toute l'année. Pas de comptage précis des couples nicheurs sur la côte sauvage mais l'espèce semble bien se porter. Elle est toutefois à surveiller dans les années qui viennent puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Le maximum d'oiseaux ensemble (faible) est noté en hiver avec seulement 6 individus plage du Loubinou le 30/12 (M.-P. & X.H.).



A : Pipit maritime ; B : Pipit rousseline ; C : Pipit des arbres ; D : Pipit farlouse

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (5229/507)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année y compris en hiver - plus de 100 individus à la Bergerie le 04/01 (J.M.). Pas de passage noté au printemps. Le passage d'automne est très marqué de nouveau cette année avec par exemple plus de 2 000 individus en migration active le 23/10 (V.A. & J.-M.G., J.Ma.), plus de 1 500 individus le 27/10 (M.-P. & X.H., J.-M.G.) et plus de 2 700 individus le 08/11 au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla* (344/17)

Le Pinson du Nord est observé cette année aux deux passages et en petit nombre. Au printemps 1 femelle est découverte posée au Marais Salé le 12/04 (X.H.). Le passage postnuptial concerne quelques oiseaux entre le 11/10 - 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) - et le 11/11 - plus de 7 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Le maximum est noté le 23/10 avec plus de 20 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). Enfin, une observation en hiver avec 1 individu dans les marais de la Guerche le 15/12 (V.A. & J.-M.G.).

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes* (76/9)

Belle petite série d'observations cette année. Au printemps, 1 individu est découvert le 12/05 dans les marais de la Guerche (J.M.). On note un petit passage postnuptial du 11/10 - 3 individus en migration active au-dessus du vallon du Jars (M.-P. & X.H.) - au 11/11 - 1 individu au passage au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Enfin, une observation en hiver avec 3 individus au complexe sportif le 16/12 (J.-M.G.).

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula* (2977/113)

Devenue très rare dans le reste du département, l'espèce est encore présente et nicheuse sur l'île - au moins 3 individus dans les marais de la Croix le 22/07 (M.-P. & X.H.). Elle peut y être observée toute l'année (moins présente en hiver cependant). La grande discrétion des oiseaux en période de reproduction empêche tout décompte précis des couples nicheurs et toute indication fiable d'une tendance démographique même si le nombre de couples semble moins important cette année. Un suivi précis de l'espèce serait à mettre en place puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). À l'automne, les observations - par exemple 3 individus dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 14/10 (M.-P.H. & O.Pe.) et 4 individus près du Grand Phare le 22/10 (J.Ma.) - concernent aussi des migrateurs mais il est souvent difficile de les distinguer.

VERDIER D'EUROPE *Chloris chloris* (2185/80)

L'espèce est assez commune et nicheuse en petit nombre sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (beaucoup moins de données toutefois en hiver). Passage quasi-inexistant à l'automne avec par exemple plus de 20 individus à la Bergerie le 25/10 (M.-P. & X.H.).

LINOTTE MÉLODIEUSE *Linaria cannabina* (4001/283)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée de mars - première (1 mâle) le 10/03 sur la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) - à novembre - encore 4 individus depuis la dune de la Grande Conche le 11/11 (M.-P. & X.H.). Après des regroupements au printemps - par exemple 60 individus sur la dune de la Grande



Conche le 23/03 (V.A. & J.-M.G.) - les nicheurs se répartissent sur la côte sauvage. Des rassemblements sont aussi notés à la fin de la reproduction avec par exemple plus de 75 individus le 28/09 près de la grotte du Bélier (M.P.). Même si l'espèce semble assez bien se porter à l'île d'Yeu, elle est à surveiller puisqu'elle est classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) et dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). À l'automne le passage, modeste, est surtout noté en octobre avec par exemple plus de 50 individus en migration active depuis la dune de la Grande Conche le 11/10 (V.A. & J.-M.G.) et plus de 70 individus depuis le phare des Corbeaux le 13/10 (V.A. & J.-M.G.). Pas d'observation en hiver.

CHARDONNERET ÉLÉGANT *Carduelis carduelis* (3366/290)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données toutefois en hiver). Quelques rassemblements postnuptiaux sont notés avec par exemple plus de 57 individus pointe du Châtelet le 26/08 (J.M.). Un petit passage est observé à l'automne avec par exemple plus de 36 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 27/10 (M.-P. & X.H., J.-M.G.).

SERIN CINI *Serinus serinus* (1769/112)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Pas de passage marqué à l'automne - par exemple plus de 15 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 23/10 (V.A. & J.-M.G.). Comme les années précédentes des petits groupes d'oiseaux s'installent en automne et hivernent sur l'île - par exemple plus de 50 individus près de la plage du Marais Salé le 06/01 (M.-P. & X.H., J.V.) et plus de 20 individus près de la plage de la Tourette le 08/11 (M.-P. & X.H.).

TARIN DES AULNES *Spinus spinus* (817/40)

Le Tarin des aulnes est observé cette année presque uniquement lors du passage postnuptial entre le 02/10 - 20 individus en migration active au-dessus du phare des Corbeaux (B.I.) - et le 17/11 - encore 1 individu au-dessus de la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.). Le maximum, faible cette année, est noté le 27/10 avec plus de 63 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.). Il s'agit surtout d'oiseaux en migration active mais aussi de quelques individus posés, par exemple au moins 2 individus dans la saulaie de l'impasse de la Borgne le 02/11 (J.M.). Enfin, une observation de début d'hiver avec 3 individus au-dessus de la pointe du Châtelet le 04/12 (V.A. & J.-M.G.).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* (23/4)**

Quatre nouvelles données, concernant le même individu, pour cette espèce rare (pas annuelle sur l'île) : 1 mâle est découvert posé sur la côte sauvage près de la Pierre des Amporelles le 12/10 (J.-M.G.). Il y séjournera jusqu'au 14/10 et fera la joie des observateurs présents (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H., S.Ro., O.Pe. & P.B.). L'espèce doit facilement passer inaperçue à l'automne sur la côte sauvage. Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation vendéen (CH85).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (134/26)

Pour la première fois, le Bruant des neiges est observé cette année au printemps sur la côte sauvage avec 1 femelle près du vallon de l'aérodrome du 13 au 16/03 (J.-M.G., M.-P. & X.H.). Plus classiquement, l'espèce est également notée lors du passage postnuptial, à des dates classiques. Le premier oiseau est découvert près de la Pierre des Amporelles le 17/10 (L.G. & O.C.) puis 1 individu est observé en vol 18/10 au-dessus de la plage des Bossilles/de la Borgne (O.Pe.). Ensuite, 1 individu, découvert sur la digue à Port-Joinville le 29/10 (M.-P.H.) y séjournera jusqu'au 08/11 (M.-P. & X.H.). Enfin, 1 individu est noté à la pointe du But du 02/11 au 17/11 (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.).



Bruant des neiges



Bruant lapon

BRUANT PROYER *Emberiza calandra* (24/3)

Trois nouvelles données pour cette espèce qui reste rare sur l'île mais est de plus en plus régulière au printemps. Toutes les observations sont faites au même endroit : 1 individu sur la dune de la Grande Conche les 07/04 (V.A. & J.-M.G.), 13/04 (X.H.) et 30/05 (V.A. & J.-M.G.). L'espèce, qui a niché sur l'île, pourrait peut-être un jour s'y installer de nouveau.

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (102/2)****

Après une année blanche, le Bruant ortolan est de nouveau observé cette année sur l'île lors du passage postnuptial : 2 individus (dont 1 1^{ère} année) posés sur la dune de la Grande Conche le 06/09 (M.-P. & X.H.) et 1 individu en migration nocturne au-dessus de Ker Châlon (Mayes) le 29/09 (L.V. & M.P.). L'espèce semble de plus en plus rare sur l'île. Ces données ont été homologuées par le comité d'homologation vendéen (CH85).

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus* (363/31)

L'espèce est beaucoup observée cette année presque uniquement lors du passage postnuptial. Celui-ci débute le 13/10 avec 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.) et se poursuit jusqu'au 11/11 avec plusieurs individus sur l'île, notamment 1 individu posé pointe des Chancelles (M.-P. & X.H.) et 1 individu pointe du Châtelet (V.A. & J.-M.G.). Les maxima sont notés début novembre avec par exemple 7 individus posés à Ker Viroux le 03/11 (M.-P. & X.H.) et 11 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 08/11 (M.-P. & X.H.). Enfin, à noter cette année une donnée à une date complètement atypique avec un mâle près du phare des Corbeaux le 12/06 (V.A. & J.-M.G.).

Quelques papillons de l'île d'Yeu...



Tircis



Azuré



Machaon



Grande tortue



Flambé & Cardinal

DROITS ET CITATIONS

Les données présentées restent la propriété entière de leurs observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature : **Fuligule à bec cerclé** - 2 individus le 11 octobre 2024 dune de la Grande Conche, L'Île d'Yeu - 85 (Jean-Marc Guilpain, *in* Hindermeyer & Hindermeyer, 2025).

CRÉDITS PHOTOS

© Valérie AURIAUX : page 52

© Nicolas CELLIER : page 13

© Alain-Gilbert GUÉGUEN : pages 9, 21b, 27, 29b, 31a, 34a, 61a.d

© Jean-Marc GUILPAIN : pages 8, 10, 11a.b.c, 12, 14, 15, 16, 17, 19a, 21a, 22, 24, 25, 26c, 29a, 30, 31b, 32, 33, 34b, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49b, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61b.c, 62, 64, 67

© Quentin GUIBERT : page 51a

© Marie-Paule HINDERMEYER : pages 19b, 21c, 28, 35, 36

© Jérôme de LINARES : page 26b

© Justin MÉCHIN : page 26a

© Olivier PENARD : page 51b

© Sylvain ROUILLÉ : pages 11d, 49a.c, 61e

TRANSMISSION DES DONNÉES

Depuis 1990, nous avons entrepris de rassembler toutes les observations ornithologiques effectuées sur l'île d'Yeu depuis le début du siècle. L'ensemble de ces données a été transféré dans une base de données "YEU" réalisée sous MS Access. Afin de ne perdre aucune observation effectuée sur l'île ou dans ses eaux, nous remercions chaque observateur de bien vouloir nous transmettre ses observations après un séjour sur l'île. Depuis le début de l'année 2009, la LPO Vendée met à disposition une base de données en ligne sur laquelle il est possible de saisir toutes les observations faites en Vendée (<http://www.faune-vendee.org>). Une simple extraction permet ensuite de nous transmettre celles-ci sans les saisir une nouvelle fois mais nous acceptons aussi les données sous n'importe quelle autre forme.

DIFFUSION

La synthèse est envoyée à tous les observateurs de l'année en cours (sauf adresse inconnue) ainsi qu'à des ornithologues connus pour fréquenter l'île régulièrement. Elle est également adressée à la mairie de l'île d'Yeu.

Elle est disponible sur le site faune-vendée de la LPO Vendée (<http://www.faune-vendee.org>). Toutes les données sont intégrées à notre base de données "YEU".

BIBLIOGRAPHIE

BUGEON C., 2013. *Mémento des oiseaux observés à l'île d'Yeu de 1907 à fin 2012 (inventaire actualisé en 2013)*. Les dossiers du patrimoine. Editions Les Sévenelles, 120 p.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014a. La Fauvette pitchou. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 408-411.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014b. Le Traquet mottteux. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 366-367.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2020. Le Petit-duc scops *Otus scops* niche à nouveau sur l'île d'Yeu (Vendée). *La Gorgebleue* 2.0, 018-FV2020, 10 p. www.faune-vendee.org

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2024. Le Cormoran huppé (*Gulosus artistotelis*) a niché avec succès sur l'île d'Yeu (Vendée). *La Gorgebleue* 2.0, 023-FV2024, 8 p. www.faune-vendee.org

HINDERMEYER M.-P., HINDERMEYER X. & PORTIER F., 2017. Points chauds. Une destination "ornitho" à part entière : l'île d'Yeu (Vendée). *Ornithos*, 24-1 : 17-33.

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIÈRE W., TAVENON D. & YÉSOU P., 2014. *Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. *La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine*. Paris, France, 32 p.

