

CAT LOF	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE
	ANATIDÉS	
C	Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)
AC	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)
		– <i>C. c. bewickii</i> Yarrell, 1830
A	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i> (Linné, 1758)
A	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)
	Oie de taïga	– <i>A. f. fabalis</i> (Latham, 1787)
	Oie de toundra	– <i>A. f. rossicus</i> Buturlin, 1933
A	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1833
A	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>A. a. albifrons</i> (Scopoli, 1769)
	Oie rieuse du Groenland	– <i>A. a. flavirostris</i> Dalgety & Scott, 1948
A	Oie naine	<i>Anser erythropus</i> (Linné, 1758)
AC	Oie cendrée	<i>Anser anser</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. anser</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. rubrirostris</i> Swinhoe, 1871
BD	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. c. caerulescens</i> (Linné, 1758)
C	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. c. canadensis</i> (Linné, 1758)
AC	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)
A	Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i> (Linné, 1758)
	Bernache cravant à ventre sombre	– <i>B. b. bernicla</i> (Linné, 1758)
	Bernache cravant à ventre pâle	– <i>B. b. hrota</i> (O. F. Müller, 1776)
	Bernache cravant du Pacifique	– <i>B. b. nigricans</i> (Lawrence, 1846)
A	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)
BC	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linné, 1766)
BC	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)
A	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i> (Linné, 1758)
C	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758)
A	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i> Linné, 1758
A	Canard à front blanc	<i>Anas americana</i> J. F. Gmelin, 1789
A	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i> Linné, 1758
BD	Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i> Georgi, 1775
A	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i> Linné, 1758
		– <i>A. c. crecca</i> Linné, 1758
A	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i> J. F. Gmelin, 1789
AC	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> Linné, 1758
		– <i>A. p. platyrhynchos</i> Linné, 1758
A	Canard noir	<i>Anas rubripes</i> Brewster, 1902
A	Canard pilet	<i>Anas acuta</i> Linné, 1758
		– <i>A. a. acuta</i> Linné, 1758
A	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i> Linné, 1758
A	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i> Linné, 1766
A	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i> Linné, 1758
A	Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832)
A	Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)
A	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758)
A	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)
A	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)
A	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)
A	Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i> (Linné, 1761)
		– <i>A. m. marila</i> (Linné, 1761)
A	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)
A	Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. m. mollissima</i> (Linné, 1758)
A	Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i> (Linné, 1758)

A	Eider de Steller	<i>Polysticta stelleri</i> (Pallas, 1769)
A	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i> (Linné, 1758)
A	Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i> (Linné, 1758)
A	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832)
A	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i> (Linné, 1758)
A	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i> (Linné, 1758)
B	Macreuse à ailes blanches	<i>Melanitta deglandi</i> (Bonaparte, 1850)
	Macreuse de Sibérie	– <i>M. d. stejnegeri</i> (Ridgway, 1887)
A	Garrot albéole	<i>Bucephala albeola</i> (Linné, 1758)
A	Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. c. clangula</i> (Linné, 1758)
A	Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linné, 1758)
A	Harle huppé	<i>Mergus serrator</i> (Linné, 1758)
A	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i> Linné, 1758
		– <i>M. m. merganser</i> Linné, 1758
C	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>O. j. jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)
	ODONTOPHORIDÉS	
C	Colin de Californie	<i>Callipepla californica</i> (Shaw, 1798)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	PHASIANIDÉS	
A	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. coturnix</i> (Linné, 1758)
AC	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. r. rufa</i> (Linné, 1758)
A	Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)
		– <i>A. g. saxatilis</i> (Bechstein, 1805)
A	Gélinotte des bois	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linné, 1758)
		– <i>T. b. rupestris</i> (C. L. Brehm, 1831)
A	Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776)
		– <i>L. m. pyrenaica</i> Hartert, 1921
		– <i>L. m. helvetica</i> (Thienemann, 1839)
A	Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i> Linné, 1758
		– <i>T. t. tetrix</i> Linné, 1758
A	Grand Tétras	<i>Tetrao urogallus</i> Linné, 1758
		– <i>T. u. major</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>T. u. aquitanicus</i> Ingram, 1915
AC	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. perdix</i> (Linné, 1758)
	Perdrix grise des Pyrénées	– <i>P. p. hispaniensis</i> (Reichenow, 1892)
		– <i>P. p. armoricana</i> (Hartert, 1917)
C	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)
C	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758
		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.
	GAVIIDÉS	
A	Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. a. arctica</i> (Linné, 1758)
A	Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)
A	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i> (Gray, 1859)
	DIOMÉDÉIDÉS	
A	Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i> Temminck, 1828
		– appartenance subsppécifique inconnue

A	Albatros à bec jaune	<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (J. F. Gmelin, 1789) – <i>T. c. chlororhynchos</i> (J. F. Gmelin, 1789)
PROCELLARIIDÉS		
A*	Fulmar géant / de Hall	<i>Macronectes giganteus</i> (J. F. Gmelin, 1789) / <i>M. halli</i> Mathews, 1912
A	Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linné, 1761) – <i>F. g. glacialis</i> (Linné, 1761)
A	Pétrel gongon	<i>Pterodroma feae</i> (Salvatori, 1899) – appartenance subspécifique inconnue
A	Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)
A	Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i> (Cory, 1881)
A	Puffin de Scopoli	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)
A	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)
A	Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)
A	Puffin des Baléares	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921
A	Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)
A	Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i> (Bonaparte, 1857) – appartenance subspécifique inconnue
HYDROBATIDÉS		
A	Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i> Kühl, 1820 – appartenance subspécifique inconnue
A	Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linné, 1758) – <i>H. p. pelagicus</i> (Linné, 1758) – <i>H. p. melitensis</i> (Schembri, 1843)
A	Océanite de Castro	<i>Oceanodroma [castro, jabejabe or monteiroi]</i> (Harcourt, 1851)
A	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818) – <i>O. l. leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)
A	Océanite de Swinhoe	<i>Oceanodroma monorhis</i> (Swinhoe, 1867)
SULIDÉS		
A	Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i> (Linné, 1766)
A	Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831 – appartenance subspécifique inconnue
A	Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i> (Linné, 1758)
PHALACROCORACIDÉS		
A	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linné, 1758) – <i>P. c. carbo</i> (Linné, 1758) – <i>P. c. sinensis</i> (Blumenbach, 1798)
A	Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i> (Lesson, 1831) – appartenance subspécifique inconnue
A	Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linné, 1761) – <i>P. a. aristotelis</i> (Linné, 1761)
	Cormoran de Desmarest	– <i>P. a. desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)
A	Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)
PÉLÉCANIDÉS		
A	Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linné, 1758
A	Pélican frisé	<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832
FRÉGATIDÉS		
B	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914
ARDÉIDÉS		
A	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i> (Linné, 1758) – <i>B. s. stellaris</i> (Linné, 1758)
A	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)

		– <i>I. m. minutus</i> (Linné, 1766)
A	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. n. nycticorax</i> (Linné, 1758)
A	Héron vert	<i>Butorides virescens</i> (Linné, 1758)
A	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>A. r. ralloides</i> (Scopoli, 1769)
A	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. i. ibis</i> (Linné, 1758)
A	Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792)
		– <i>E. g. gularis</i> (Bosc, 1792)
		– <i>E. g. schistacea</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1828)
A	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> (Linné, 1766)
		– <i>E. g. garzetta</i> (Linné, 1766)
A	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. alba</i> (Linné, 1758)
A	Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i> Vigors & Children, 1826
A	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> Linné, 1758
		– <i>A. c. cinerea</i> Linné, 1758
A	Grand Héron	<i>Ardea herodias</i> Linné, 1758
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i> Linné, 1766
		– <i>A. p. purpurea</i> Linné, 1766
	CICONIIDÉS	
A	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> (Linné, 1758)
A	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. ciconia</i> (Linné, 1758)
	THRESKIORNITHIDÉS	
A	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linné, 1766)
		– <i>P. f. falcinellus</i> (Linné, 1766)
C	Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)
A	Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i> Linné, 1758
		– <i>P. l. leucorodia</i> Linné, 1758
	PHOENICOPTÉRIDÉS	
A	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811
A	Flamant nain	<i>Phoenicopterus minor</i> (Geoffroy, 1798)
	PODICIPÉDIDÉS	
A	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linné, 1758)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)
		– <i>T. r. ruficollis</i> (Pallas, 1764)
A	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. c. cristatus</i> (Linné, 1758)
A	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)
		– <i>P. g. grisegena</i> (Boddaert, 1783)
		– <i>P. g. holboellii</i> (Reinhardt, 1854)
A	Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. a. auritus</i> (Linné, 1758)
A	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>P. n. nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831
	ACCIPITRIDÉS	
A	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Linné, 1758)
A	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)
		– <i>E. c. caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)
A	Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)

		– <i>M. m. migrans</i> (Boddaert, 1783)
A	Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Linné, 1758)
		– <i>M. m. milvus</i> (Linné, 1758)
A	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linné, 1758)
A	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. b. aureus</i> (Hablizl, 1783)
A	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. p. percnopterus</i> (Linné, 1758)
AC	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)
		– <i>G. f. fulvus</i> (Hablizl, 1783)
A	Vautour de Rüppell	<i>Gyps rueppellii</i> (A. E. Brehm, 1852)
		– appartenance subsppécifique inconnue
B	Vautour oricou	<i>Torgos tracheliotus</i> J. R. Forster, 1791
AC	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i> (Linné, 1766)
A	Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)
A	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. a. aeruginosus</i> (Linné, 1758)
A	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Linné, 1766)
A	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1770)
A	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Linné, 1758)
A	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. g. gentilis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. g. arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903)
A	Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. n. nisus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. n. wolterstorffi</i> (Kleinschmidt, 1901)
A	Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. b. buteo</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. b. arrigonii</i> Picchi, 1903
	Buse des steppes	– <i>B. b. vulpinus</i> (Gloger, 1833)
A	Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)
		– <i>B. r. rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)
		– <i>B. r. cirtensis</i> (Levaillant, 1850)
A	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)
		– <i>B. l. lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Aigle criard	<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811
A	Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831
A	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788)
A	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. c. chrysaetos</i> (Linné, 1758)
A	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> (Vieillot, 1822)
		– <i>A. f. fasciata</i> (Vieillot, 1822)
A	Aigle des steppes	<i>Aquila nipalensis</i> Hodgson, 1833
		– <i>A. n. orientalis</i> Cabanis 1854
A	Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809
A	Aigle ibérique	<i>Aquila adalberti</i> C. L. Brehm, 1861
	PANDIONIDÉS	
A	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. h. haliaetus</i> (Linné, 1758)
	RALLIDÉS	
A	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i> Linné, 1758
		– <i>R. a. aquaticus</i> Linné, 1758
A	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766)
A	Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i> (Linné, 1758)
A	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)
A	Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, 1776)
		– <i>Z. p. intermedia</i> (Hermann, 1804)

A	Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linné, 1758)
A	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. c. chloropus</i> (Linné, 1758)
A	Talève d'Allen	<i>Porphyrio alleni</i> Thomson, 1842
AC	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linné, 1758)
A	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> Linné, 1758
		– <i>F. a. atra</i> Linné, 1758
B	Foulque caronculée	<i>Fulica cristata</i> J. F. Gmelin, 1789
	GRUIDÉS	
A	Grue cendrée	<i>Grus grus</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. g. grus</i> (Linné, 1758)
A	Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i> (Linné, 1758)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i> (Linné, 1758)
	OTIDIDÉS	
A	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758)
B	Outarde de Macqueen	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (J. E. Gray, 1832)
A	Outarde barbue	<i>Otis tarda</i> Linné, 1758
		– <i>O. t. tarda</i> Linné, 1758
	BURHINIDÉS	
A	Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. o. oedicephalus</i> (Linné, 1758)
	RÉCURVIROSTRIDÉS	
A	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i> (Linné, 1758)
		– <i>H. h. himantopus</i> (Linné, 1758)
A	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linné, 1758
	HÉMATOPODIDÉS	
A	Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i> Linné, 1758
		– <i>H. o. ostralegus</i> Linné, 1758
	CHARADRIIDÉS	
A	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linné, 1758)
A	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linné, 1758)
A	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)
A	Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Guignard d'Eurasie	<i>Charadrius morinellus</i> Linné, 1758
A	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i> Linné, 1758
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825
A	Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i> Linné, 1758
		– <i>C. h. hiaticula</i> Linné, 1758
		– <i>C. h. tundrae</i> Lowe, 1915
A	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786
		– <i>C. d. curonicus</i> J. F. Gmelin, 1789
A	Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771)
A	Vanneau à queue blanche	<i>Vanellus leucurus</i> (Lichtenstein, 1823)
A	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)
A	Gravelot asiatique	<i>Anarhynchus asiaticus</i> (Pallas, 1773)
A	Gravelot de Leschenault	<i>Anarhynchus leschenaultii</i> (Lesson, 1826)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Gravelot mongol	<i>Anarhynchus mongolus</i> (Pallas, 1776)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Gravelot pâte	<i>Anarhynchus pecuarius</i> (Temminck, 1823)
A	Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)

		– <i>A. a. alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)
	SCOLOPACIDÉS	
A	Bartramie des champs	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)
A	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. p. phaeopus</i> (Linné, 1758)
A	Courlis à bec grêle	<i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817
A	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. a. arquata</i> (Linné, 1758)
A	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. l. limosa</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. l. islandica</i> C. L. Brehm, 1831
A	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. l. lapponica</i> (Linné, 1758)
A	Tournepieuvre à collier	<i>Arenaria interpres</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. i. interpres</i> (Linné, 1758)
A	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. canutus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. islandica</i> (Linné, 1767)
A	Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i> (Linné, 1758)
A	Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821)
A	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)
		– <i>C. f. falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)
A	Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776)
A	Bécasseau à longs doigts	<i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, 1853)
A	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)
A	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)
A	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. a. alpina</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. a. schinzii</i> (C. L. Brehm, 1822)
		– <i>C. a. arctica</i> (Schioler, 1922)
A	Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)
A	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)
A	Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)
A	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)
A	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)
A	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)
A	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)
A	Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857)
A	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i> (Linné, 1766)
A	Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)
A	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linné, 1758)
A	Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linné, 1758)
A	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)
A	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linné, 1758)
A	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i> (Linné, 1766)
A	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i> Linné, 1758
A	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813
		– <i>T. s. solitaria</i> Wilson, 1813
A	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)
A	Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)
A	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>T. s. inornata</i> (Brewster, 1887)
A	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)
A	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i> Linné, 1758

A	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i> (Linné, 1758)
		– <i>T. t. totanus</i> (Linné, 1758)
		– <i>T. t. robusta</i> (Schioler, 1919)
A	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)
A	Bécassin à bec court	<i>Limnodromus griseus</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1823)
A	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> Linné, 1758
A	Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i> J. F. Gmelin, 1789
A	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. g. gallinago</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. g. faeroeensis</i> (C. L. Brehm, 1831)
A	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i> (Ord, 1825)
A	Bécassine double	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)
	GLARÉOLIDÉS	
A	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i> (Linné, 1766)
		– <i>G. p. pratincola</i> (Linné, 1766)
A	Glaréole orientale	<i>Glareola maldivarum</i> J. R. Forster, 1795
A	Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i> Fischer, 1842
A	Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)
		– <i>C. c. cursor</i> (Latham, 1787)
	STERCORARIIDÉS	
A	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)
A	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linné, 1758)
A	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819
		– <i>S. l. longicaudus</i> Vieillot, 1819
A	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i> Brünnich, 1764
		– <i>S. s. skua</i> Brünnich, 1764
	ALCIDÉS	
A	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i> (Linné, 1758)
A	Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. g. arcticus</i> (C. L. Brehm, 1924)
A	Pingouin torda	<i>Alca torda</i> Linné, 1758
		– <i>A. t. islandica</i> (Linné, 1758)
B	Grand Pingouin	<i>Pinguinus impennis</i> (Linné, 1758)
A	Mergule nain	<i>Alle alle</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. alle</i> (Linné, 1758)
A	Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)
		– <i>U. a. aalge</i> (Pontoppidan, 1763)
		– <i>U. a. albionis</i> Witherby, 1923
A	Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i> (Linné, 1758)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	STERNIDÉS	
A	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i> (Linné, 1766)
		– <i>O. f. fuscatus</i> (Linné, 1766)
A	Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i> (Scopoli, 1786)
		– <i>O. a. melanoptera</i> (Swainson, 1837)
A	Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)
		– <i>S. a. albifrons</i> (Pallas, 1764)
A	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>G. n. nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)
A	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)
		– <i>C. h. hybrida</i> (Pallas, 1811)
A	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i> (Linné, 1758)

		– <i>C. n. niger</i> (Linné, 1758)
A	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)
A	Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787
A	Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i> Gambel, 1849
A	Sterne royale	<i>Sterna maxima</i> Boddaert, 1783
		– appartenance subspécifique inconnue
A	Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i> Lesson, 1831
		– <i>S. b. torresii</i> (Gould, 1843)
A	Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i> Nuttall, 1834
A	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i> Linné, 1758
		– <i>S. h. hirundo</i> Linné, 1758
A	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813
		– <i>S. d. dougallii</i> Montagu, 1813
A	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763
	LARIDÉS	
A	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774)
A	Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)
A	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i> (Linné, 1758)
		– <i>R. t. tridactyla</i> (Linné, 1758)
A	Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)
A	Mouette de Bonaparte	<i>Chroicocephalus philadelphia</i> (Ord, 1815)
A	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linné, 1766)
A	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)
A	Mouette de Ross	<i>Rhodostethia rosea</i> (MacGillivray, 1824)
A	Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i> Linné, 1758
A	Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i> Wagler, 1831
A	Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820
A	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826
A	Goéland ichthyaète	<i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773
A	Goéland cendré	<i>Larus canus</i> Linné, 1758
		– <i>L. c. canus</i> Linné, 1758
A	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815
A	Goéland dominicain	<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823
		– <i>L. d. vetula</i> Bruch 1853
A	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i> Linné, 1758
	Goéland de la Baltique	– <i>L. f. fuscus</i> Linné, 1758
		– <i>L. f. graellsii</i> A. E. Brehm, 1857
		– <i>L. f. intermedius</i> Schiöler, 1922
A	Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763
		– <i>L. a. argentatus</i> Pontoppidan, 1763
		– <i>L. a. argenteus</i> C. L. Brehm, 1822
A	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840
		– <i>L. m. michahellis</i> Naumann, 1840
A	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811
A	Goéland d'Amérique	<i>Larus smithsonianus</i> Coues, 1862
		– <i>L. s. smithsonianus</i> Coues, 1862
A	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i> Meyer, 1822
		– <i>L. g. glaucoides</i> Meyer, 1822
	Goéland de Kumlien	– <i>L. g. kumlieni</i> Brewster, 1883
A	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767
		– <i>L. h. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767
A	Goéland marin	<i>Larus marinus</i> Linné, 1758
	PTÉROCLIDIDÉS	
A	Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i> (Linné, 1766)
		– <i>P. a. alchata</i> (Linné, 1766)
A	Syrrhapte paradoxal	<i>Syrrhaptus paradoxus</i> (Pallas, 1773)

	COLUMBIDÉS	
AC	Pigeon biset	<i>Columba livia</i> J. F. Gmelin, 1789
		– <i>C. l. livia</i> J. F. Gmelin, 1789
A	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> Linné, 1758
		– <i>C. o. oenas</i> Linné, 1758
A	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linné, 1758
		– <i>C. p. palumbus</i> Linné, 1758
A	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)
		– <i>S. d. decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)
A	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. t. turtur</i> (Linné, 1758)
A	Tourterelle orientale	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)
		– <i>S. o. meena</i> (Sykes, 1832)
	CUCULIDÉS	
A	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linné, 1758)
A	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i> Linné, 1758
		– <i>C. c. canorus</i> Linné, 1758
A	Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (A. Wilson, 1811)
A	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i> (Linné, 1758)
	TYTONIDÉS	
A	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>T. a. alba</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>T. a. guttata</i> (C. L. Brehm, 1831)
		– <i>T. a. ernesti</i> (Kleinschmidt, 1901)
	STRIGIDÉS	
A	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. s. scops</i> (Linné, 1758)
A	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i> (Linné, 1758)
A	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linné, 1758)
		– <i>B. b. bubo</i> (Linné, 1758)
B	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. u. ulula</i> (Linné, 1758)
A	Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. p. passerinum</i> (Linné, 1758)
A	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>A. n. vidalii</i> A. E. Brehm, 1857
A	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> Linné, 1758
		– <i>S. a. aluco</i> Linné, 1758
		– <i>S. a. sylvatica</i> Shaw, 1809
A	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. o. otus</i> (Linné, 1758)
A	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)
		– <i>A. f. flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)
A	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. f. funereus</i> (Linné, 1758)
	CAPRIMULGIDÉS	
A	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linné, 1758
		– <i>C. e. europaeus</i> Linné, 1758
		– <i>C. e. meridionalis</i> Hartert, 1896
A	Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i> Temminck, 1820
		– <i>C. r. ruficollis</i> Temminck, 1820
A	Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i> (J. R. Forster, 1771)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	APODIDÉS	

A	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i> (Linné, 1758)
A	Martinet noir	<i>Apus apus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. apus</i> (Linné, 1758)
A	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)
		– <i>A. p. brehmorum</i> Hartert, 1901
A	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. m. melba</i> (Linné, 1758)
A	Martinet cafre	<i>Apus caffer</i> (Lichtenstein, 1823)
A	Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i> (Gray, 1832)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	UPUPIDÉS	
A	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i> Linné, 1758
		– <i>U. e. epops</i> Linné, 1758
	MÉROPIDÉS	
A	Guêpier de Perse	<i>Merops persicus</i> Pallas, 1773
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i> Linné, 1758
	CORACIIDÉS	
A	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758
		– <i>C. g. garrulus</i> Linné, 1758
	ALCÉDINIDÉS	
A	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. atthis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. a. ispida</i> (Linné, 1758)
	PICIDÉS	
A	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i> Linné, 1758
		– <i>J. t. torquilla</i> Linné, 1758
		– <i>J. t. tschusii</i> Kleinschmidt, 1907
A	Pic cendré	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788
		– <i>P. c. canus</i> J. F. Gmelin, 1788
A	Pic vert	<i>Picus viridis</i> Linné, 1758
		– <i>P. v. viridis</i> Linné, 1758
	Pic de Sharpe	– <i>P. v. sharpei</i> (Saunders, 1872)
A	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. m. martius</i> (Linné, 1758)
A	Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. t. alpinus</i> C. L. Brehm, 1831
A	Pic mar	<i>Dendropicos medius</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. m. medius</i> (Linné, 1758)
A	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. m. major</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. m. pinetorum</i> (C. L. Brehm, 1831)
		– <i>D. m. harterti</i> Arrigoni, 1902
A	Pic à dos blanc	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)
		– <i>D. l. leucotos</i> (Bechstein, 1803)
		– <i>D. l. lilfordi</i> (Sharpe & Dresser, 1871)
A	Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. m. hortorum</i> (C. L. Brehm, 1831)
		– <i>D. m. buturlini</i> (Hartert, 1912)
	FALCONIDÉS	
A	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818
A	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> Linné, 1758
		– <i>F. t. tinnunculus</i> Linné, 1758

A	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> Linné, 1766
A	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> Linné, 1758
		– <i>F. c. aesalon</i> Tunstall, 1771
		– <i>F. c. subaeson</i> C. L. Brehm, 1827
A	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> Linné, 1758
		– <i>F. s. subbuteo</i> Linné, 1758
A	Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> Gené, 1839
A	Faucon concolore	<i>Falco concolor</i> Temminck, 1825
A	Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i> Temminck, 1825
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Faucon sacré	<i>Falco cherrug</i> Gray, 1834
		– <i>F. c. cherrug</i> Gray, 1834
A	Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i> Linné, 1758
A	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771
		– <i>F. p. peregrinus</i> Tunstall, 1771
		– <i>F. p. brookei</i> (Sharpe, 1873)
		– <i>F. p. calidus</i> Latham, 1790
		PSITTACIDÉS
C	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)
		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.
		VIRÉONIDÉS
A	Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i> (Linné, 1766)
		– <i>V. o. olivaceus</i> (Linné, 1766)
		ORIIDÉS
A	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. o. oriolus</i> (Linné, 1758)
		LANIIDÉS
A	Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i> Linné, 1758
		– <i>L. c. cristatus</i> Linné, 1758
A	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833
	Pie-grièche de Daourie	– <i>L. i. isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833
	Pie-grièche du Turkestan	– <i>L. i. phoenicuroides</i> Schalow, 1875
A	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i> Linné, 1758
A	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788
A	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linné, 1758
		– <i>L. e. excubitor</i> Linné, 1758
		– <i>L. e. homeyeri</i> Cabanis, 1873
A	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820
		– <i>L. m. meridionalis</i> Temminck, 1820
	Pie-grièche des steppes	– <i>L. m. pallidirostris</i> Cassin 1851
A	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linné, 1758
		– <i>L. s. senator</i> Linné, 1758
		– <i>L. s. badius</i> Hartlaub, 1854
A	Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i> Lichtenstein, 1823
		CORVIDÉS
A	Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i> (Linné, 1766)
		– <i>P. g. graculus</i> (Linné, 1766)
A	Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. erythrorhamphus</i> (Vieillot, 1817)
A	Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. pica</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. melanotos</i> A. E. Brehm, 1857
A	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. g. glandarius</i> (Linné, 1758)

		– <i>G. g. rufitergum</i> Hartert, 1903
		– <i>G. g. corsicanus</i> Laubmann, 1912
A	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. c. caryocatactes</i> (Linné, 1758)
		– <i>N. c. macrorhynchus</i> C. L. Brehm, 1823
A	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758
		– <i>C. m. monedula</i> Linné, 1758
	Choucas des tours oriental	– <i>C. m. soemmerringii</i> Fischer, 1811
		– <i>C. m. spermologus</i> Vieillot, 1817
A	Choucas de Daourie	<i>Corvus dauuricus</i> Pallas, 1776
A	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758
		– <i>C. f. frugilegus</i> Linné, 1758
A	Corneille noire	<i>Corvus corone</i> Linné, 1758
		– <i>C. c. corone</i> Linné, 1758
A	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i> Linné, 1758
		– <i>C. c. cornix</i> Linné, 1758
	Corneille de Corse	– <i>C. c. sharpii</i> Oates, 1889
A	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i> Linné, 1758
		– <i>C. c. corax</i> Linné, 1758
	RÉGULIDÉS	
A	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)
		– <i>R. r. regulus</i> (Linné, 1758)
A	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)
		– <i>R. i. ignicapilla</i> (Temminck, 1820)
	RÉMIZIDÉS	
A	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (Linné, 1758)
		– <i>R. p. pendulinus</i> (Linné, 1758)
	PARIDÉS	
B	Mésange azurée	<i>Cyanistes cyanus</i> (Pallas, 1770)
		– <i>C. c. cyanus</i> (Pallas, 1770)
A	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. caeruleus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. obscurus</i> (Prazák, 1894)
		– <i>C. c. ogliastrae</i> (Hartert, 1905)
A	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linné, 1758
		– <i>P. m. major</i> Linné, 1758
		– <i>P. m. corsus</i> Kleinschmidt, 1903
A	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. c. mitratus</i> (C. L. Brehm, 1831)
		– <i>L. c. abadiei</i> (Jouard, 1929)
A	Mésange noire	<i>Periparus ater</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. a. ater</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. a. sardus</i> (Kleinschmidt, 1903)
A	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)
	Mésange alpestre	– <i>P. m. montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)
	Mésange des saules	– <i>P. m. salicarius</i> (C. L. Brehm, 1831)
		– <i>P. m. rhenanus</i> (Kleinschmidt, 1900)
A	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. palustris</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. dresseri</i> (Stejneger, 1886)
		– <i>P. p. italicus</i> (Tschusi & Hellmayr, 1900)
	PANURIDÉS	
A	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. b. biarmicus</i> (Linné, 1758)

ALAUDIDÉS		
A	Ammomane élégante	<i>Ammomanes cinctura</i> (John Gould, 1839)
		– appartenance subspécifique inconnue
A	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. a. arborea</i> (Linné, 1758)
		– <i>L. a. pallida</i> Zarudny, 1902
A	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i> Linné, 1758
		– <i>A. a. arvensis</i> Linné, 1758
		– <i>A. a. cantarella</i> Bonaparte, 1850
A	Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i> A. E. Brehm, 1858
		– <i>G. t. theklae</i> A. E. Brehm, 1858
A	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)
		– <i>G. c. cristata</i> (Linné, 1758)
A	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i> (Linné, 1758)
		– <i>E. a. flava</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)
		– <i>C. b. brachydactyla</i> (Leisler, 1814)
A	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linné, 1766)
		– <i>M. c. calandra</i> (Linné, 1766)
A	Alouette monticole	<i>Melanocorypha bimaculata</i> (Ménétries, 1832)
		– <i>M. b. rufescens</i> C. L. Brehm, 1855
B	Sirli de Dupont	<i>Chersophilus duponti</i> (Vieillot, 1820)
		– <i>C. d. duponti</i> (Vieillot, 1820)
A	Alouette pispolette	<i>Alaudala rufescens</i> (Vieillot, 1820)
		– appartenance subspécifique inconnue
HIRUNDINIDÉS		
A	Hirondelle paludicole	<i>Riparia paludicola</i> (Vieillot, 1817)
		– appartenance subspécifique inconnue
A	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i> (Linné, 1758)
		– <i>R. r. riparia</i> (Linné, 1758)
A	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)
A	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> Linné, 1758
		– <i>H. r. rustica</i> Linné, 1758
A	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i> (Linné, 1758)
		– <i>D. u. urbicum</i> (Linné, 1758)
A	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i> (Linné, 1771)
		– <i>C. d. rufula</i> (Temminck, 1835)
A	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)
		– appartenance subspécifique inconnue
CETTIIDÉS		
A	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)
		– <i>C. c. cetti</i> (Temminck, 1820)
AEGITHALIDÉS		
A	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. c. caudatus</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. c. europaeus</i> (Hermann, 1804)
		– <i>A. c. irbii</i> (Sharpe & Dresser, 1871)
		– <i>A. c. taiti</i> Ingram, 1913
		– <i>A. c. aremoricus</i> Whistler, 1929
PHYLLOSCOPIDÉS		
A	Pouillot de Temminck	<i>Phylloscopus coronatus</i> (Temminck & Schlegel, 1847)
A	Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)
		– <i>P. t. viridanus</i> (Blyth, 1843)
	Pouillot à pattes sombres	– <i>P. t. plumbeitarsus</i> (Swinhoe, 1861)
A	Pouillot boréal	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, 1858)

A	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas, 1811)
A	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)
A	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i> (Brooks, 1878)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i> (Radde, 1863)
A	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i> (Blyth, 1842)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Pouillot oriental	<i>Phylloscopus orientalis</i> (C. L. Brehm, 1855)
A	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)
A	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)
A	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)
		– <i>P. c. collybita</i> (Vieillot, 1817)
		– <i>P. c. abietinus</i> (Nilsson, 1819)
	Pouillot de Sibérie	– <i>P. c. tristis</i> Blyth, 1843
A	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937
A	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. t. trochilus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. t. acredula</i> (Linné, 1758)
	SYLVIIDÉS	
A	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. a. atricapilla</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. a. pauluccii</i> Arrigoni, 1902
A	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)
		– <i>S. b. borin</i> (Boddaert, 1783)
A	Fauvette naine	<i>Sylvia nana</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
A	Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)
		– <i>S. n. nisoria</i> (Bechstein, 1795)
A	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. c. curruca</i> (Linné, 1758)
		– <i>S. c. blythi</i> Ticehurst & Whistler, 1933
		– <i>S. c. minula</i> Hume, 1873 / <i>S. c. halimodendri</i> Sushkin, 1904
A	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>S. h. hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Fauvette de Rüppell	<i>Sylvia ruppeli</i> (Temminck, 1823)
A	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>S. m. melanocephala</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Fauvette de Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820
A	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)
	Fauvette des Balkans	– <i>S. c. albistriata</i> C. L. Brehm, 1855
		– <i>S. c. iberiae</i> Svensson, 2013
A	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787
		– <i>S. c. communis</i> Latham, 1787
A	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820
		– <i>S. c. conspicillata</i> Temminck, 1820
A	Fauvette sarde	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820
A	Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)
		– <i>S. u. undata</i> (Boddaert, 1783)
		– <i>S. u. dartfordiensis</i> Latham, 1787
A	Fauvette de l'Atlas	<i>Sylvia deserticola</i> Tristram, 1859
		– appartenance subsppécifique inconnue
	TIMALIIDÉS	
C	Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	LOCUSTELLIDÉS	
A	Locustelle de Pallas	<i>Locustella certhiola</i> (Pallas, 1811)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Locustelle lancéolée	<i>Locustella lanceolata</i> (Temminck, 1840)

A	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) – <i>L. n. naevia</i> (Boddaert, 1783)
A	Locustelle fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)
A	Locustelle lusciniôide	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) – <i>L. l. luscinioides</i> (Savi, 1824)
B	Locustelle fasciée	<i>Locustella fasciolata</i> (Gray, 1860) – <i>L. f. fasciolata</i> (Gray, 1860)
ACROCÉPHALIDÉS		
A	Hypolaïs bottée	<i>Iduna caligata</i> (Lichtenstein, 1823)
A	Hypolaïs rama	<i>Iduna rama</i> (Sykes, 1832)
A	Hypolaïs obscure	<i>Iduna opaca</i> (Cabanis, 1850)
A	Hypolaïs pâle	<i>Iduna pallida</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – <i>I. p. elaeica</i> (Lindermayer, 1843)
A	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i> (Vieillot, 1817)
A	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i> (Vieillot, 1817)
A	Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823) – <i>A. m. melanopogon</i> (Temminck, 1823)
A	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)
A	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linné, 1758)
A	Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)
A	Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, 1849
A	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)
A	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) – <i>A. s. scirpaceus</i> (Hermann, 1804)
A	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758) – <i>A. a. arundinaceus</i> (Linné, 1758)
CISTICOLIDÉS		
A	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) – <i>C. j. juncidis</i> (Rafinesque, 1810) – <i>C. j. cisticola</i> (Temminck, 1820)
BOMBYCILLIDÉS		
A	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linné, 1758) – <i>B. g. garrulus</i> (Linné, 1758)
TICHODROMIDÉS		
A	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i> (Linné, 1766) – <i>T. m. muraria</i> (Linné, 1766)
SITTIDÉS		
A	Sittelle corse	<i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884
A	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> Linné, 1758 – <i>S. e. caesia</i> Wolf, 1810 – <i>S. e. cisalpina</i> Sachtleben, 1919
CERTHIIDÉS		
A	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758 – <i>C. f. familiaris</i> Linné, 1758 – <i>C. f. macrodactyla</i> C. L. Brehm, 1831 – <i>C. f. corsa</i> Hartert, 1905
A	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820 – <i>C. b. brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1820 – <i>C. b. megarhyncha</i> C. L. Brehm, 1831
TROGLODYTIDÉS		
A	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758) – <i>T. t. troglodytes</i> (Linné, 1758)

		– <i>T. t. koenigi</i> Schiebel, 1910
		– <i>T. t. indigenus</i> Clancey, 1937
	STURNIDÉS	
A	Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820
A	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758
		– <i>S. v. vulgaris</i> Linné, 1758
A	Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i> (Linné, 1758)
	CINCLIDÉS	
A	CinCLE plongeur	<i>Cinclus cinclus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. cinclus</i> (Linné, 1758)
		– <i>C. c. aquaticus</i> Bechstein, 1803
	MUSCICAPIDÉS	
	TURDINÉS	
A	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)
		– <i>C. u. swainsonii</i> (Tchudi, 1845)
A	Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)
		– appartenance subspécifique inconnue
A	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i> (Latham, 1790)
		– <i>Z. d. aurea</i> (Holandre, 1825)
A	Grive de Sibérie	<i>Geokichla sibirica</i> (Pallas, 1776)
		– appartenance subspécifique inconnue
A	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i> Linné, 1758
		– <i>T. t. torquatus</i> Linné, 1758
		– <i>T. t. alpestris</i> (C. L. Brehm, 1831)
A	Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linné, 1758
		– <i>T. m. merula</i> Linné, 1758
A	Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i> J. F. Gmelin, 1789
A	Grive à ailes rousses	<i>Turdus eunomus</i> Temminck, 1831
A	Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i> Temminck, 1820
A	Grive à gorge noire	<i>Turdus atrogularis</i> Jarocki, 1819
A	Grive à gorge rousse	<i>Turdus ruficollis</i> Pallas, 1776
A	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i> Linné, 1758
A	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>T. p. philomelos</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>T. p. clarkei</i> Hartert, 1909
A	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i> Linné, 1766
		– <i>T. i. iliacus</i> Linné, 1766
		– <i>T. i. coburni</i> Sharpe, 1901
A	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758
		– <i>T. v. viscivorus</i> Linné, 1758
		– <i>T. v. deichleri</i> Erlanger, 1897
	MUSCICAPINÉS	
A	Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i> (Temminck, 1820)
		– <i>C. g. galactotes</i> (Temminck, 1820)
A	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)
		– <i>M. s. striata</i> (Pallas, 1764)
		– <i>M. s. tyrrhenica</i> Schiebel, 1910
A	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)
		– <i>E. r. rubecula</i> (Linné, 1758)
		– <i>E. r. melophilus</i> Hartert, 1901
		– <i>E. r. witherbyi</i> Hartert, 1910
A	Rosignol progné	<i>Luscinia luscinia</i> (Linné, 1758)
A	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>L. m. megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831
		– <i>L. m. golzii</i> Cabanis, 1873

A	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i> (Linné, 1758)
	Gorgebleue à miroir roux	– <i>L. s. svecica</i> (Linné, 1758)
	Gorgebleue à miroir blanc	– <i>L. s. cyanecula</i> (Meisner, 1804)
	Gorgebleue de Nantes	– <i>L. s. namnetum</i> Mayaud, 1934
A	Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)
A	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)
A	Gobemouche à demi-collier	<i>Ficedula semitorquata</i> (Von Homeyer, 1885)
A	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)
A	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)
		– <i>F. h. hypoleuca</i> (Pallas, 1764)
B*		– <i>F. h. iberiae</i> (Witherby, 1928) / <i>F. speculigera</i> (Bonaparte, 1850)
A	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)
		– <i>P. o. gilbaltariensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>P. o. phoenicuroides</i> (Horsfield & Moore, 1854)
A	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. p. phoenicurus</i> (Linné, 1758)
A	Rougequeue de Moussier	<i>Phoenicurus moussieri</i> (Olphe-Galliard, 1852)
A	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> (Linné, 1766)
A	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i> (Linné, 1758)
		– <i>M. s. solitarius</i> (Linné, 1758)
A	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linné, 1758)
A	Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i> (Pallas, 1773)
		– <i>S. m. maurus</i> (Pallas, 1773) / <i>S. m. stejnegeri</i> (Parrot, 1908)
	Tarier de la Caspienne	– <i>S. m. variegatus</i> (S. G. Gmelin, 1774)
A	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i> (Linné, 1766)
		– <i>S. r. rubicola</i> (Linné, 1766)
		– <i>S. r. hibernans</i> (Hartert, 1910)
A	Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)
A	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. o. oenanthe</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. o. leucorhoa</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– ? <i>O. o. libanotica</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
A	Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin, 1770)
A	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. h. hispanica</i> (Linné, 1758)
		– <i>O. h. melanoleuca</i> (Güldenstädt, 1775)
A	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i> (Temminck, 1825)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Traquet kurde	<i>Oenanthe xanthopyrma</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
A	Traquet à tête blanche	<i>Oenanthe leucopyga</i> (C. L. Brehm, 1855)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i> (J. F. Gmelin, 1789)
		– <i>O. l. leucura</i> (J. F. Gmelin, 1789)
	PRUNELLIDÉS	
A	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)
		– <i>P. c. collaris</i> (Scopoli, 1769)
A	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. m. modularis</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. m. occidentalis</i> (Hartert, 1910)
		– <i>P. m. mabbotti</i> Harper, 1919
A	Accenteur à gorge noire	<i>Prunella atrogularis</i> (Brandt, 1844)
		– appartenance subsppécifique inconnue
	ESTRILDIDÉS	
C	Capucin bec-de-plomb	<i>Euodice malabarica</i> (Linné, 1758)
	PASSÉRIDÉS	
A	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linné, 1758)

		– <i>P. d. domesticus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. d. balearoibericus</i> Von Jordans, 1923
A	Moineau cisalpin	<i>Passer italiae</i> Vieillot, 1817
A	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)
		– <i>P. h. hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)
A	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linné, 1758)
		– <i>P. m. montanus</i> (Linné, 1758)
A	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i> (Linné, 1766)
		– <i>P. p. petronia</i> (Linné, 1766)
A	Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linné, 1766)
		– <i>M. n. nivalis</i> (Linné, 1766)
	MOTACILLIDÉS	
A	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i> Linné, 1758
		– <i>M. f. flava</i> (Linné, 1758)
	Bergeronnette nordique	– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828
	Bergeronnette des Balkans	– <i>M. f. feldegg</i> Michahelles, 1830
	Bergeronnette d'Italie	– <i>M. f. cinereocapilla</i> Savi, 1831
	Bergeronnette flavéole	– <i>M. f. flavissima</i> (Blyth, 1834)
	Bergeronnette ibérique	– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921
	Bergeronnette orientale	– <i>M. f. tschutschensis</i> J. F. Gmelin, 1789 / <i>plexa</i> (Thayer & Bangs, 1914) / <i>macronyx</i> (Stresemann, 1920) / <i>taivana</i> (Swinhoe, 1863)
A	Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i> Pallas, 1776
		– <i>M. c. citreola</i> Pallas, 1776
A	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771
		– <i>M. c. cinerea</i> Tunstall, 1771
A	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i> Linné, 1758
		– <i>M. a. alba</i> Linné, 1758
	Bergeronnette de Yarrell	– <i>M. a. yarrellii</i> Gould, 1837
		– <i>M. a. subpersonata</i> Meade-Waldo, 1901
A	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818
A	Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i> Taczanowski, 1876
A	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. c. campestris</i> (Linné, 1758)
A	Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907
		– <i>A. h. yunnanensis</i> Uchida & Kuroda, 1916
A	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. t. trivialis</i> (Linné, 1758)
A	Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i> Swinhoe, 1863
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. p. pratensis</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. p. whistleri</i> Clancey, 1942
A	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)
A	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)
		– <i>A. p. petrosus</i> (Montagu, 1798)
		– <i>A. p. littoralis</i> C. L. Brehm, 1823
A	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i> (Linné, 1758)
		– <i>A. s. spinoletta</i> (Linné, 1758)
A	Pipit farlousane	<i>Anthus rubescens</i> (Tunstall, 1771)
		– <i>A. r. rubescens</i> (Tunstall, 1771)
	FRINGILLIDÉS	
A	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i> (Linné, 1758)
A	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758
		– <i>F. c. coelebs</i> Linné, 1758
		– <i>F. c. tyrrhenica</i> Schielbel, 1910
		– <i>F. c. africana</i> Levaillant, 1850 / <i>spodiogenys</i> Bonaparte, 1841 / <i>harterti</i> Svensson, 2015

A	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linné, 1758) – <i>C. c. coccothraustes</i> (Linné, 1758)
A	Roselin cramois	<i>Erythrina erythrina</i> (Pallas, 1770) – <i>E. e. erythrina</i> (Pallas, 1770)
A	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i> (Linné, 1758) – <i>P. e. enucleator</i> (Linné, 1758)
A	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linné, 1758) – <i>P. p. pyrrhula</i> (Linné, 1758) – <i>P. p. europaea</i> Vieillot, 1816 – <i>P. p. iberiae</i> Voous, 1951
A	Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i> (Lichtenstein, 1823) – appartenance subsppécifique inconnue
A	Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758) – <i>C. c. chloris</i> (Linné, 1758) – <i>C. c. aurantiiventris</i> (Cabanis, 1851) – <i>C. c. madaraszi</i> (Tschusi, 1911) – <i>C. c. harrisoni</i> (Clancey, 1940)
A	Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i> (Linné, 1758) – <i>L. c. cannabina</i> (Linné, 1758) – <i>L. c. mediterranea</i> (Tschusi, 1903)
A	Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i> (Linné, 1758) – <i>L. f. flavirostris</i> (Linné, 1758) – <i>L. f. pipilans</i> (Latham, 1787)
A	Sizerin cabaret	<i>Acanthis cabaret</i> (Stadius Müller, 1776)
A	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i> (Linné, 1758) – <i>A. f. flammea</i> (Linné, 1758)
A	Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemanni</i> (Holboell, 1843) – <i>A. h. hornemanni</i> (Holboell, 1843) – <i>A. h. exilipes</i> (Coues, 1862)
A	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i> J. F. Gmelin, 1789 – <i>L. l. bifasciata</i> (C. L. Brehm, 1827)
A	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> Linné, 1758 – <i>L. c. curvirostra</i> Linné, 1758 – <i>L. c. corsicana</i> Tschusi, 1912
A	Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1793
A	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758) – <i>C. c. carduelis</i> (Linné, 1758) – <i>C. c. parva</i> Tschusi, 1901 – <i>C. c. tschusii</i> Arrigoni, 1902 – <i>C. c. britannica</i> (Hartert, 1903)
A	Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)
A	Venturon corse	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, 1899)
A	Serin cini	<i>Serinus serinus</i> (Linné, 1766)
A	Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i> (Linné, 1758)
	EMBÉRIDÉS	
A	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linné, 1758) – <i>P. n. nivalis</i> (Linné, 1758) – <i>P. n. insulae</i> Salomonsen, 1931
A	Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linné, 1758) – <i>C. l. lapponicus</i> (Linné, 1758)
A	Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i> (Linné, 1766)
A	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i> (J. R. Forster, 1772) – appartenance subsppécifique inconnue
A	Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i> (J. F. Gmelin, 1789)
A	Bruant à tête rousse	<i>Emberiza bruniceps</i> Brandt, 1841
A	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769
A	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i> (Linné, 1758)

		– <i>E. c. calandra</i> (Linné, 1758)
A	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i> Linné, 1766
		– <i>E. c. cia</i> Linné, 1766
B	Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i> Cretzschmar, 1826
A	Bruant zizi	<i>Emberiza cirulus</i> Linné, 1766
A	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> Linné, 1758
A	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758
		– <i>E. c. citrinella</i> Linné, 1758
A	Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i> S. G. Gmelin, 1771
		– <i>E. l. leucocephalos</i> S. G. Gmelin, 1771
A	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linné, 1758)
		– <i>E. s. schoeniclus</i> (Linné, 1758)
		– <i>E. s. witherbyi</i> von Jordans, 1923
A	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773
		– <i>E. a. aureola</i> Pallas, 1773
A	Bruant roux	<i>Emberiza rutila</i> Pallas, 1776
B	Bruant à sourcils jaunes	<i>Emberiza chrysophrys</i> Pallas, 1776
A	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776
A	Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776
		– <i>E. r. rustica</i> Pallas, 1776
A	Bruant masqué	<i>Emberiza spodocephala</i> Pallas, 1776
		– <i>E. s. spodocephala</i> Pallas, 1776
A	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linné, 1758)
A	Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i> (Boddaert, 1783)
		– appartenance subsppécifique inconnue
A	Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i> (J.F. Gmelin, 1789)
A	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i> (Linné, 1758)
A	Paruline à collier	<i>Setophaga americana</i> (Linné, 1758)
A	Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i> (Linné, 1766)
		– <i>S. p. aestiva</i> (J.F. Gmelin, 1789)
A	Paruline à flancs marron	<i>Setophaga pennsylvanica</i> (Linné, 1766)
A	Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i> (J. R. Forster, 1772)

? = présence du taxon en France incertaine

D	Canard à faucilles	<i>Anas falcata</i> Georgi, 1775
D	Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linné, 1758)
D	Vanneau éperonné	<i>Vanellus spinosus</i> (Linné, 1758)
D	Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i> (Linné, 1766)
D	Corbeau familier	<i>Corvus splendens</i> Vieillot, 1817
D	Carouge à tête jaune	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i> (Bonaparte, 1826)