




ZOOM SUR LES MONTICOLES

Zoom sur les monticoles

Monticole à croupion roux	Monticola cinclorhyncha
Monticole à doigts courts	Monticola brevipes
Monticole à gorge blanche	Monticola gularis
Monticole à ventre marron	Monticola rufiventris
Monticole angolais	Monticola angolensis
Monticole bleu 	Monticola solitarius
Monticole de forêt	Monticola sharpei
Monticole de l'Ambre	Monticola erythronotus
Monticole de roche 	Monticola saxatilis
Monticole du littoral	Monticola imerina
Monticole espion	Monticola explorator
Monticole rocar	Monticola rupestris
Monticole rougequeue	Monticola rufocinereus

Zoom sur les monticoles

Le Monticole bleu

Monticola solitarius

Le Monticole de roche

Monticola saxatilis


Monticola : qui habite les montagnes

solitarius : solitaire

saxatilis : qui se tient dans la pierre

L'IDENTIFICATION


Ouvrir son guide



L'IDENTIFICATION


Pas de difficulté pour les mâles

MONTICOLE BLEU



DZ

MONTICOLE DE ROCHE



L'IDENTIFICATION



Monticole bleu



L'IDENTIFICATION




Monticole de roche




LA RÉPARTITION

Monticole bleu



Monticole de roche



Depuis 01/01/2020

Des oiseaux du Sud

Écologie caussenarde

Monticole bleu

Lié aux espaces rupestres verticaux ensoleillés exposés au Sud : falaises à couverture végétale faible avec de nombreux pitons en crête, pieds de falaises dénudés.

Se nourrit principalement d'invertébrés : insectes, araignées, lombrics, escargots. Occasionnellement de petits vertébrés comme les lézards de petite taille. Il peut aussi consommer des baies et des graines.

Considéré comme sédentaire pour une grande partie des mâles, les femelles seraient plus migratrices. Cette partie de son écologie est mal connue.

Monticole de roche

Lié aux lieux ensoleillés parsemés de gros blocs, de chaos et de pitons rocheux émergeant de pelouses rases où il capture ses proies. Parfois au bord des falaises.

Se nourrit de larves et d'adultes de coléoptères, d'orthoptères et de lépidoptères.

En hiver, ces oiseaux séjournent dans les savanes d'Afrique tropicale.

La répartition caussenarde

Estimation des effectifs du Monticole bleu

Lozère : 8 couples maximum

Aveyron : 9 couples maximum


Estimation des effectifs du Monticole de roche

Lozère : 15 couples au maximum

Aveyron : 2 couples au maximum

Comme il n'existe pas de prospections systématiques, ces estimations sont basées sur les données recueillies depuis 2020 et les connaissances générales d'ornithologues locaux

La répartition caussenarde



La répartition caussenarde

Gorges de la Jonte', zone des vases, Méjean, Lozère




La répartition caussenarde

Puech de Suège, avant-causses, Aveyron



La répartition caussenarde



La répartition caussenarde

Nord du Pic d'Usclat vers le Deïdou, Méjean, Lozère




La répartition caussenarde

Chaos de Nîmes le Vieux au Veygalier, Méjean, Lozère




La répartition aveyronnaise



La répartition aveyronnaise



La répartition aveyronnaise



La répartition aveyronnaise





La cohabitation caussenarde

Crêtes du Méjean sous Frépestel, Lozère

Seul secteur où la cohabitation est observée

Monticole de roche

Monticole bleu



Déclin et menaces

La régression générale de ces espèces en France depuis un siècle est surtout le résultat des activités humaines.

-L'emboisement ainsi que l'embroussaillage des hauts de falaises et des pentes dans les gorges. Sur les chaos rocheux les mêmes causes ont les mêmes effets.

-L'enrésinement du Causse Méjean et du Causse Noir par des forestiers a privé le Monticole de roche de sites favorables.

-L'escalade et l'engouement pour la via ferrata chassent les oiseaux de certains sites.

-La pratique de l'ornithologie sur certains sites comme le Roc des Bouillères dans la Jonte pour l'observation des Gypaètes barbus et l'installation d'une via ferrata ont fait disparaître le Monticole bleu de ces rochers.

-La fréquentation du chaos de Nîmes le Vieux perturbe les Monticoles de roche.

Déclin et menaces

Les activités humaines peuvent être parfois bénéfiques comme l'ouverture de carrières, encore faut-il que celles-ci ne se fassent pas sur des sites déjà occupés par ces oiseaux. Le comblement de carrières peut chasser les oiseaux qui s'y étaient installés. Exemple dans la petite carrière de Drigas sur le Méjean.

Des incendies peuvent ouvrir les milieux a priori favorables, envahis par les broussailles et les résineux. L'incendie qui a ravagé la moitié la commune de Mostuéjols, a découvert des zones rocheuses de pitons et de ravins. Une population de Monticoles bleus pourrait s'y développer ; encore faut-il que les populations existantes soient assez dynamiques pour coloniser ces sites.

Le maintien du pastoralisme dans les zones rocheuses chaotiques serait bénéfique.

La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles

Dans une carrière



La recherche des monticoles



La recherche des monticoles



© Jean-Luc Naudin

OÙ VOIR DES OISEAUX ?



Un ouvrage qui vous aidera
dans vos voyages
à travers l'hexagone

Délégation territoriale de l'Aveyron



*L'ornitho c'est toute l'année, tous
les jours et partout.*

Il suffit de regarder dehors.

Nous vous attendons ! A bientôt !