

Mémo Sternula

(ou « les 2 petites sternes »)

Sternes

→ en Guyane : 11 espèces

Traits distinctifs des 2 sternula

- ✓ Très petite taille < 25 cm
- ✓ Bec et pattes jaunes
- ✓ Beaucoup plus petites que la Sterne de Cayenne (*Thalasseus sandvicensis eurygnatha*), et non huppées.



Regarder en priorité : bec et rémiges primaires externes. La localisation est elle aussi importante

Petite sterne (*S. antillarum*)

Présentes de juin à mars environ, en plum. internuptial

Sterne argentée (*S. superciliaris*)

Toute l'année, en plumages nuptial et internuptial

1 - Zones de présence -

trait côtier



Exclusivement en mer, au bord des côtes.

Extrait de faune-guyane.fr via la consultation multicritères

bord de mer et intérieur



Plans d'eau, estuaires, marais, fleuve, en mer...

2 - Silhouette -

plus frêle

plus robuste

- très petite sterne : 23cm
- ~ Pluvier semipalmé
- plus fine, tête plutôt grosse proportionnellement



- plus costarde, trapue
- haute sur pattes

Petite sterne (S. antillarum)

Sterne argentée (S. superciliaris)

3 - Forme du bec - *pointu, avec angle au gonyx**

long, fort & épais

(*difficilement observable)



4 - Couleur du bec -

entièrement **noir** ou
jaune à pointe noire

jaune ou **jaune et noir diffus**

Note: bec jamais jaune (exceptions très rares)

Note: bec jamais entièrement noir



4bis - trait/bandeau oculaire : bandeaux noirs oculaires qui se rejoignent toujours à la nuque.

4bis - bandeau oculaire : gros bandeau noir oculaire en forme de loup ovale ou encore en forme de « cacahuète », qui ne se rejoint pas à la nuque et forme une tache bien visible même de loin.

Petite sterne (*S. antillarum*)

Sterne argentée (*S. superciliaris*)

5 - Comportement en vol -

nerveux

- nerveux, très actif
 - parfois agressive
 - fait du surf place et plonge
- ~ vol d'une Sterna, Thalasseus



© M. Dechelle



© K. Questel

placide

- vol calme au dessus de l'eau
 - attrape ses proies à la surface
 - plonge rarement, de façon moins démonstrative
- ~ vol d'une Guifette



© L. Epelboin



© L. Epelboin

6 - Rémiges primaires noires -

≤ 2

1 à 2 rémiges primaires les plus externes noires



© V. Lemoine



© L. Epelboin



© K. Questel

>2

parfois 3 souvent 4 rémiges primaires noires ou brunâtres → large marque apparente



© M. Chrétien



© M. Chrétien