

Tinamou cendré
Crypturellus cinereus
Cinereous Tinamou

Liste rouge UICN

Guyane **LC**

Monde **LC**


Non protégé

Pas de sous-espèce.



© R. Jantot [[Faune-Guyane](#)]

Autres photos de l'espèce : [Faune-Guyane](#)
[GEPOG](#)



Maille validée (total=146, soit 16%)

■ avant 2011 (17)

■ à partir de 2011 (129)

Statut

Espèce nicheuse résidente, commune.

1642 données enregistrées dans Faune-Guyane jusqu'en 2019.

Territorial. Probablement solitaire ou par couple, comme les autres tinamous.

Répartition

Répartition globale

Amazonie et plateau des Guyanes (Cabot et al. 2020).

Répartition en Guyane

Probablement réparti dans tout le département. Les données se répartissent depuis la côte jusqu'à l'extrême Sud.

Densités et taille de population

Aucune information sur les densités en Guyane. Aucune estimation de taille de population.

Habitats

Tous types de forêts. Commun dans les forêts secondaires et discontinues de la plaine littorale, moins commun au sein du bloc forestier de l'intérieur où on le trouve essentiellement (mais pas exclusivement) dans les zones perturbées (cambrouzes, lisières naturelles ou artificielles, forêts de transition en lisière de savanes-roches) et dans les forêts alluviales le long des criques

(par ex. dans la réserve naturelle de la Trinité, O. Claessens, [12/04/2018](#)), jusqu'à 600 m d'altitude (montagne Bellevue de Maripasoula, C. Marty & B. Villette, [16/05/2017](#) ; Mont Tabulaire, RN de la Trinité, V. Rufroy, [16/04/2015](#)).

Phénologie




Sédentaire. On constate une diminution du nombre de données d'avril à septembre, probablement liée à une baisse saisonnière d'activité vocale.

Nidification

La nidification du Tinamou cendré reste peu connue (Cabot et al. 2020). Pond ses œufs directement sur le sol.

Contrairement aux autres tinamous du genre *Crypturellus*, le chant est identique chez les deux sexes, tout au plus peut-on noter dans les duos des timbres sensiblement différents ; le chant plus aigu serait celui de la femelle (?) (Cabot et al. 2020, Boesman et al. 2018). Chante principalement dans la journée, parfois à l'aube ou au crépuscule mais jamais entendu en pleine nuit.

Seulement 2 données de reproduction en Guyane : un adulte suivi de 2 poussins dans la réserve naturelle régionale Trésor (Roura) (T. Luglia, [12/02/2013](#)) ; un nid contenant 2 œufs vieux rose, au pied d'un arbrisseau dans une ancienne travée forestière à Saint-Laurent-du-Maroni (O. Claessens, [6/05/2017](#)).



Phénologie de la reproduction

Bien qu'il chante toute l'année, on note une légère augmentation de la fréquence des chants d'octobre à mars, en fin de saison sèche et début de saison des pluies.

Les deux données de nidification, en février et mai (voir ci-dessus) s'accordent avec une reproduction en saison des pluies. Ce calendrier est en contradiction avec celui décrit par Haverschmidt (1968, in Tostain et al. 1992) au Suriname.

Alimentation

Composée principalement de fruits, graines et insectes de la litière (Cabot et al. 2020).

Aucune donnée sur l'alimentation de ce tinamou en Guyane.

Conservation

Aucune menace identifiée en Guyane. Non menacé (catégorie LC, "préoccupation mineure") au niveau régional comme à l'échelle mondiale, du fait de sa large distribution, de son abondance et de sa tolérance vis-à-vis des milieux forestiers perturbés et morcelés (UICN-France et al. 2017, BirdLife International 2020).

Citation

Claessens O. (2021). Tinamou cendré (*Crypturellus cinereus*). In *Atlas préliminaire des oiseaux de Guyane*. GEPOG. www.faune-guyane.fr (version 14/01/2021).

Bibliographie

BirdLife International (2020). Species factsheet: *Crypturellus cinereus*. <http://www.birdlife.org> (consulté le 28/09/2020).

Boesman, P., Claessens, O., Costa, T. V. V., Pelletier, V., Ingels, J. & Renaudier†, A. 2018. Songs of Rusty Tinamou *Crypturellus brevirostris* and dueting in *Crypturellus* species. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 69-78. <http://www.bioone.org/doi/pdf/10.25226/bboc.v137i4.2018.a2>.

Cabot, J., Christie, D. A., Jutglar, F., Sharpe, C.J., & Boesman, P. F. D. (2020). Cinereous Tinamou (*Crypturellus cinereus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rustin1.01>.

Rufay, V., Pelletier, V. & Ingels, J. (2014). First photographs and new records of the Rusty Tinamou *Crypturellus brevirostris* from French Guiana. *Neotropical Birding* 15: 15-19.

UICN-France, MNHN & GEPOG 2017. *La Liste rouge des espèces menacées en France, chapitre Oiseaux de Guyane*. In : UICN-France, MNHN, GEPOG, Kwata, Biotope, Hydreco & OSL 2017. *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitres de la Faune vertébrée de Guyane*. Paris, France.

