Papillons de Guyane

les Heliconius

17 espèces illustrées

Ombeline Sculfort

Avril 2025

Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel

Dans ce guide

Des Papillons fascinants

- Les *Heliconius* sont des papillons américains
- Des noms légendaires
- Un petit pas pour la Science

Reconnaître un *Heliconius*

Histoires de Passion

Vivre d'amour et de pollen

- Programme du soir
- Les adultes sont des pollinisateurs
- Elixir de jeunesse

Guerre chimique

- Acquisition des glucosides cyanogènes

Mimétisme

- Beaux de loin, loin d'être bons
- Qui se ressemblent se rassemblent

Classification

Liste taxonomique

Espèces et sous-espèces

- Hybridation entre sous-espèces

Cercles mimétiques

- Dennis
- Dennis à rayons
- Noir pois rouges
- Tigré
- Bleu

Fiches espèces

- Espèce non mimétique
- Dennis et Dennis à rayons
- Noir pois rouges
- Tigré
- Bleu

Mes premières observations

- Faire avancer les sciences participatives

Bibliographie

Guide illustré des *Heliconius*

- Premières représentations d'*Heliconius* de 1705
- Remerciements
- Financements
- Citation

Des Papillons fascinants

Les *Heliconius* sont des papillons américains

Leur répartition s'étend des Etats-Unis au nord de l'Argentine, en passant par les Antilles, les Galapagos, les Bermudes, Trinidad et Tobago et Hawaii (ils ont été introduits pour lutter contre des passiflores invasives).

47

espèces
décrites

17

espèces en
Guyane

Des noms légendaires

Le genre *Heliconius* a été décrit en 1780 par le naturaliste polonais Jan Krzysztof Kluk.

Heliconius signifie « habitants du Mont Helicon ». Cette montagne grecque était considérée divine car habitée par les muses ; les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne.

Ainsi, de nombreuses espèces portent des noms inspirés de la mythologie grecque, tel *H. aoede*, *H. demeter*, *H. erato*, *H. melpomene*, *H. hecale*...

En revanche, il n'existe pas encore de nom commun en français pour les *Heliconius*.

Un petit pas pour la Science

Ces papillons sont un sujet d'étude depuis le XIX^{ème} siècle dans de nombreux domaines tels que la génétique, l'évolution, la neurobiologie, la spéciation, le comportement, l'aposématisme, le mimétisme, les défenses chimiques...

Etant un modèle d'étude, il est attendu que les résultats obtenus soient extrapolables à d'autres organismes.

Cependant il faut garder à l'esprit que les *Heliconius* représentent 0.02% des lépidoptères et qu'ils ont une écologie très particulière.

Reconnaître un *Heliconius*

Ce sont de grands papillons aux couleurs vives et contrastées.

Les yeux sont grands, ronds et reflètent la lumière en donnant l'illusion d'avoir des pois foncés sur les yeux (comme un ballon de foot). Ils ont une très bonne vision, et voient les longueurs d'ondes du rouge aux ultra-violet.

Comme les autres espèces de la famille des Nymphalidae, ils ont 4 pattes locomotrices. La première paire de pattes est atrophiée et plaquée contre le thorax. Ces premières pattes sont couvertes de récepteurs mécano-sensoriels et gustatifs, plus nombreux chez les femelles.

Histoires de Passion

Si vous voyez un *Heliconius* virevolter autour d'une passiflore, il s'agit sûrement d'une femelle à la recherche de la plante-hôte* adéquate pour pondre. Elle revisite peut-être une plante sur laquelle elle a déjà pondu par le passé car les femelles peuvent mémoriser l'emplacement des plantes-hôtes.

Après un examen visuel et chimique minutieux, elle décidera de pondre ou non. Les œufs jaune vif et ovales, sont pondus isolés. Chez les espèces grégaires, les œufs sont pondus en groupe, par une ou plusieurs femelles.

Les chenilles s'alimentent exclusivement de plantes de la famille des Passifloraceae : des genres *Passiflora* et *Dilkea*.

Les chenilles ont de longs piquants peu urticants. Après une dizaine de jours à gloutonner des feuilles, elles muent en chrysalide.

Heliconius sara
Passiflora candida

Emergence
d'*Heliconius numata*

Chrysalides
d'*Heliconius doris*

L'émergence des adultes a lieu après environ 10 jours de métamorphose.

*Plante-hôte : désigne la plante sur lesquelles les chenilles se nourrissent. Selon les espèces de papillon, le spectre de plantes-hôtes est plus ou moins important. Certaines sont généralistes et d'autres sont spécialistes.

Vivre d'amour et de pollen

Heliconius zzerato

Programme du soir

Dès que la lumière du jour décline, les papillons cherchent une fine branche où se suspendre pour passer la nuit. Ils sont plutôt solitaires mais certaines espèces, tel *Heliconius antiochus* et *Heliconius erato*, se regroupent pour dormir.

Les adultes sont des pollinisateurs occasionnels, alors que les chenilles sont d'efficaces tondeuses pouvant sérieusement impacter les passiflores. Les *Heliconius* se nourrissent de nectar mais aussi de pollen, ce qui est unique chez les papillons ! Ils peuvent se souvenir de l'emplacement des plantes sur lesquelles butiner, typiquement des cucurbitacées des genres *Gurania* et *Psiguria*.

Elixir de jeunesse

Le pollen récolté est agglutiné sur la trompe et lentement digéré par les enzymes salivaires. Les nutriments et acides aminés sont ainsi lentement libérés.

L'accès à ce cocktail nutritif très riche, permet aux adultes de :

- se reproduire toute leur vie
- vivre plus longtemps (jusqu'à 9 mois !)
- produire des glucosides cyanogènes : molécules de défenses chimiques et de stockage de l'azote.

Heliconius numata
sur *Gurania huberi*

Guerre chimique

Les interactions entre *Heliconius* et Passiflores sont très étudiées pour mieux comprendre les mécanismes de coévolution entre plantes et herbivores.

Les passiflores ne peuvent fuir mais disposent parfois de défenses mécaniques (trichomes*) et chimiques. Elles peuvent synthétiser pléthore de molécules de défenses : alcaloïdes β-carbolines, flavonoïdes, saponines, composés phénoliques et glucosides cyanogènes.

Les chenilles *Heliconius* peuvent contourner ces défenses via des voies métaboliques de détoxification, d'excrétion ou de séquestration.

En détournant l'arsenal chimique de la plante-hôte à leur avantage, les chenilles peuvent se nourrir sans s'intoxiquer.

De plus, la séquestration de certaines de ces molécules leur confère un goût amer qui n'est pas pour plaire à certains oiseaux prédateurs.

Acquisition des glucosides cyanogènes

Séquestration

Les chenilles peuvent voler les glucosides cyanogènes des passiflores et les stocker jusqu'au stade adulte.

Les molécules séquestrées sont très variables d'un papillon à l'autre et dépendent de ce que la plante-hôte est en mesure de produire.

Synthèse

Tout au long de leur vie, les *Heliconius* peuvent synthétiser leurs propres glucosides cyanogènes, à partir d'acides aminés. Le pollen est ainsi primordial aux adultes.

Des glucosides cyanogènes sont transmis par la mère dans ses œufs, ainsi tous les stades de développement en sont pourvus. Les mâles en transmettent à la femelle lors de l'accouplement en guise de « cadeau nuptial ».

*Trichome : excroissance épidermique, ressemble à des « poils ». Petits et acérés chez certaines passiflores. Les jeunes chenilles de quelques *Heliconius* peuvent ronger les bouts pointus ou les recouvrir de soie (non démontré en Guyane).

Mimétisme

Les *Heliconius* ont un vol caractéristique, assez lent et nonchalant, et sont ainsi réputés faciles à capturer.

La plupart des oiseaux naïfs les relâchent aussitôt et souvent indemnes, alors que les oiseaux expérimentés sont plus réticents à les attaquer.

Ces papillons combinent des défenses chimiques et des couleurs vives très contrastées perçues comme un signal d'avertissement par les prédateurs potentiels.

Beaux de loin, loin d'être bons

En effet, les prédateurs sont en mesure d'associer le patron de coloration des papillons avec leur mauvais goût. En se basant sur leurs expériences gustatives désagréables, les oiseaux apprennent à éviter les proies arborant le même patron de coloration.

Les patrons de couleurs vives, facilement mémorisables, sont ainsi fréquemment observés chez les espèces de papillons pourvus de défenses chimiques.

Qui se ressemblent se rassemblent

Au sein d'une localité, il est fréquent d'observer que des espèces de papillon différentes arborent les mêmes patrons de coloration.

On parle de mimétisme müllerien entre espèces chimiquement défendues et de mimétisme batésien lorsque l'une des espèces mimes n'a pas de défenses chimiques.

Les espèces différentes co-mimes forment un « cercle mimétique ».

Un cercle mimétique a une aire de distribution plus ou moins étendue. Les aires de plusieurs cercles mimétiques peuvent se chevaucher.

Les *Heliconius* guyanais (à une exception près) peuvent être classés en 5 cercles mimétique :

- Dennis
- Dennis à rayons
- Noir pois rouges
- Tigré
- Bleu

Seul *Heliconius ricini* n'a pas d'espèce mime.

Heliconius ricini

Classification

Groupes taxonomiques

Arbre simplifié d'après Kozak, 2015

Cet arbre phylogénétique rend compte des relations d'apparentement entre les groupes taxonomiques.

Il permet de répondre à la question :

« *qui est plus proche de qui ?* »* en se basant sur les résultats d'analyses ADN.

Cet arbre est extrêmement simplifié puisqu'il ne tient compte que des espèces de Guyane.

Les 7 autres genres de la tribu des Heliconiini ne sont pas détaillés dans ce guide. Le nombre des espèces guyanaises est indiqué entre crochets.

La tribu des Heliconiini fait partie de la famille des Nymphalidae ; l'une des 7 familles de Papilionoidea : les « papillons de jour ».

*A ne pas confondre avec un arbre généalogique qui renseigne sur « qui descend de qui » au sein d'une même espèce.

Liste taxonomique

- *Heliconius antiochus antiochus*
- *Heliconius aoede centurius*
- *Heliconius burneyi burneyi*
- *Heliconius burneyi catharinae*
- *Heliconius demeter bouqueti*
- *Heliconius doris doris*
- *Heliconius egeria egeria*
- *Heliconius elevatus bari*
- *Heliconius erato erato*
- *Heliconius erato hydara*
- *Heliconius ethilla thielei*
- *Heliconius hecale fraternitas*
- *Heliconius lalitae*
- *Heliconius melpomene melpomene*
- *Heliconius melpomene meriana*
- *Heliconius melpomene thelxiopeia*
- *Heliconius numata numata*
- *Heliconius numata silvana*
- *Heliconius ricini ricini*
- *Heliconius sara sara*
- *Heliconius wallacei flavescens*
- *Heliconius wallacei wallacei*
- *Heliconius xanthocles vala*

Par convention, les noms scientifiques s'écrivent en *italique* et commencent par une majuscule.

Les noms en deux mots sont des noms d'espèce : par exemple *Heliconius numata* ou *H. numata*.
Ceux en trois mots désignent une sous-espèce : par exemple *H. numata silvana*.

H. numata
H. numata silvana

Espèces et sous-espèces

En fonction des localités, une même espèce présente un patron de coloration* variable. Par exemple, les *Heliconius hecale* de Guyane et du Pérou sont visuellement très différents ! De même pour les populations d'*Heliconius erato* de part et d'autre de la montagne de Kaw. On pourrait presque douter qu'il s'agisse de la même espèce.

Pour distinguer les populations, on parle alors de sous-espèces.

Par exemple, plus de 28 sous-espèces d'*H. erato* sont décrites et deux sont présentes en Guyane : *H. erato erato* et *H. erato hydara*.

Hybridation entre sous-espèces

Les sous-espèces, aussi divergentes soient-elles visuellement, peuvent se reproduire entre elles puisqu'il s'agit de la même espèce.

Leurs descendants sont viables et fertiles.

Ces descendants hybrides ont des patrons de coloration extrêmement variables qui contrastent avec ceux de leurs parents.

Heliconius erato

2 sous-espèces

Certaines sous-espèces sont mimétiques et ont le même patron de coloration ! Malgré cela, elles ne peuvent se reproduire entre elles car elles sont génétiquement trop différentes.

*Patron de coloration : désigne la disposition des taches ainsi que les couleurs des ailes d'un papillon.

Deux espèces peuvent avoir les mêmes couleurs mais suivant une autre disposition et ont donc des patrons de coloration différents.

Cercles mimétiques

Dennis

« Dennis » désigne ce motif rouge à la base des ailes antérieures

H. melpomene meriana

♂
H. demeter

H. burneyi

H. egeria

H. lalitae

Dennis à rayons

H. doris

H. erato erato

H. burneyi

♀
H. demeter

H. aoede

H. xanthocles

H. melpomene thelixiopeia

H. elevatus

Cercles mimétiques

Dennis

H. melpomene meriana

H. demeter

H. burneyi

H. egeria

H. lalitae

Dennis à rayons

H. doris

H. erato erato

H. burneyi

H. demeter

H. aoede

H. xanthocles

H. melpomene thelixiopeia

H. elevatus

Cercles mimétiques

Noir pois rouges

H. erato hydara

H. melpomene melpomene

Tigré

H. numata numata

H. hecale

H. numata silvana

H. ethilla

Bleu

H. doris

H. sara

H. wallacei wallacei

H. antiochus

H. wallacei flavescens

Cercles mimétiques

Noir pois rouges

H. erato hydara

H. melpomene melpomene

Tigré

H. numata numata

H. hecale

H. numata silvana

H. ethilla

Bleu

H. sara

H. doris

H. antiochus

H. wallacei

Fiches espèces

Les *Heliconius* sont présentés par cercles mimétiques (et non par ordre alphabétique). Les cercles « Dennis » et « Dennis à rayon » sont regroupés.

Ainsi, les espèces les plus ressemblantes sont le plus côte à côte possible afin de faciliter leur comparaison.

Aucun statut de protection, ni de nom français ne sont indiqués car il n'en existent pas encore...

La gamme de mesures indiquée correspond à la longueur de l'aile antérieure.

Exemple

Nom scientifique

Critère d'identification

Vue dorsale

Vue latérale

Espèce non mimétique

Heliconius ricini ricini

33-35 mm

Aucune confusion possible car il n'y a pas d'espèce mimétique en Guyane.

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius doris doris

40-45 mm

Petite bande

Longs rayons

Ligne de points blancs

Grandes taches jaunâtres accolées

Rayons rouges et ligne de points blancs

Forme rouge « *delila* » peu courante.

L'espèce est polymorphe ; les individus issus d'une même ponte peuvent être de couleurs différentes et ce en proportion variable. La forme la plus fréquente est bleue.

voir cercle mimétique « Bleu »

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius egeria egeria

44-46 mm

Le rouge déborde
peu dans la cellule

Aire rouge large
et rayonnante

Rayons peu marqués

Heliconius lalitae

46 mm

Le rouge déborde
dans la cellule

Aire rouge très
réduite à la base

Ligne
jaune

Ces deux grandes espèces au vol rapide,
sont inféodées à la canopée.

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius burneyi burneyi

42-46 mm

Petite bande

1 grande tache jaunâtre et 2 bien séparées

Rayons rouges et tirets blancs

Taches très élargies

Forme « jeanneae »

Heliconius burneyi catharinae

42-46 mm

1 grande tache jaunâtre et 2 bien séparées

Absence de rayon rouge aux ailes postérieures

Tirets blancs

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius demeter bouqueti

33-37 mm

Le dimorphisme sexuel est marqué : la femelle et le mâle ne se ressemblent pas en face dorsale.

Base rouge
Amorce de rayons

Demi-cercle
de taches
jaunâtres

♂

Rayons soudés
à la base

Massues
jaunes

Rayons bien
séparés

♀

♀

Forme hybride avec
H. demeter terrasanta du Brésil,
visible dans le Sud.
Perte progressive des rayons.

Point
rouge

Points
blancs

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius aoede centurius

34-38 mm

Cette espèce forestière est la seule du genre *Heliconius* à ne pas consommer de pollen.

Heliconius xanthocles vala

36-38 mm

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius elevatus bari

37-39 mm

Demi-cercle
de taches
jaunâtres

Tache
noire

3 à 4 taches

Rayons à base large.
Séparés de l'aire vermillon
par une barre noire

Discrète ligne
de points blancs

Heliconius melpomene thelxiopeia

40-42 mm

Demi-cercle
de taches
jaunâtres

Tache
noire

Rayons séparés de l'aire
rouge par une barre noire

Subtils rayons

Dennis et Dennis à rayons

Heliconius melpomene meriana

40-42 mm

H. melpomene est plus inféodé aux rivages et bords de crique qu'*H. erato*.

Heliconius erato erato

34-40 mm

Noir pois rouges

Heliconius melpomene melpomene

40-42 mm

Bande rouge

H. melpomene est plus inféodé aux rivages et bords de crique qu'*H. erato*.

3 points rouges à la base de l'aile

Heliconius erato hydrara

34-40 mm

Bande rouge

Points rouges à la base de l'aile postérieure. Parfois peu visibles.

Point rouge

4 points rouges à la base de l'aile

Le point fléché est parfois peu marqué

Tigré

Antennes
jaunes

Heliconius ethilla thielei

32-40 mm

Jaune sous une
virgule noire

Dague plus ou
moins marquée

Patron de
coloration variable

Point rouge

Heliconius hecale fraternitas

42-47 mm

Antennes
jaunes

Jaune cerclé
de noir

Dague plus ou
moins marquée

Patron de
coloration variable

Tigré

Heliconius numata numata

37-40 mm

Antennes
jaunes

Tache noire ovoïde,
atteint le bord de
l'aile, sans encercler
de tâche jaune

Tache noire
allongée

Patron de
coloration variable

Heliconius numata silvana

37-40 mm

Antennes
jaunes

Tache noire ovoïde, atteint le
bord de l'aile, sans encercler
de tâche jaune

Bleu

Heliconius sara sara

31-34 mm

Heliconius wallacei flavescens

40-42 mm

Heliconius wallacei wallacei

40-42 mm

H. sara et *H. wallacei* volent souvent ensemble et peuvent être rigoureusement identiques en face dorsale

Heliconius antiochus antiochus

31-34 mm

Bandes blanches

Bleu foncé métallique

Grande virgule rouge

Heliconius doris doris

40-45 mm

Groupe de taches jaunâtres

Rayons bifides

Bleu mat

Ligne de points bleutés

Rayons rouges et tirets blancs

Les individus issus d'une même ponte peuvent être de couleurs différentes et ce en proportion variable. La forme la plus fréquente est bleue.

voir cercle mimétique « Dennis et Dennis à rayon »

Mes premières observations

Espèces

Sous-espèces

Date, lieu

- Heliconius antiochus*.....
- Heliconius aoede*.....
- Heliconius burneyi*.....
 - H. b. burneyi*.....
 - H. b. catharinae*.....
- Heliconius demeter*.....
- Heliconius doris*.....
 - forme bleue.....
 - forme rouge.....
- Heliconius egeria*.....
- Heliconius elevatus*.....
- Heliconius erato*.....
 - H. e. erato*.....
 - H. e. hydara*.....
- Heliconius ethilla*.....
- Heliconius hecale*.....
- Heliconius lalitae*.....
- Heliconius melpomene*.....
 - H. m. melpomene*.....
 - H. m. meriana*.....
 - H. m. thelxiopeia*.....
- Heliconius numata*.....
 - H. n. numata*.....
 - H. n. silvana*.....
- Heliconius ricini*.....
- Heliconius sara*.....
- Heliconius wallacei*.....
- Heliconius xanthocles*.....

Faire avancer les sciences participatives

Pour valoriser vos observations naturalistes, n'hésitez pas à les banqueriser dans une base de données gratuite et publique !

Prises dans leur ensemble, ces données contribuent grandement à l'amélioration des connaissances sur l'écologie, les mœurs et la phénologie d'une espèce.

En effet, même pour une espèce relativement facile à observer, cela ne signifie pas que son mode de vie soit connu.

INPN-Espèces

CardObs

iNaturalist

Faune-Guyane

Faune-France

Bibliographie

- **Bennett, R. N., & Wallsgrrove, R. M.** (1994). Secondary metabolites in plant defence mechanisms. *New phytologist*, 127(4), 617-633.
- **Benson, W. W., et al.** (1975). Coevolution of plants and herbivores: passion flower butterflies. *Evolution*, 659-680.
- **Brévignon, C.** (1996). Description d'un nouvel *Heliconius* provenant de Guyane Française. *Lambillionea* 96, 467, 470.
- **Brown, K.S.** (1981) The Biology of *Heliconius* and Related Genera. *Annual Review of Entomology*, 26, 427-457.
- **Cavin, J.C. & Bradley, T.** (1988) Adaptation to ingestion of β -carboline alkaloids by Heliconiini butterflies. *Journal of Insect Physiology*, 34, 1071-1075.
- **Chai, P.** (1986) Field observations and feeding experiments on the responses of rufous-tailed jacamars, *Galbula ruficauda*, to free-flying butterflies in a tropical rainforest. *Biol. J. Linn. Soc.*, 29, 166-189.
- **Davis, R.H. & Nahrstedt, A.** (1987) Biosynthesis of cyanogenic glucosides in butterflies and moths. *Insect Biochemistry*, 17, 689-693.
- **Dell'aglio, D.D., et al.** (2016) Butterfly Learning and the Diversification of Plant Leaf Shape. *Front. Ecol. Evol.*, 4.
- **Ehrlich, P.R. & Gilbert, L.E.** (1973) Population structure and dynamics of the tropical butterfly *Heliconius ethilla*. *Biotropica*, 5, 69-82.
- **Estrada, C. & Jiggins, C.D.** (2002) Patterns of pollen feeding and habitat preference among *Heliconius* species. *Ecological Entomology*, 27, 448-456.
- **Gilbert, L.E.** (1972) Pollen Feeding and Reproductive Biology of *Heliconius* Butterflies. *PNAS*, 69, 1403-1407.
- **Harpel, D., et al.** (2015) Pollen feeding proteomics: Salivary proteins of the passion flower butterfly, *Heliconius melpomene*. *Insect Biochemistry and Molecular Biology*, 63, 7-13.
- **Joron, M.** (2009) Chapter 10 - Aposematic Coloration. *Encyclopedia of Insects (Second Edition)* (Resh, V.H. & Cardé, R.T. eds). San Diego: Academic Press, pp. 33-38.
- **Kluk, Krzysztof.** (1780) *Historija naturalna zwierzat domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalney poczatkki, i gospodarstwo : potrzebnych I pozytecznych donowych chowanie, rozmnozenie, chorob leczenie, dzikich lowienie, oswoaenie : za zycie; szkodliwych zas wygubienie.* 4 vols. *Hist. nat. pocz. gospod.* 4
- **Kozak, K.M., et al.** (2015) Multilocus Species Trees Show the Recent Adaptive Radiation of the Mimetic *Heliconius* Butterflies. *Syst Biol.*
- **Lever, Y., Chazal, C., Lacomme, D.** (2008). Reconnaissance des morphes de *Heliconius melpomene* de Guyane française (Lep., Nymphalidae ; Heliconiinae). *Lépidoptères de Guyane*, Lacomme D. & Manil L. éd., *Lépidoptères, Hors-série*, vol.3,- pp. 4 - 13.
- **Mallet, J., et al** (1987) Handling Effects in *Heliconius* Where Do All the Butterflies Go. *Journal of Animal Ecology*, 56, 377-386.
- **Merian, M.S.** (1705) *Metamorphosis insectorum Surinamensium: in qua erucac ac vermes Surinamenses, cum omnibus suis transformationibus, ad vivum delineantur et describuntur...* London: Pion.
- **Müller, F.** (1879) *Ituna and Thyridia; a remarkable case of Mimicry in Butterflies.* Kosmos, 100.
- **Nahrstedt, A. & Davis, R.H.** (1985) Biosynthesis and quantitative relationships of the cyanogenic glucosides, linamarin and lotaustralin, in genera of the Heliconiini (Insecta: Lepidoptera). *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, 82, 745-749.
- **Nishida, R. & Fukami, H.** (1990) Sequestration of distasteful compounds by some pharmacophagous insects. *J Chem Ecol*, 16, 151-164.
- **Olafsdottir, E.S., et al.** (1989) Cyanohydrin glycosides of passifloraceae. *Phytochemistry*, 28, 127-132.
- **Pentzold, S., et al.** (2014) How insects overcome two-component plant chemical defence: plant β -glucosidases as the main target for herbivore adaptation: Insect adaptations to plant chemical defence. *Biological Reviews*, 89, 531-551.
- **Petiver, J.** (1705) *Gazophylacium naturae et artis.*
- **Pinheiro, C.E.G. & Campos, V.C.** (2019) The responses of wild jacamars (*Galbula ruficauda*, Galbulidae) to aposematic, aposematic and cryptic, and cryptic butterflies in central Brazil. *Ecological Entomology*, 0.
- **Poulton, E.B.** (1890) *The colours of animals: their meaning and use especially considered in the case of insects.* London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. Ltd.
- **Rosser, N., et al.** (2012) Testing historical explanations for gradients in species richness in heliconiine butterflies of tropical America: Diversification of Butterflies. *Biological Journal of the Linnean Society*, 105, 479-497.
- **Sculfort, O., et al.** (2020). Variation of chemical compounds in wild Heliconiini reveals ecological factors involved in the evolution of chemical defenses in mimetic butterflies. *Ecology and Evolution*, 10(5), 2677-2694.
- **Silva, D.S., et al.** (2018) Sensing the plant surface prior to feeding and oviposition: Differences in external ultrastructure and function among tarsi of *Heliconius erato*. *Neotrop Entomol*, 47, 85-95.
- **Waage, J.K., et al.** (1981) The Passiflora problem in Hawaii; prospects and problems of controlling the forest weed *P. Mollissima* [Passifloraceae] with heliconiine butterflies. *Entomophaga*, 26, 275-284.
- **Yuan, F., et al.** (2010) Contrasting Modes of Evolution of the Visual Pigments in *Heliconius* Butterflies. *Mol Biol Evol*, 27, 2392-2405.

Guide illustré des *Heliconius*

Ce travail est dédié à mon père Eric, à qui la danse virevoltante de ces papillons aurait inspiré une mélodie, puisqu'il vivait la musique.

La vocation de ce guide est de faire découvrir les merveilleux papillons que sont les *Heliconius* et de soutenir la science participative en permettant aux contributeurs de les identifier. Ces papillons sont facilement observables en forêts, au bords des criques, et dans les jardins lorsqu'ils visitent les *Lantana* et *Stachytarpheta*.

Premières représentations d'*Heliconius* de 1705

James Petiver publia une illustration de *Papilio mexicanus*, renommé en 1847 *H. erato petiverana*.

Maria Sibylla Merian, assistée de sa fille Dorothea, représenta un *Heliconius* observé au Suriname sur du ricin. En découvrant cette aquarelle, plus de 50 ans plus tard, Carl von Linné crût qu'il était représenté sur sa plante-hôte et le nomma *H. ricini*.

Remerciements

Je remercie ma mère Marie-Annick Sculfort Montouroy, ma soeur Magali Ndjiki Sculfort et Maël Dewynter pour leurs relectures attentives. Merci à Ulysse Penez pour ses conseils, à Frédéric Bénéluz et Maël d'avoir chiné quelques articles. Sébastien Sant, merci pour ton expertise phytologique !

Financements

Ce guide a été cofinancé par

- PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD)
- la société Ombeline Sculfort – Nymphal'ID

Citation

Sculfort O. (2025) Papillons de Guyane ; les *Heliconius*, 17 espèces illustrées. 32p.